

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- Αποφεύγετε να αναπνεύτε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα
- Πλυνθείτε σχολαστικά με νερό μετά το χειρισμό.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
- Φοράτε γάντια κατά τον χειρισμό
- Διάθεση του περιεχομένου/διαχυτήρα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες-αντίδοτο

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:

Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση κατάποσης: ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και κατόπιν πιείτε άφθονο νερό, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: απομακρυνθείτε στον καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν και σε περίπτωση αμφιβολίας αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Διάθεση της συσκευασίας και του περιεχομένου

Οι χρησιμοποιούμενοι διαχυτήρες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι χρησιμοποιούμενοι διαχυτήρες καθώς και η άδεια συσκευασία δεν πρέπει να απορρίπτονται στο περιβάλλον και απαγορεύεται να επαναχρησιμοποιηθούν.

Συστάσεις:

Να μην χρησιμοποιείτε το CYDIATEC® εάν η εξωτερική ή εσωτερική συσκευασία είναι κατεστραμμένη ή εάν η συσκευασία έχει παραβιαστεί. Αποθηκεύστε στην αρχική απαριθμημένη συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και μακριά από το φως. Μην ανοίξετε την συσκευασία παρά μόνο όταν την τοποθετήσετε στην καλλιέργεια.

CYDIATEC®

Διαχυτήρες ελεγχόμενης απελευθέρωσης
(VP) φερομόνης για την παρεμπόδιση
σύζευξης για την καρποκάψα της μηλιάς
(*Cydia pomonella*)

ΣΥΝΘΕΣΗ:

400 mg/διαχυτήρα (E,E)-8,10-dodecadien-1-ol
+ 200 mg/διαχυτήρα dodecan-1-ol
(VP)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 9096/1-2-2022

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική
γεωργία σύμφωνα με τους Καν (ΕΕ) 2021/1165 και Καν.
(ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

SEDQ
HEALTHY CROPS

SEDQ Healthy Crops S.L.
C/Lull 41
08005-Barcelona
Spain

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

MAGMA

MAGMA AGRO A.E.B.E.
Λεωφόρος Κηφισίας 55
Τ.Κ. 15123 Μαρούσι
Τηλ.: +30 211 9904 700
E-mail: info@magma-agro.gr
www.magma-agro.gr

Αρ. Παρτίδας: Δείτε τη συσκευασία
Ημερ. Παραγωγής: Δείτε τη συσκευασία

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Περιεχόμενο:
100
διαχυτήρες

Τρόπος εφαρμογής

Το CYDIATEC® είναι ετοιμόχρηστο σκεύασμα το οποίο παρεμποδίζει την σύζευξη των εντόμων (mating disruption). Ο χρήστης αφού αφαιρέσει την συσκευασία κρεμάει τους διαχυτήρες στα ψηλότερα κλαδιά της καλλιέργειας.

Κατηγορία και τρόπος δράσης

Φερομόνη για την αντιμετώπιση της καρποκάψας στην μηλιά με την μέθοδο της παρεμπόδισης της σύζευξης.

Μηλοειδή Μήλα, Αχλάδια Κυδωνία, Μούσμουλα, Ιαπωνικά μούσμουλα	
Καλλιέργεια	Μήλο, Αχλάδι, Κυδωνία, Μούσμουλα, Ιαπωνικά μούσμουλα
Εχθρός	<i>Cydia pomonella</i> (CARPPPO)
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Εφαρμόζεται από την έναρξη της άνθισης μέχρι οι καρποί να έχουν το μισό του τελικού τους μεγέθους. (BBCH 61 -75) Η τοποθέτηση των διαχυτήρων θα πρέπει να γίνει πριν την έναρξη της πρώτης πτήσης των εντόμων σε ψηλά κλαδιά, στο ανώτερο 1/3 της κόμης του δέντρου.
Αριθμός διαχυτήρων/στρέμμα	30-40
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο	1

Παρατηρήσεις:

1. Συστήνεται η χρήση φερομονικών παγίδων (monitoring) προκειμένου να ελέγχεται ότι τα αρσενικά είναι σε σύγχυση. Αν οι συλλήψεις είναι λίγες ή μηδενικές, το CYDIATEC® λειτουργεί σωστά με αποτέλεσμα τα αρσενικά να μην συλλαμβάνονται στην παγίδα.
2. Προτείνεται ο έλεγχος της παρουσίας της καρποκάψας με την χρήση φερομονικών παγίδων (monitoring) τοποθετημένες εκτός της περιοχής δράσης του CYDIATEC®.
3. Συστήνεται η εκτίμηση της παρουσίας του εχθρού (ωά, προνύμφες) σε τακτά χρονικά διαστήματα με δειγματοληψίες στην καλλιέργεια. Συμπληρωματικές επεμβάσεις να γίνονται λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία αών ή προνυμφών στην καλλιέργεια και τον αριθμό των συλλήψεων στις παγίδες παρακολουθήσης.
4. Οι διαχυτήρες θα πρέπει να κατανεμηθούν ομοιόμορφα στο αγροτεμάχιο. Να ενισχύεται η περίμετρος των αγροτεμαχίων με 5-10% επιπλέον διαχυτήρες.
5. Η τυπική διάρκεια εξάτμισης φερομόνης από τον κάθε διαχυτήρα είναι **180 μέρες**.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό για τις εγκεκριμένες χρήσεις εφόσον πληρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή:

Μη εφαρμόσιμο

Αποθήκευση:

Διατηρείται στην αρχική απαριθμημένη συσκευασία του, σε θερμοκρασίες -18° C και μακριά από το φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι συστάσεις και οι πληροφορίες που παρέχουμε είναι αποτέλεσμα εκτεταμένων και αυστηρών μελετών και δοκιμών. Ωστόσο, μπορούν να παρεμβαίνουν παράγοντες που είναι πέρα από τον έλεγχό μας (μέθοδος και χρόνος εφαρμογής, κλιματολογικές συνθήκες κλπ.). Ο παρασκευαστής εγγυάται τη σύνθεση και το περιεχόμενο. Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για τις προκληθείσες ζημιές (έλλειψη αποτελεσματικότητας, διάθεση των κενών συσκευασιών, κ.λπ.) εξαιτίας της πλήρους ή μερικής μη τήρησης των οδηγιών της ετικέτας