

8044 W. Vernor Hwy
Detroit, MI 48209



vernordentalcare.com
313-486-4428

Implant Post-op Care

General care

Control minor bleeding by applying moderate pressure with gauze pads or a clean, moist tea bag wrapped in a gauze pad.

Call our office right away if you have heavy or increased bleeding, if you have pain or swelling that increases or continues beyond two or three days, or if you have a reaction to the medication.

Limit your activities for the first three to five days to help reduce bleeding.

Tobacco use

Do not use tobacco products of any kind for at least 24 hours, and avoid tobacco as much as possible for several months. Tobacco slows healing and increases the risk that your body will reject the implants. It's the leading cause of implant failure.

Chewing and eating

Avoid chewing until the numbness has worn off completely. If we placed a temporary restoration, avoid chewing for 30 minutes to allow the temporary cement to set.

For the first 24 hours, drink lots of liquids and eat soft, nutritious foods, chewing on the opposite side of your mouth.

After the first 24 hours, you may begin to return to your usual diet, but continue to chew on the opposite side. At your next scheduled appointment, we will evaluate your situation to determine how soon you may begin chewing on the implant.

Brushing and flossing

For the first 14 days, gently wipe the implant site with gauze or a cotton swab. After the 14 days, brush the area gently with a soft toothbrush.

Medication and discomfort

If antibiotics or other medicines are prescribed, continue to take them as directed, even if all symptoms and signs of infection are gone.

To control discomfort, take pain medication before the anesthetic has worn off or as recommended. It's normal to experience some discomfort for several days after surgery.

To reduce discomfort or swelling for the first 24 hours following surgery, use ice packs, 20 minutes on and 20 minutes off, on the outside of your jaw.

After the first 24 hours, you may apply moist heat to reduce discomfort.

To further reduce discomfort after the first 24 hours, you can rinse your mouth very gently three times a day with warm salt water. Use about one teaspoon of salt per glass of warm water.

8044 W. Vernor Hwy
Detroit, MI 48209



vernordentalcare.com
313-486-4428

Implant Post-Op Care

Cuidados generales

Controle el sangrado mínimo aplicando presión moderada con un apósito de gasa o una bolsita de té húmeda y limpia envuelta en un apósito de gasa.

Llame o concurra de inmediato al consultorio si tiene sangrado intenso o si este aumenta, si tiene dolor o hinchazón que aumenta o continúa después de los dos o tres días, o si tiene una reacción a la medicación. Limite sus actividades los primeros tres a cinco días para ayudar a reducir el sangrado.

Tabaquismo

No use productos con tabaco de ningún tipo durante al menos 24 horas, y evite el tabaco lo más que pueda durante varios meses. El tabaco retrasa la cicatrización y aumenta el riesgo de que el organismo rechace los implantes. Es la principal causa de falla del implante.

Masticar y comer

Evite masticar hasta que el adormecimiento haya desaparecido por completo. Si le colocamos una restauración temporaria, evite masticar durante 30 minutos para permitir que el cemento temporal fragüe. Durante las primeras 24 horas, beba mucha cantidad de líquidos y coma alimentos blandos y nutritivos, masticando con el lado opuesto de la boca.

Después de las primeras 24 horas, puede comenzar a reanudar su dieta habitual, pero continúa masticando con el lado opuesto de la boca. En la próxima visita programada, evaluaremos su situación para determinar en cuánto tiempo podrá comenzar a masticar con el lado del implante.

Cepillo de dientes e hilo dental

Durante los primeros 14 días, limpie suavemente el sitio del implante con gasas o con un hisopo de algodón. Después de 14 días, lave la zona suavemente con un cepillo de dientes blando.

Medicamentos y molestias

Si se le prescriben antibióticos u otros medicamentos, continúa tomándose tal como se le indica, aún cuando todos los síntomas y signos de infección haya desaparecido.

Para controlar las molestias, tome analgésicos antes de que se vaya el efecto del anestésico, o según le recomienden. Es normal tener ciertas molestias durante varios días después de la operación. Para reducir las molestias o la hinchazón durante las primeras 24 horas después de la operación, use compresas con hielo, alternando 20 minutos con las compresas y 20 minutos sin ellas, en el lado externo del maxilar.

Después de las primeras 24 horas, puede aplicar calor húmedo para reducir las molestias.

Para reducir las molestias aún más después de las primeras 24 horas, puede enjuagarse la boca muy suavemente tres veces al día con agua tibia con sal. Use alrededor de una cucharadita de sal por vaso de agua tibia.