

313-486-4428
vernordentalcare.com



8044 W. Vernor Highway
DETROIT, MI 48209

Restorations (Fillings) Post Operative Instructions

- ❖ **Wait an hour before you eat.** Avoid any chewing on the filling side until the numbness has completely worn off.
- ❖ **Children should be observed until the anesthetic wears off.** Due to the strange feeling of the anesthetic, children might bite and injure the inside of their lips, cheeks or tongue.
- ❖ **Sensitivity to cold or hot beverages is common for a few weeks.** Usually the deeper the cavity, the more sensitive the tooth will be and might last for months.
- ❖ **The gum tissue may have been irritated during the procedure** (especially if the decay went below the gum line) and may be sore for a few days. Also, the anesthetic injection site is normally tender for a day or two. Warm salt water rinses are helpful.
- ❖ **Ibuprofen (Motrin), Tylenol or aspirin** work well to alleviate the discomfort in the first several days

If your bite feels uneven, if you have persistent pain, or if you have any other questions or concerns, please call our office.



Restauraciones (empastes) instrucciones postoperatorias

- ❖ **Espere una hora antes de comer.** Evite masticar en el lado donde hicieron el empaste hasta que el adormecimiento desaparezca.
- ❖ **Los niños deben ser observados hasta que los efectos de la anestesia desaparezca.** Debido a la rara sensación con la anestesia, el niño puede morder o herir la lengua, mejilla, o dentro de los labios.
- ❖ **Sensibilidad a bebidas frías o calientes es común por varias semanas.** Normalmente lo más profundo de la carie, el diente va estar más sensible y puede durar meses.
- ❖ **Los tejidos (las encías) podrían haber sido irritados durante el procedimiento** (especialmente si el deterioro está debajo de la línea de las encías) y puede quedar adolorido por unos días. Además, el sitio de inyección (lugar de la inyección anestésica) es normalmente sensible por uno o dos días. Enjuagues de agua tibia y sal son recomendados.
- ❖ **Ibuprofeno (Motrin), Tylenol o aspirina** ayudan a aliviar la incomodidad los primeros días.

Si su mordida se siente dispareja, si tiene dolor persistente o si tiene alguna otra pregunta o preocupación, por favor llame a nuestra oficina.

313-843-4003
vernordentalcare.com



8044 W. Vernor Hwy
Detroit, MI 48209

Restorations (Fillings) Post Operative Instructions

- ❖ **Wait an hour before you eat.** Avoid any chewing on the filling side until the numbness has completely worn off.
- ❖ **Children should be observed until the anesthetic wears off.** Due to the strange feeling of the anesthetic, children might bite and injure the inside of their lips, cheeks or tongue.
- ❖ **Sensitivity to cold or hot beverages is common for a few weeks.** Usually the deeper the cavity, the more sensitive the tooth will be and might last for months.
- ❖ **The gum tissue may have been irritated during the procedure** (especially if the decay went below the gum line) and may be sore for a few days. Also, the anesthetic injection site is normally tender for a day or two. Warm salt water rinses are helpful.
- ❖ **Ibuprofen (Motrin), Tylenol or aspirin** work well to alleviate the discomfort in the first several days

If your bite feels uneven, if you have persistent pain, or if you have any other questions or concerns, please call our office.

313-843-4003
vernordentalcare.com



8044 W. Vernor Hwy
Detroit, MI 48209

Restauraciones (empastes) instrucciones postoperatorias

- ❖ **Espere una hora antes de comer.** Evite masticar en el lado donde hicieron el empaste hasta que el adormecimiento desaparezca.
- ❖ **Los niños deben ser observados hasta que los efectos de la anestesia desaparezcan.** Debido a la rara sensación con la anestesia, el niño puede morder o herir la lengua, mejilla, o dentro de los labios.
- ❖ **Sensibilidad a bebidas frías o calientes es común por varias semanas.** Normalmente lo más profundo de la carie, el diente va estar más sensible y puede durar meses.
- ❖ **Los tejidos (las encías) podrían haber sido irritados durante el procedimiento** (especialmente si el deterioro está debajo de la línea de las encías) y puede quedar adolorido por unos días. Además, el sitio de inyección (lugar de la inyección anestésica) es normalmente sensible por uno o dos días. Enjuagues de agua tibia y sal son recomendados.
- ❖ **Ibuprofeno (Motrin), Tylenol o aspirina** ayudan a aliviar la incomodidad los primeros días.

Si su mordida se siente dispareja, si tiene dolor persistente o si tiene alguna otra pregunta o preocupación, por favor llame a nuestra oficina.