



Pedodontic Aftercare for dental Procedures

☐ Anesthesia Post- Op Instruction

Monitor your child closely for approximately two hours following the appointment. It is often wise to keep your child on a liquid or soft diet until the anesthetic has worn off. Remind your child to refrain from touching, biting, sucking, or playing with the numb area.

- ☐ Filling or crown Post-Op Instructions** Make certain that your child is not eating or chewing while numb. Please make sure they do not bite their cheeks, lips, or tongue as doing so can cause injury to the soft tissue. Your child should avoid sticky, crunchy, or hard foods for 24 hours. If your child experiences sensitivity or discomfort, you may give your child Children's Tylenol, Advil or Motrin as directed for the age and weight of your child.

- ☐ Pulpotomy / Baby root canal Post-Op Instructions** If your child is experiencing sensitivity after this treatment, you may give your child Children's Tylenol, Advil or Motrin as directed for the age and weight of your child. If sensitivity or discomfort continues for more than 24 hours, please contact our office. Pulpotomies have been shown to have 85% to 90% clinical success rate in primary teeth. If the tooth starts to cause pain or swelling, please contact our office. The tooth needs to come out in most cases and place a space maintainer.

- ☐ Extraction Post-Op Instructions** Please instruct your child not to rinse, spit, or drink through a straw. Have them keep their fingers and tongue away from the area. If unusual or sustained bleeding occurs, place slightly moistened cotton gauze firmly over the extraction area, and bite down or hold in place for thirty minutes. Repeat every thirty minutes until the area is no longer bleeding. Maintain a soft diet for a day or two or until the child feels comfortable eating normally again. Avoid strenuous exercise and physical activity for the rest of the day after the extraction. For discomfort use Children's Tylenol, Advil, or Motrin as directed for the age and weight of your child. If sensitivity or discomfort continues for more than 24 hours, please contact our office.

- ☐ Space Maintainer Post-Op Instruction** to avoid damage to the space maintainer, your child should avoid gum, sticky candies and chewing ice. Hard foods, like raw carrots and apples, should be cut in small pieces. Thorough brushing and flossing are necessary to make sure that food and plaque are removed daily. Should the space maintainer come off, please call our office right away so that it can be recemented into place. We will keep the space maintainer on until the permanent tooth is ready to erupt.



Cuidados posteriores de periodoncia para procedimientos dentales

❑ Instrucción postoperatoria de anestesia

Vigile de cerca a su hijo durante aproximadamente dos horas después de la cita. A menudo es aconsejable mantener a su hijo con una dieta líquida o blanda hasta que desaparezca el efecto de la anestesia. Recuerde a su hijo que se abstenga de tocar, morder, chupar o jugar con el área adormecida.

❑ Instrucciones postoperatorias de llenado o corona

Asegúrese de que su hijo no coma ni mastique cuando esté adormecido. Asegúrese de que no se muerdan las mejillas, los labios o la lengua, ya que hacerlo puede causar lesiones en los tejidos blandos. Su hijo debe evitar los alimentos pegajosos, crujientes o duros durante 24 horas. Si su hijo experimenta sensibilidad o malestar, puede darle Tylenol, Advil o Motrin para niños según las indicaciones para la edad y el peso de su hijo.

❑ Instrucciones postoperatorias para pulpotomía/conducto radicular

Si su hijo tiene sensibilidad después de este tratamiento, puede administrarse Tylenol, Advil o Motrin para niños según las indicaciones para la edad y el peso de su hijo. Si la sensibilidad o el malestar continúa durante más de 24 horas, comuníquese con nuestra oficina. Se ha demostrado que las pulpotomías tienen una tasa de éxito clínico del 85% al 90% en los dientes temporales. Si el diente comienza a causar dolor o hinchazón, comuníquese con nuestra oficina. El diente debe salir en la mayoría de los casos y colocar un mantenedor de espacio.

❑ Instrucciones postoperatorias de extracción

Indique a su hijo que no debe enjuagarse, escupir ni beber con una pajita. Pídale que mantenga los dedos y la lengua alejados del área. Si se produce un sangrado inusual o sostenido, coloque una gasa de algodón ligeramente humedecida firmemente sobre el área de extracción y muerda o manténela en su lugar durante treinta minutos. Repita cada treinta minutos hasta que el área ya no esté sangrando. Mantenga una dieta blanda durante uno o dos días o hasta que el niño se sienta cómodo comiendo normalmente nuevamente. Evite el ejercicio intenso y la actividad física durante el resto del día después de la extracción. Para las molestias, use Tylenol, Advil o Motrin para niños según las indicaciones para la edad y el peso de su hijo. Si la sensibilidad o la incomodidad continúan durante más de 24 horas, comuníquese con nuestra oficina.

❑ Instrucción postoperatoria del mantenedor de espacio

Para evitar daños en el mantenedor de espacio, su hijo debe evitar chicle, caramelos pegajosos y masticar hielo. Los alimentos duros, como zanahorias y manzanas crudas, deben cortarse en trozos pequeños. Es necesario cepillarse los dientes y usar hilo dental para asegurarse de que los alimentos y la placa se eliminen a diario. Si el mantenedor de espacio se desprende, llame a nuestra oficina de inmediato para que pueda volver a colocarlo en su lugar. Mantendremos el mantenedor de espacio puesto hasta que el diente permanente esté listo para salir.