

Les informations suivantes sont importantes à connaître dans le cadre de la prise en charge de vos douleurs neuropathiques :

- Les antalgiques usuels comme le paracétamol ou les anti-inflammatoires ne sont en général pas efficaces contre ce type de douleurs.
- Pour que les traitements soient efficaces, **ils doivent être pris régulièrement.**
- L'effet du traitement ne sera visible qu'après plusieurs semaines. **N'interrompez pas le traitement en l'absence d'efficacité immédiate.**
- Votre médecin peut être amené à vous prescrire des traitements habituellement utilisés pour d'autres troubles (dépression, épilepsie). Ces médicaments ont également une efficacité sur le type de douleur que vous présentez, et vous sont prescrits pour leur effet antidouleur.
- Les doses de traitement doivent être augmentées progressivement.
- Le soulagement des douleurs est souvent seulement partiel.
- En cas d'échec ou d'efficacité insuffisante d'un traitement, d'autres traitements peuvent être essayés.

Votre médecin vous informera des **effets secondaires** à surveiller.

- Les effets secondaires se manifestent souvent lors de l'introduction du traitement ou lors des changements de doses. Beaucoup disparaissent avec le temps.
En cas de nouveau symptôme apparaissant sous traitement, parlez-en à votre médecin.
- Certains traitements peuvent provoquer une somnolence. **Ne pas conduire ou manipuler d'engins dangereux lors de l'introduction ou du changement de dose d'un traitement** sans l'avis de votre médecin.

N'interrompez pas votre traitement s'il est efficace sur les douleurs, ni sans l'avis de votre médecin.

Les traitements ne doivent pas être interrompus brutalement car il existe un risque de sevrage.