



Pilule œstroprogestative de 3e génération : risque de méningiome - Fiche conseil

Vous avez opté pour une contraception par pilule œstroprogestative dite de 3^e génération.

La contraception par désogestrel est associée à un risque très faible de méningiome. Par mesure de sécurité, certaines précautions sont étendues aux pilules œstroprogestatives contenant du désogestrel.

- Ce risque concerne principalement :
 - les femmes de plus de 45 ans,
 - celles prenant ce contraceptif depuis plus de 5 ans.
- Ce risque est nettement inférieur à celui associé à d'autres progestatifs comme chlormadinone (Lutéran[®]), cyprotérone (Androcur[®]), nomégestrol (Lutényl[®]), médrogestone (Colprone[®]) et méthoxyprogestérone (Depo Provera[®]).

Si vous prenez une pilule œstroprogestative, une IRM cérébrale n'est pas nécessaire, sauf en cas de symptômes évocateurs.

Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, consultez rapidement un médecin :

- maux de tête persistants,
- troubles de la vision,
- faiblesse musculaire,
- problèmes d'équilibre,
- difficultés à parler,
- troubles de la mémoire,
- apparition ou aggravation d'épilepsie.

Votre contraception doit être réévaluée régulièrement avec votre médecin ou votre sage-femme, en prenant en compte vos besoins et votre état de santé.
