

Fiche conseils

- En cas d'anxiété ou de tristesse, **arrêtez votre traitement par finastéride et parlez-en à votre médecin.**
- Notez que chez 1 à 2 % des patients, une baisse du désir sexuel et/ou des troubles de l'érection et/ou des troubles de l'éjaculation peuvent survenir. Ceux-ci peuvent régresser seuls ou nécessiter l'arrêt du traitement. En cas de survenue, parlez-en à votre médecin.
Il est à savoir que ces symptômes **régressent généralement à l'arrêt du traitement**, mais peuvent persister.
- L'efficacité du traitement ne pourra être pleinement appréciée qu'après **6 mois**.
- En cas d'interruption du traitement, un retour à l'état antérieur est à prévoir.
- Prévenez votre médecin en cas de grosseur, de douleur ou d'écoulement au niveau d'un mamelon.

Pour en savoir plus sur l'alopécie et le finastéride, **scannez les QR codes.**

Appliquez ces recommandations dans le cadre de votre traitement par minoxidil :

- appliquez sur un cuir chevelu propre et sec,
- lavez-vous soigneusement les mains après l'application,
- évitez tout contact avec les yeux.

Les premiers résultats de ce traitement ne seront visibles qu'après **3 à 4 mois**. Une efficacité optimale ne sera obtenue qu'après 6 à 8 mois de traitement.

En cas d'arrêt du traitement, une reprise de la chute de cheveux similaire à l'état antérieur est à prévoir.

Pour en savoir plus sur l'alopécie, **scannez le QR code.**



Information sur
l'alopecie



L'utilisation du
finastéride
