



## Thérapies ciblées - Durée d'interruption des traitements avant un acte invasif

	<b>Chirurgie à faible risque septique (orthopédique dont PTG/PTH, ophtalmologique, dermatologique, biopsies mammaires, acte invasif dentaire*, tatouage)</b>	<b>Chirurgie en milieu non stérile (digestive, uro-génitale, thoracique, tête et cou, chirurgie de foyer infectieux, piercing)</b>	<b>Endoscopies (digestives, respiratoires, génito-urinaires) avec ou sans biopsie</b>	
<b>INFliximab IV</b>	9 semaines	9 semaines	Interruption non nécessaire	
<b>INFliximab SC</b>	3 semaines	5-10 semaines		
<b>Adalimumab</b>	3 semaines	6-10 semaines		
<b>Etanercept</b>	2 semaines	2 semaines		
<b>Certolizumab</b>	3 semaines (5 si 400 mg)	6-10 semaines		
<b>Golimumab</b>	5 semaines	6-10 semaines		
<b>Tocilizumab IV</b>	5 semaines	6-10 semaines		
<b>Tocilizumab SC</b>	2 semaines	5-9 semaines		
<b>Sarilumab SC</b>	3 semaines	9-15 semaines		
<b>Abatacept IV</b>	2- semaines			
<b>Abatacept SC</b>	2 semaines			
<b>Baricitinib</b>	1 semaine			
<b>Tofacitinib</b>	1 semaine			
<b>Rituximab IV</b>	6 mois (idéalement, sinon 5 mois)			
<b>Belimumab IV</b>	14 semaines			

\* Hors : détartrage/acte de prévention non saignant-soins conservateurs/pose ou ajustement d'appareils orthodontiques-de prothèses amovibles/soins prothétiques non saignants/dépose de sutures...

<b>USTEKINUMAB</b>	15 semaines			
<b>SECUKINUMAB</b>	5 semaines	12-19 semaines		
<b>IXEKIZUMAB</b>	5 semaines	6-9 semaines		
<b>ANAKINRA</b>	1 semaine			
<b>Reprise du traitement</b>				
Reprise de la thérapie ciblée après cicatrisation				
* Hors : détartrage/acte de prévention non sanglant-soins conservateurs/pose ou ajustement d'appareils orthodontiques-de prothèses amovibles/soins prothétiques non sanglants/dépose de sutures...				

(Adapté des fiches du CRI nov 2020)