

 **Durée d'interruption des traitements immunsupresseurs chez l'adulte en cas d'injection d'un vaccin vivant atténué**

Traitements	Durée d'interruption avant vaccination	Durée d'interruption après vaccination
<ul style="list-style-type: none"> Glucocorticoïdes^{\$} Méthotrexate^{&} Azathioprine^{&} Léflunomide Mycophénolate mofétil Anti-calcineurines Cyclophosphamide orale 	4 semaines	4 semaines
<ul style="list-style-type: none"> Anti-IL-1 Anti-IL-6 Anti-IL-17[*] Anti-IL-12/23[*] Anti-IL-23[*] Anti-BAFF/BLyS[*] Anti-TNF[*] Abatacept[*] Anifrolumab[*] Cyclophosphamide intraveineux[*] 	1 intervalle entre 2 doses	4 semaines
JAKi	1 semaine	4 semaines
Rituximab	6 mois	4 semaines
Immunoglobulines intraveineuses <300-400 mg/kg [#]	8 mois	4 semaines
Immunoglobulines intraveineuses 1 g/kg [#]	10 mois	4 semaines
Immunoglobulines intraveineuses 1 g/kg [#]	11 mois	4 semaines

^{\$} Pour les patients prenant < 20 mg/jour d'équivalent prednisone ou un traitement par corticoïdes en alternance, ces faibles doses peuvent être maintenues si la vaccination est cruciale et si le risque de poussée de la maladie ou d'insuffisance surrénalienne est élevé en cas d'interruption du traitement.

[&] Pour les patients prenant ≤ 0,4 mg/kg/semaine de méthotrexate ou ≤ 3 mg/kg/jour d'azathioprine les délais de suspensions peuvent être raccourcis si la vaccination est cruciale et si le risque d'une poussée de la maladie est élevé en cas d'interruption du traitement.

^{*} Pour les médicaments avec plus d'une durée d'intervalle possible entre 2 doses d'après la Food and Drug Administration (FDA), il convient de choisir la durée d'intervalle la plus longue proposée (par exemple, suspendre l'adalimumab sous-cutané pendant 2 semaines, bien qu'il puisse être administré toutes les 1 ou 2 semaines).

[#] La suspension des IgIV vise à maximiser l'efficacité du vaccin et non sa sécurité. Dans certaines situations, une durée de suspension plus courte pourra être envisagée.

