

Traiter la fièvre pendant la grossesse - Fiche conseil

- Il vous est conseillé de consulter rapidement devant toute fièvre survenant au cours de la grossesse.
- En cas de fièvre supérieure à 38 °C, les mesures suivantes peuvent contribuer à faire baisser votre température corporelle :
 - prenez du paracétamol toutes les 6 heures par voie orale si votre température est supérieure à 38 °C et/ou mal tolérée (**évittez les anti-inflammatoires et l'aspirine au cours de la grossesse**),
 - découvrez-vous en retirant quelques couches de vêtements,
 - prenez un bain d'eau tiède.
- Hydratez-vous en buvant de l'eau régulièrement.
- **Si l'un des signes suivants apparaît, consultez de nouveau en urgence un médecin ou rendez-vous aux urgences gynécologiques :**
 - douleurs dans le dos,
 - brûlures lorsque vous urinez,
 - perte de liquide au niveau vaginal,
 - perte de sang au niveau vaginal,
 - apparition de contractions utérines ou modification de leur intensité ou de leur fréquence,
 - diminution des mouvements du bébé.
- En cas de persistance de la fièvre plus de 24-48h après votre première consultation, il vous est également conseillé de consulter de nouveau, même en l'absence de ces signes.