

Traiter la pseudo-polyarthrite rhizomélisque (PPR) - Fiche conseil

La pseudo polyarthrite rhizomélisque (PPR) est une maladie inflammatoire chronique qui touche principalement les articulations des épaules et du bassin.

La PPR peut être invalidante au quotidien du fait des douleurs articulaires et de la fatigue, mais les symptômes disparaissent rapidement sous traitement.

Suivi médical

Le médecin traitant, éventuellement en lien avec un médecin spécialiste, fixera en fonction de vos symptômes le rythme du suivi (surveillance et examens médicaux). Ce suivi médical permet d'adapter au mieux votre traitement.

Si des nouveaux symptômes apparaissent entre deux rendez-vous de suivi, il est nécessaire de consulter rapidement :

- douleurs d'autres articulations, augmentation des douleurs actuelles,
- troubles de la vision,
- douleurs au ventre,
- fièvre > 38 °C.

Traitement

Le traitement consiste en une corticothérapie qui devra être poursuivie pendant au minimum 1 an.

Il ne faut jamais arrêter brutalement votre traitement par corticoïdes (risque d'insuffisance surrénale aiguë). Après avis de votre médecin, votre traitement sera progressivement diminué avant arrêt complet.

Des rechutes peuvent apparaître jusqu'à 10 ans après l'arrêt du traitement. Si les symptômes réapparaissent, consultez rapidement votre médecin.

Pour en savoir plus sur la pseudo polyarthrite rhizomélisque, **scannez le QR code.**



Information sur la PPR

SFR
Site



**Traiter la Pseudo Polyarthrite
Rhizomélisque**

SFR
Site