

Éviter les infections en cas d'asplénie (enfant) - Fiche conseil

La rate de votre enfant ne fonctionne pas correctement ou il n'a plus de rate, ce qui le rend plus vulnérable aux infections graves.

Cependant, il existe des mesures efficaces pour réduire ce risque.

Réduire le risque d'infection grave

- Si un traitement antibiotique préventif a été prescrit, veillez à ce qu'il soit pris tous les jours.
- **Assurez-vous que votre enfant soit à jour de ses vaccinations.** Notez bien que ses besoins en matière de vaccination peuvent être différents de ceux d'autres enfants. Discutez-en avec son médecin.
- Informez tous les médecins ou professionnels de santé qui voient votre enfant de son problème de rate (asplénisme).
- Avant de voyager à l'étranger avec votre enfant, parlez-en à un médecin. Certaines maladies (comme le paludisme) peuvent être particulièrement dangereuses pour lui.

En cas de fièvre

- **Ne prenez pas la fièvre à la légère. Consultez en urgence** (ou appelez le 15) devant toute fièvre, même si elle ne vous semble pas inquiétante.
- Dites au médecin que votre enfant a un problème de rate (asplénisme).
- Rappelez que dans son cas, si la cause de la fièvre n'est pas connue et en l'absence d'allergie aux antibiotiques, une antibiothérapie par céphalosporine de 3^e génération parentérale doit être débutée en urgence dès les prélèvements réalisés (vous pouvez également lui montrer cette page de conseils).

Si vous avez du mal à vous rappeler ces recommandations, gardez toujours une copie ou une photo de ces conseils avec vous. Vous pourrez la montrer à tout professionnel de santé qui prend votre enfant en charge.