

S'informer sur le traitement par finastéride - Fiche conseil

Le finastéride peut aider à ralentir la chute des cheveux. Pendant le traitement, certains effets indésirables peuvent survenir. Il est important de les connaître et de savoir comment réagir :

- En cas d'anxiété ou de tristesse, **arrêtez le finastéride et contactez votre médecin.**
- Chez 1 à 2 % des patients, une baisse du désir sexuel, des douleurs testiculaires, des troubles de l'érection ou de l'éjaculation peuvent survenir. Si ces symptômes apparaissent, parlez-en sans délai à votre médecin.
- Informez également votre médecin en cas de grosseur, de douleur ou d'écoulement au niveau d'un mamelon, ou en cas de démangeaisons, de rougeur ou de boutons inhabituels sur la peau.

Ces effets peuvent apparaître à des moments variables : quelques jours après le début du traitement comme plusieurs mois, voire années plus tard. Leur durée est également très variable d'une personne à l'autre. Ils disparaissent le plus souvent spontanément ou après l'arrêt du traitement, mais peuvent parfois persister, y compris après l'arrêt, et dans certains cas sans que leur durée puisse être prévue.

L'efficacité du traitement ne peut être réellement évaluée qu'après **6 mois**.

En cas d'arrêt, la chute de cheveux reprend progressivement et la situation revient à celle d'avant le traitement.

Le traitement ne peut être délivré en pharmacie que sur présentation d'une **ordonnance** et d'une **attestation d'information signée** par vous et votre médecin. Cette attestation est valable un an et doit être renouvelée chaque année.

Pour en savoir plus sur l'alopécie et le finastéride, **scannez les QR codes**.



Information sur l'alopécie

SFD
Site



L'utilisation du finastéride

ANSM
PDF