

Fiche conseils

- Reposez-vous au lit les premiers jours (jusqu'à diminution de la douleur).
- Portez un suspensoir testiculaire ou des slips serrés tant que la douleur persiste.
- Lors de rapports sexuels, utilisez un préservatif pendant au moins 7 jours, et jusqu'à la fin du traitement si celui-ci dure plus d'une semaine.
- Une réinfection est possible en cas de rapport non protégé, surtout si votre partenaire n'a pas été dépisté et/ou traité.
- De nombreuses infections sexuellement transmissibles nécessitent un prélèvement après la fin du traitement pour vérifier la guérison. Votre médecin vous indiquera si cela vous concerne.
- Dans la mesure du possible, informez vos partenaires sexuels récents de votre infection, afin qu'ils puissent se faire dépister et recevoir un traitement si nécessaire. Le site E-prev (QR-code) permet d'informer de manière anonyme et gratuite vos partenaires par SMS.

Il existe des gestes simples pour éviter la transmission des infections sexuellement transmissibles (IST).

- Pour vous protéger et protéger les autres, **utilisez un préservatif**.
- Sachez que **la contraception (pilule, spermicides, DIU, etc.) ne protège pas des IST**.
- **Faites-vous dépister** régulièrement si vous avez plusieurs partenaires et avant d'arrêter le préservatif avec un nouveau partenaire régulier (beaucoup d'IST ne provoquent aucun ou peu de symptômes).
- En cas de rapports sexuels à risque, la PrEP peut, dans certains cas, aider à réduire le risque de contamination par le VIH. Votre médecin pourra vous conseiller.

Où et comment vous faire dépister ?

- Vous pouvez vous faire dépister auprès de votre médecin traitant, d'une sage-femme, dans un centre de santé sexuelle (CEGGID, où le dépistage est gratuit et anonyme) ou dans un centre de santé.
- Vous pouvez aussi vous faire dépister (VIH, hépatite B, syphilis, chlamydia, gonorrhée) directement en laboratoire de biologie médicale, sans ordonnance et sans rendez-vous, grâce au dispositif Mon test IST.
- Ce dépistage est gratuit (100 % pris en charge, sans avance de frais) pour les moins de 26 ans. Au-delà, le test VIH reste gratuit et les autres sont remboursés par l'Assurance Maladie et votre complémentaire santé.
- Si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez également commander gratuitement un kit de dépistage à domicile sur le site Mon test-IST.

Si vous apprenez que vous êtes infecté :

- **Suivez votre traitement** prescrit par votre médecin jusqu'au bout,
- **Prévenez votre ou vos partenaires** afin qu'ils puissent aussi se faire dépister et, si nécessaire, être traités.

Il est possible de se faire **vacciner contre certaines IST** (hépatite B, papillomavirus). Parlez-en à votre médecin.

Pour en savoir plus, **scannez les QR codes**.

Les antibiotiques de la famille des fluoroquinolones (dont l'ofloxacine) peuvent entraîner des effets secondaires pouvant apparaître **jusqu'à 1 mois après l'arrêt du traitement**. En général, ces effets sont sans gravité et disparaissent à l'arrêt du traitement. Cependant, dans de rares cas, ces effets peuvent être graves ou irréversibles. Il vous est donc conseillé d'interrompre le traitement et de **contacter rapidement votre médecin dès l'apparition des symptômes suivants** :

- gonflement douloureux des tendons ou articulations,

- douleurs et/ou faiblesse inhabituelles au niveau des bras ou des jambes,
- palpitations ou sensation de battements du cœur irréguliers ou rapides,
- difficultés à respirer, gonflement des jambes,
- baisse de la vision ou apparition de tout autre trouble oculaire,
- rougeurs, irritations ou démangeaisons au niveau de la peau, notamment suite à une exposition au soleil ou aux rayonnements UV artificiels (lampe à bronzer, solarium...),
- **l'apparition de douleurs abdominales, thoraciques ou dorsales soudaines et intenses impose de contacter le 15 ou de se rendre immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.**



E-prev : informer vos
partenaires



Information sur les IST



Centres information,
dépistage, diagnostic



Mon test IST