

Fiche conseils

Les antibiotiques de la famille des fluoroquinolones (dont la lévofloxacine) peuvent entraîner des effets secondaires, pouvant apparaître **jusqu'à 1 mois après l'arrêt du traitement**. En général, ces effets sont sans gravité et disparaissent à l'arrêt du traitement. Cependant, dans de rares cas, ces effets peuvent être graves ou irréversibles. Il vous est donc conseillé d'interrompre le traitement et de **contacter rapidement votre médecin dès l'apparition des symptômes suivants** :

- gonflement douloureux des tendons ou articulations,
- douleurs et/ou faiblesse inhabituelles au niveau des bras ou des jambes,
- palpitations ou sensations de battements du cœur irréguliers ou rapides,
- difficultés à respirer, gonflement des jambes,
- baisse de la vision ou apparition de tout autre trouble oculaire,
- rougeurs, irritations ou démangeaisons au niveau de la peau, notamment suite à une exposition au soleil ou aux rayonnements UV artificiels (lampe à bronzer, solarium...).

L'apparition de douleurs abdominales, thoraciques ou dorsales soudaines et intenses impose de contacter le 15 ou de se rendre immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.

- Buvez suffisamment (au moins 1,5 L d'eau par jour).
- N'attendez pas trop longtemps avant d'uriner en cas de besoin.
- Essayez d'uriner régulièrement (toutes les 4 à 6 heures).
- Urinez après chaque rapport sexuel.
- Évitez l'utilisation de spermicide.
- Si vous souffrez de constipation ou de diarrhée, parlez-en à votre médecin.
- Si vous êtes une femme ménopausée, un traitement de l'atteinte génitale et urinaire de la ménopause pourra vous être proposé.

Pour plus de conseils, **scannez le QR code**.



Prévenir les infections
urinaires