

Fiche conseils

Suite au traitement, vos symptômes peuvent s'aggraver, ou de nouveaux symptômes peuvent apparaître (fièvre, maux de tête, éruption cutanée).

Ces symptômes sont transitoires et sans gravité. Ils peuvent être traités par la prise de paracétamol dans les doses prescrites.

Consultez de nouveau en cas de **symptômes sévères ou persistants**.

Il existe des gestes simples pour éviter la transmission des infections sexuellement transmissibles (IST).

- Pour vous protéger et protéger les autres, **utilisez un préservatif**.
- Sachez que **la contraception (pilule, spermicides, DIU, etc.) ne protège pas des IST**.
- **Faites-vous dépister** régulièrement si vous avez plusieurs partenaires et avant d'arrêter le préservatif avec un nouveau partenaire régulier (beaucoup d'IST ne provoquent aucun ou peu de symptômes).
- En cas de rapports sexuels à risque, la PrEP peut, dans certains cas, aider à réduire le risque de contamination par le VIH. Votre médecin pourra vous conseiller.

Où et comment vous faire dépister ?

- Vous pouvez vous faire dépister auprès de votre médecin traitant, d'une sage-femme, dans un centre de santé sexuelle (CEGGID, où le dépistage est gratuit et anonyme) ou dans un centre de santé.
- Vous pouvez aussi vous faire dépister (VIH, hépatite B, syphilis, chlamydia, gonorrhée) directement en laboratoire de biologie médicale, sans ordonnance et sans rendez-vous, grâce au dispositif Mon test IST.
- Ce dépistage est gratuit (100 % pris en charge, sans avance de frais) pour les moins de 26 ans. Au-delà, le test VIH reste gratuit et les autres sont remboursés par l'Assurance Maladie et votre complémentaire santé.
- Si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez également commander gratuitement un kit de dépistage à domicile sur le site Mon test-IST.

Si vous apprenez que vous êtes infecté :

- **Suivez votre traitement** prescrit par votre médecin jusqu'au bout,
- **Prévenez votre ou vos partenaires** afin qu'ils puissent aussi se faire dépister et, si nécessaire, être traités.

Il est possible de se faire **vacciner contre certaines IST** (hépatite B, papillomavirus). Parlez-en à votre médecin.

Pour en savoir plus, **scannez les QR codes**.

La syphilis est une maladie sexuellement transmissible. Il s'agit d'une infection bactérienne. Elle doit donc être traitée avec des antibiotiques. Il est important de bien suivre le traitement car l'évolution de la maladie peut être **dangereuse**.

Il est possible que votre partenaire soit également infecté.e sans le savoir. **Il est nécessaire que vous lui recommandiez de se faire dépister dans les plus brefs délais.**

La syphilis n'entraîne pas d'immunité protectrice, ce qui signifie qu'il est possible d'être de nouveau contaminé par la syphilis, même après en avoir déjà guéri une fois.

Afin de vous protéger et de protéger vos partenaires de la syphilis et d'autres infections sexuellement transmissibles, utilisez un préservatif durant vos rapports et faites-vous dépister régulièrement.

Pour en savoir plus sur la syphilis, **scannez le QR code.**



Information sur les IST



Centres information,
dépistage, diagnostic



Mon test IST



Information sur la syphilis