



Thérapies ciblées - Durée d'interruption des traitements avant un acte invasif

	Chirurgie à faible risque septique (orthopédique dont PTG/PTH, ophtalmologique, dermatologique, biopsies mammaires, acte invasif dentaire*, tatouage)	Chirurgie en milieu non stérile (digestive, uro-génitale, thoracique, tête et cou, chirurgie de foyer infectieux, piercing)	Endoscopies (digestives, respiratoires, génito-urinaires) avec ou sans biopsie
INFLIXIMAB IV	9 semaines	9 semaines	Interruption non nécessaire
INFLIXIMAB SC	3 semaines	5-10 semaines	
ADALIMUMAB	3 semaines	6-10 semaines	
ETANERCEPT	2 semaines	2 semaines	
CERTOLIZUMAB	3 semaines (5 si 400 mg)	6-10 semaines	
GOLIMUMAB	5 semaines	6-10 semaines	
TOCILIZUMAB IV	5 semaines	6-10 semaines	
TOCILIZUMAB SC	2 semaines	5-9 semaines	
SARILUMAB SC	3 semaines	9-15 semaines	
ABATACEPT IV	2- semaines		
ABATACEPT SC	2 semaines		
BARICITINIB	1 semaine		
TOFACITINIB	1 semaine		
RITUXIMAB IV	6 mois (idéalement, sinon 5 mois)		
BELIMUMAB IV	14 semaines		

* Hors : détartrage/acte de prévention non sanglant-soins conservateurs/pose ou ajustement d'appareils orthodontiques-de prothèses amovibles/soins prothétiques non sanglants/dépose de sutures...

USTEKINUMAB	15 semaines	
SECUKINUMAB	5 semaines	12-19 semaines
IXEKIZUMAB	5 semaines	6-9 semaines
ANAKINRA	Maintien ou arrêt 2 jours avant la chirurgie selon le type de chirurgie	
CANAKINUMAB	Programmer la chirurgie entre 2 injections	
Reprise du traitement		
Reprise de la thérapie ciblée après cicatrisation		
* Hors : détartrage/acte de prévention non sanglant-soins conservateurs/pose ou ajustement d'appareils orthodontiques-de prothèses amovibles/soins prothétiques non sanglants/dépose de sutures...		

(Adapté des fiches du CRI nov 2020)