Fiche conseils

• Les 2 premières injections du traitement seront effectuées à 4 semaines d'intervalle.

• Les injections suivantes seront effectuées **toutes les 8 semaines**.

• **Il est essentiel de ne pas réaliser les injections plus de 7 jours avant ou plus de 7 jours après la date prévue.**

Attention, une observance imparfaite du traitement compromet son efficacité.

• La prise de la PrEP doit s'accompagner de la poursuite d'autres mesures de prévention des infections sexuellement transmissibles (**préservatifs**, etc.).

• En cas de **rapport sexuel à risque et d'observance imparfaite** du traitement, **consultez immédiatement** afin d'éventuellement entreprendre un **traitement post-exposition**.

• **Ne prenez pas** d'autre traitement sans en parler à votre médecin, du fait du risque d'interactions.

• Vous risquez de constater l'apparition d'effets indésirables tels que des maux de tête ou des réactions au site d'injection (douleur, rougeur, démangeaisons). Ces symptômes disparaissent généralement avec le temps. **Consultez votre médecin immédiatement en cas de symptômes sévères ou persistants, ou en présence de signes pouvant évoquer une réaction allergique**, comme l'apparition de plaques sur la peau, de boutons ou d'un œdème en dehors du site d'injection, ou encore l'apparition de démangeaisons diffuses, d'une fièvre, de douleurs musculaires ou articulaires, ou d'une fatigue importante et inhabituelle.

Scannez le QR code pour accéder à une vidéo de démonstration de la technique d'injection en Z, à faire pratiquer par l'infirmière ou l'infirmier.

Technique d'injection en Z