IOIF-s *

Tenk deg at du er i situasjoner som beskrevet nedenfor. Marker med å sette et kryss i ruten for det svaret som passer best for deg. Sett bare et kryss for hvert punkt.

Hvor redd er du...

	Ikke redd i det hele tatt	Bare litt redd	Ganske redd	Svært redd	Livredd
1. når tannlegen sier at du trenger en bedøvelsessprøyte	☐	☐	☐	☐	☐
2. når du kjenner stikket av bedøvelsessprøyten i munnen	☐	☐	☐	☐	☐
3. når tannlegen smører bedøvelsessalve på tannkjøttet	☐	☐	☐	☐	☐
4. for selve bedøvelsesvæsken (bedøvelsesmiddelet)	☐	☐	☐	☐	☐
5. når du ser bilde av en person som får bedøvelse hos tannlegen	☐	☐	☐	☐	☐
6. når du hører noen fortelle at de har fått bedøvelse hos tannlegen	☐	☐	☐	☐	☐
7. for at stikket skal være veldig smertefullt	☐	☐	☐	☐	☐
8. når du sitter i tannlegestolen og snart skal få en bedøvelsessprøyte	☐	☐	☐	☐	☐
9. når du kjenner at du blir nummen (bedøvet)	☐	☐	☐	☐	☐
10. for at bedøvelsen ikke skal virke	☐	☐	☐	☐	☐
11. når du ser nålen på en bedøvelsessprøyte	☐	☐	☐	☐	☐
12. når du ser bilde av en tannlegesprøyte	☐	☐	☐	☐	☐

* The abbreviated heading was not present in the original questionnaire