



کاشتن دندان

ایمپلنت های دندانی میتوانند بدل یک یا چند دندان از دست رفته شوند. در اینجا میتوانید معلومات بیشتری در مورد ایمپلنت پوشش ها، ترمیم و نگه داری و چیزهای دیگری که در مورد آن سوال و پرسانی داشته باشید، کسب نمایید.

کاشتن دندان چیست؟

ایمپلنت دندان شبیه سازی مصنوعی از ریشه دندان است که در استخوان فک قرار داده شده است. در بالای این ایمپلنت، داکتر دندان میتواند تاج، بریج، یا دندان مصنوعی قرار دهد تا جای دندان های از دست رفته را بگیرد. ایمپلنت خودش بطور معمول از تیتانیوم ساخته میشود و شبیه پیچ است. ایمپلنت میتواند در اندازه های مختلف باشد و باید در استخوان پیچ شود قبل از اینکه ساختار بالایی را بتوان ساخت و روی آن قرار داد.

چه زمانی ایمپلنت مورد ضرورت است؟

ایمپلنت ها میتوانند بدل دندان هایی شوند که به دلیل کار، مریضی، جراحات یا طبیعی (در نیامدن) از دست رفته اند. در صورتیکه شمار زیادی از دندان هایتان را از دست داده اید، داکتر دندان تان ممکن است ایمپلنت های متعددی را قرار دهد که میتواند محل اتصال یک بریج یا دندان مصنوعی را فراهم نماید.

چه کسی میتواند ایمپلنت انجام دهد؟

تداوی ایمپلنت یک روش تداوی شناخته شده است که بسیاری از مردم میتوانند از آن بهره مند شوند. اکثر افرادی که فاقد یک یا چند دندان هستند را میتوان تداوی کرد، لیکن استخوان بیش از حد کم در فک، مریضی و یا مصروف سازی دوا میتواند امکانات تداوی با ایمپلنت را محدود بسازد. معاینه کامل به توسط داکتر دندان میتواند بهتان پاسخ بدهد ایمپلنت یا تداوی های سائر بهترین راه برای بدل کردن دندان های از دست رفته تان خواهد بود یا نخیر.

ایمپلنت تا چه مدت عمر میکند؟

ایمپلنت میتواند برای مدت زمان بسیار طولانی و در بهترین حالت، یک عمر قابل استفاده است. اینکه یک ایمپلنت چه مدت عمر میکند بطور کامل به کاری که جهت ترمیم و نگهداری آن انجام میشود بستگی دارد. کار روزانه مهم ترین مورد است و با تمیز کردن خوب، ایمپلنت یک عمر قابل استفاده خواهد بود.

این تداوی بدین صورت ارائه میگردد

1. معاینه کامل، که به شمول اشعه ایکس و تصویر های فک است.
2. ایمپلنت به استخوان فک عمل میشود و ضرورت به زمان جهت بهبود دارد که بطور معمول از 3 تا 6 ماه برای محکم شدن پیچ ها زمان میبرد.
3. گاهی اوقات ایمپلنت زیر لثه پنهان شده است در حالی که آرو به بهبود میباشد. در این مورد، یک عمل خورد مورد ضرورت است تا افزونه ای را از طریق لثه ها جای گذاری نمود.
4. پس از اینکه ایمپلنت بطور کامل در فک بهبود یافت، داکتر دندان تصویربرداری هایی انجام خواهد داد که به یک تکنیسین دندان روان میشود؛ وی با استفاده از آن یک تاج، بریج یا دندان مصنوعی میسازد.
5. داکتر دندان ساختار بالایی آماده (تاج، بریج یا دندان مصنوعی) را به ایمپلنت در دهان متصل مینماید.
6. معاینه هایی توسط داکتر دندان یا متخصص صحتی دندان.

ایمپلنت چه هزینه هایی دارد؟

این هزینه ها البته بسیار متفاوت است، بسته به اینکه چه نمیری از دندان ها و کدام مورد از آنها باید بدل شوند یا اینکه نوعیت تداوی مورد انتخاب شما چیست. شما حق دارید که یک تخمین هزینه مشخص توسط داکتر دندان خود داشته باشد. بدل کردن یک دندان با ایمپلنت تا حدودی گران تر از بدل کردن آن با یک بریج سنتی است، لیکن شما از ضرورت سایش دندان های همسایه اجتناب مینمایید. در موارد خاص، شما میتوانید بازپرداخت تامین اجتماعی برای کار ایمپلنت دریافت نمایید. داکتر دندان میتواند معلوماتی در مورد قوانینی که اعمال میشود و اینکه چه حقوقی دارید، فراهم نماید

خود فرد باید چه کاری انجام دهد؟

- تمام معلومات صحتمندی خود را به داکتر دندان تان بدهید، بناء تداوی میتواند با خیال راحت انجام شود. سپس این داکتر میتواند ارزیابی کند شما حق دریافت بازپرداخت تامین اجتماعی را دارید یا نخیر.
- طرز العمل های خود را قبل، طی، و پس از عمل جراحی دنبال نمایید تا بهترین نتایج تداوی را داشته باشید.
- ایمپلنت دقیقاً مانند دندان خودتان ضرورت به تمیز کردن خوب دارد. جمع شدن باکتری ها در امتداد لثه ها و در تاج باید صبح و عصر رفع شود. بر علاوه بر ابراش منظم خودتان، شما باید بر ابراش بین دندانی و/یا خلال دندان در صورت امکان مصروف نمایید.
- اجتناب از سگرت کشیدن و یا استفاده دود آن قبل، طی، و پس از قرار دادن ایمپلنت.

ترمیم و نگهداری ایمپلنت

- ایمپلنت ها سرمایه گذاری در صحتمندی دندان تان استند و ضرورت به ترمیم و نگهداری کامل دارند تا مدت زمان زیادی قابل مصروف سازی باشند.
- از داکتر دندان و متخصص صحتی دندان خود بخواهید طرز العمل تمیز کردن ارائه دهند و از ایشان رهنمایی هیی در مورد ترمیم و نگهداری روزانه دریافت نمایید. مهم ترین کار ترمیم و نگهداری روزانه است.
- ایمپلنت ها باید بطور منظم توسط داکتر دندان یا متخصص صحتی دندان تان درست مانند دندان های خودتان معاینه شوند.
- در صورتیکه سگرت میکشیدید، ریسک رو به افزایشی وجود دارد که ایمپلنت ممکن است شل شده و ضرورت به برداشتن آن وجود داشته باشد.