



ID номер:.....

Направление за изследване на микробиом и метаболити

Име (на Български език):

Име (на латиница):

Дата на раждане: Дата на посещение:

Телефон/ GSM:

Повод за изследването:

Назначени изследвания (Попълнете задължително!):

Насочен от:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОПЪЛВА!

☐ Декларирам, че СЪМ прочел всички инструкции и СЪМ ги спазил при взимане на пробата.

☐ Декларирам, че НЕ съм прочел инструкциите и НЕ съм ги спазил при взимане на пробата. На своя отговорност държа анализът да бъде изработен. Съгласен съм, че лабораторията НЕ носи отговорност при неправилно взет материал.

Подпис на пациента:

Давам съгласието си Лаборатория „Геника“ да оперира с личните ми данни във връзка с диагностичното изследване.

Подпис на пациента:



Инструкции за взимане на ВТОРА сутрешна урина – за изследване на метаболити

Какво съдържа комплекта (T908/928):

1. Транспортен външен контейнер – черен.
2. **Вътрешен прозрачен специален контейнер** със стабилизатор.
3. Пипета за прехвърляне на урината.

Ще Ви е необходим и допълнителен контейнер, за първоначално взимане на урината, който може да бъде взет и от аптека.

Препоръчва се денят преди пускане анализ за невротрансмитери, **ДА НЕ СЕ ПРИЕМА** риба и рибни продукти.

При ниско рН на урината, могат да се приемат ферментирани храни като кисели краставички, туршия и др.

Начин на взимане на пробата:

1. Първата урина, която отделяте сутрин (т.е. веднага след събуждане –), **трябва да се изхвърли**.
2. Вземете пробата от **следващото уриниране** – втора сутрешна урина, в обикновен контейнер за урина.
3. **ВЕДНАГА** след отделянето прехвърлете урината във **вътрешния прозрачен контейнер** със стабилизатор (**Test set 908/928**), с помощта на предоставената пипета. Контейнерът трябва да е пълен ! **Не изхвърляйте** стабилизатора под формата на кръгло тампонче!
4. Прехвърлената урина може да се съхранява в хладилник не повече от 2 дни преди да бъде занесена в лабораторията.

N.B. Урината **НЕ** трябва да бъде предизвикана, да **НЕ СЕ** пие вода преди взимане на пробата.

Ако пациентът е ходил до тоалетна през нощта, може да се вземе и първата урина след ставане от сън.