

## **CAROLINA FAMILY HEALTH CENTERS, INC.**

Carolina Family Dental Center • Freedom Hill Community Health Center • Harvest Family Health Center • Wilson Community Health Center

### **Instrucciones para el paciente acerca de la administración de óxido nitroso**

#### **Las instrucciones preoperatorias para el óxido nitroso son las siguientes:**

Puede comer algo ligero hasta dos (2) horas antes de la cirugía (por ejemplo, tostadas, rosquillas, frutas, panecillos)

Puede tomar líquidos transparentes hasta el momento de su cita.

El día de la cita, está permitido que el padre/madre o tutor esté en la habitación durante el procedimiento y, en la mayoría de los casos, esto es algo positivo. Nuestro personal prefiere que no haya muchas personas en la sala porque pueden distraer al paciente y el gas no funcionará tan bien como lo hace normalmente.

Durante el procedimiento, se recomienda hablar lo mínimo. Cuando la habitación está tranquila y relajada, el paciente puede inhalar mejor el gas y, como resultado, tener una experiencia más fácil. Espere al menos cinco minutos después de completar el tratamiento para preguntarle al paciente cómo fue su experiencia.

Si el paciente experimenta congestión nasal y / o dificultad para respirar el día de su cita, se recomienda reprogramar la cita hasta que el paciente pueda respirar adecuadamente por la nariz.

#### **Las instrucciones postoperatorias para el óxido nitroso son las siguientes:**

Al final del procedimiento, se administrarán varios minutos de oxígeno y los efectos del óxido nitroso disminuirán. La mayoría de los pacientes también reciben anestesia local con el nitroso para adormecer el área deseada. Es importante que el paciente no muerda, rasque ni succione el área adormecida. Los pacientes, especialmente los niños, ocasionalmente se muerden los labios, las mejillas o la lengua mientras el área está adormecida, lo que puede provocar una úlcera dolorosa o hinchazón cuando desaparece el adormecimiento.

Se recomienda que los pacientes eviten comer durante al menos una (1) hora después de que desaparezca el adormecimiento para evitar lesiones por mordeduras traumáticas. Los pacientes pueden beber líquidos inmediatamente después del procedimiento, siempre que se tenga precaución con los tejidos adormecidos.

Por favor llame a Carolina Family Dental Center si tiene alguna pregunta al (252) 443-7764.