

AKTUELLE DRUG CHECKING ERGEBNISSE

Jänner 2026 (1/2)

In Vorarlberg wurden im Jänner 8 Proben analysiert. Die Ergebnisse können folgend zusammengefasst werden:

- ▶ Von den **6 Kokain-Proben**, die zur Analyse gebracht wurden, waren 6 Proben mit über 80 % Wirkstoffgehalt extrem hochdosiert. Eine Probe enthielt neben dem erwarteten Kokain zusätzlich Procain.
- ▶ Die abgegebenen **LSD**-Proben konnte LSD detektiert werden.
- ▶ Eine Probe die als **Research Chemical / unbekannte Kapsel** abgegeben wurde enthielt Polyethylenglykole und **nicht identifizierbare Substanzen!**

Wenn du dich trotz dieser aktuellen Ergebnisse zum Konsum gefährlicher Substanzen entscheidest, beachte die folgend angeführten Gefahrenhinweise, die ohne Gewähr zur Verfügung gestellt werden:

Als **Kokain** zur Analyse gebracht

Tatsächliche Inhaltsstoffe:

- Kokain 990 mg/g (=99,0 % Wirkstoffgehalt)*
- Kokain 948 mg/g (=94,8 % Wirkstoffgehalt)*
- Kokain 942 mg/g (=94,2 % Wirkstoffgehalt)*
- Kokain 937 mg/g (=93,7,0 % Wirkstoffgehalt)*, Procain 63 mg/g (=6,3 % Wirkstoffgehalt)
- Kokain 923 mg/g (=92,3 % Wirkstoffgehalt)*
- Kokain 845 mg/g (=84,5 % Wirkstoffgehalt)*

*Achtung hochdosiert! Ab 800 mg/g = 80% Wirkstoffgehalt gilt die Substanz als hochdosiert. Der Grenzwert beruht auf den durchschnittlich am Markt üblichen Dosierungen!

Kokain verursacht ein euphorisches Gefühl, das von gesteigerter Aufmerksamkeit, Unruhe, Erregung und dem Drang nach Bewegung begleitet wird. Gedanken beginnen zu rasen, Konsument*innen reden viel und schnell, häufig schweifen sie ab und produzieren unzusammenhängende Äußerungen. Gesteigerte Selbstsicherheit kann in **Leichtfertigkeit und Selbstüberschätzung** übergehen. Häufiger Konsum kann rasch zu **starker psychischer Abhängigkeit** führen. Kokain unterdrückt Hunger, Durst und Müdigkeit. Hohen Dosierungen können Angst und Wahnzustände auslösen. Auf körperlicher Ebene können Muskelkrämpfe bzw. -zittern, Herzrasen, Herzrhythmusstörungen, Blutdruckprobleme und eine Zunahme der Atemfrequenz auftreten. In extremen Fällen kann Kokainkonsum zum Herzstillstand führen. Beim Runterkommen von Kokain wird der euphorische Zustand häufig von depressiven Verstimmungen, Gereiztheit, Angstgefühlen und dem Wunsch mehr zu konsumieren abgelöst. Quelle: www.checkit.

wien [02.06.2024]

AKTUELLE DRUG CHECKING ERGEBNISSE

Jänner 2026 (2/2)

Procain ist ein Lokalanästhetikum. Es gibt Hinweise darauf, dass die Kombination von Kokain mit Lokalanästhetika wie Procain oder Lidocain das Herz wesentlich stärker schädigt als Kokain alleine. Vor allem bei User*innen mit Vorerkrankungen des Herzkreislaufsystems ist das Risiko für das Auftreten von Herzrhythmusstörungen und Herzinfarkt deutlich erhöht. Der intravenöse Konsum von Kokain mit Lokalanästhetika ist besonders riskant. Quelle: www.checkit.wien [04.06.2025]

Als **LSD** zur Analyse gebracht

Tatsächliche Inhaltsstoffe:

- LSD 80 µg / Probe
- LSD 30 µg / Probe

Bei der **Dosierung** auf saugfähigem Papier („**Blotter**“) wird die Lösung meist auf einzelne quadratische Papierabschnitte getropft. Hier kann es passieren, dass die Verteilung des Wirkstoffes auf den einzelnen Blotter unterschiedlich sein kann. Somit kann es je nach Blotter zu Falsch- bzw. Überdosierungen kommen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Abweichung in vielen Fällen (extrem) groß ist, weshalb wir auf die folgende Information verweisen:
<https://checkit.wien/falsche-dosisangaben-bei-ld-trips-ergebnisse-einer-befragung/>

Als **Research Chemical** zur Analyse gebracht

Tatsächliche Inhaltsstoffe:



Substanzdetails: **unbekannte Kapsel | Research Chemical**
Farbe: **rot**

Diese Probe enthält **Polyethylenglykole** welche in der Medizin zum Beispiel als Macrogol für Verstopfungen angewendet wird. Neben den detektierten Polyethylenglykolen enthielt die Probe **nicht identifizierbare Substanzen!**