



Gastrosopia → Informazioni e consenso

Nome e cognome

Data di nascita

La preghiamo di leggere attentamente il foglio informativo subito dopo averlo ricevuto. Riempia il consenso informato, metta la data e firmi il documento possibilmente il giorno prima dell'esame.

Perchè si esegue una gastroscopia?

Durante una gastroscopia vengono ispezionati l'esofago, lo stomaco ed il duodeno. In questo modo è possibile diagnosticare delle malattie di questi organi, eseguire parzialmente dei Trattamenti e quindi controllare l'evoluzione di malattie conosciute.

Come si svolge la gastroscopia?

Si posiziona dapprima un'infusione in una vena del braccio per poter somministrare dei sedativi. L'esame viene eseguito con l'aiuto di uno strumento flessibile dotato all'estremità di una luce e di una telecamera. Con questo strumento il medico può ispezionare la mucosa degli organi in questione cercando alterazioni. Nel caso vengano trovate delle lesioni, è possibile eseguire dei prelievi di tessuto che verranno poi analizzati in un laboratorio. Nel caso si trovassero dei polipi (lesioni normalmente benigne ma che potrebbero degenerare in tumore maligno nel corso degli anni) questi verranno se possibile tolti.

Che cosa si sente?

Durante l'esame vengono somministrati analgesici e sedativi. Questi medicinali permettono di eseguire l'esame senza dolori.

Come ci si deve preparare per una gastroscopia?

La preghiamo di non assumere più cibi solidi al minimo 6 ore prima del esame. È permesso di bere liquidi chiari senza grassi (non latte) fino a 3 ore prima dell'esame. La preghiamo inoltre di non assumere medicinali poco prima dell'esame e di seguire scrupolosamente le istruzioni per la preparazione. Se dovesse assumere anticoagulanti (Sintrom, Marcoumar, Xarelto ecc.) per fluidificare il sangue, la preghiamo di discutere col suo medico curante l'eventuale sospensione dei medicinali. Lo stesso procedimento vale per pazienti col diabete.

Quali rischi comporta una gastroscopia?

La gastroscopia stessa, il prelievo di tessuti sono a basso rischio di complicazioni. Malgrado l'esame venga eseguito con la massima accuratezza è comunque possibile che in alcuni casi rari vi siano delle complicazioni. In casi eccezionali queste potrebbero mettere la vita in pericolo. Possibili complicazioni sono sanguinamenti (0,5 – 3%) che normalmente si presentano subito dopo l'asportazione di polipi e che possono essere fermati endoscopicamente. Raramente è possibile che succedano dei sanguinamenti differiti nella prima settimana dopo l'intervento. Molto raramente (0,3 – 0,5%) si osservano delle lesioni della parete intestinale (perforazioni) che nel caso peggiore potrebbero comportare l'esecuzione di un'operazione. La somministrazione di sedativi potrebbe in rari casi indurre un disturbo della funzione respiratoria o cardiaca.

Come puo contribuire a mantenere i rischi al minimo: Seguendo esattamente le istruzioni per la preparazione e rispondendo in modo completo alle domande che seguono qui sotto:

Questionario

Assume regolarmente anticoagulanti per rendere fluido il sangue (per esempio: Marcoumar, Xarelto, Plavix, Eliquis, Pradaxa, Effient) oppure ha assunto negli ultimi 7 giorni Aspirina, Alcacyl, Tiatral, Clopidogrel ecc. Oppure medicinali contro l'influenza o antidolorifici (Ponstan, Voltaren, Brufen) o antireumatici? si no
Se si quali?

Soffre di ematomi o piccoli sanguinamenti sulla pelle senza ferite evidenti? Oppure sanguinamento prolungato o severo durante o dopo un trattamento dentario? si no

Soffre di allergie (medicamenti, lattice, anestetici locali o cerotti)? Se si quali? si no

È incinta oppure esiste la possibilità che vi sia una gravidanza in corso? O sta allattando? si no

Soffre di epilessia? O è portatore di un pace-maker? si no

Ha i denti instabili, una protesi dentaria o una malattia dei denti? si no

Quali medicinali prende regolarmente?

Come mi comporto dopo la gastroscopia?

Dato che le verranno somministrati analgesici o sedativi, non potrà condurre un autoveicolo per minimo 12 ore e non puo fare dei lavori pericolosi! Inoltre non potrà firmare documenti con valenza legale. Nel caso sia stata eseguita un'anestesia locale della gola con lo spray, non potrà mangiare o bere per almeno un'ora. Dopo la gastroscopia è possibile che lei abbia la sensazione di gonfiore. Se questa sensazione dovesse aumentare o dovessero sopraggiungere altri sintomi, sanguinamenti, capogiri, nausea, vomito o febbre, si rivolga immediatamente al suo medico curante oppure, a noi o al pronto soccorso.

Prelievo di tessuti

Il prelievo di tessuti e la polipectomia sono a basso rischio di complicazioni. I prelievi verranno mandati a un laboratorio specializzato, dal quale riceverà una fattura separata che puo mandare alla sua assicurazione. I risultati saranno mandati al suo medico di casa (e a noi) entro 3 – 4 giorni e potrà informarla.

Se dovesse avere ulteriori domande

Non esiti a contattare il suo medico di casa o noi.

Il/La sottoscritto/a conferma di aver letto e compilato il questionario in maniera completa e veritiera

Luogo, data

Nome paziente

Firma paziente