



LISITROL-A

AMLODIPINA + LISINOPRIL

TABLETA

COMPOSICION:

LISITROL-A 5/10:

Lisinopril 10 mg
Amlodipina 5 mg
Excipientes, c.s.p. 1 Comprimido

LISITROL-A 20/5:

Lisinopril 20 mg
Amlodipina 5 mg
Excipientes, c.s.p. 1 Comprimido

LISITROL-A 20/10:

Lisinopril 20 mg
Amlodipina 10 mg
Excipientes, c.s.p. 1 Comprimido

PROPIEDADES:

El Lisitrol A es un antihipertensivo que combina el Besilato de amlodipina (calcio antagonista) y Lisinopril (inhibidor de la ECA).

La Amlodipina es un antagonista del calcio que inhibe el flujo transmembrana de los iones calcio hacia el interior del músculo liso y cardíaco. Esto trae como consecuencia vasodilatación con caída de la resistencia vascular periférica lo que incide en la disminución de la presión arterial y de la fuerza que se opone al vaciado cardíaco (post-carga) facilitando el mismo; lo cual disminuye el trabajo del corazón, su consumo metabólico y mejora el equilibrio oferta demanda de oxígeno en el paciente anginoso. También provoca relajación del músculo liso de las coronarias aumentando el flujo sanguíneo miocárdico favoreciendo tanto en la angina de esfuerzo como en la angina por vasoespasmio coronario.

El Lisinopril es un inhibidor de la ECA, su acción principal es inhibir uno de los mecanismos que mantiene la vasoconstricción, reduciendo de esta forma la presión arterial. Actúa en una sola dosis durante 24 horas, no requiere metabolización previa para ser activo como el enalapril, tampoco es alterado por los alimentos como pasa con el captopril.

El uso de esta combinación potencia los efectos reductores de la presión sanguínea elevada, disminuyendo los posibles efectos adversos. Las características farmacocinéticas del Lisitrol A son semejantes a las de las sustancias de la combinación administradas por separado.

INDICACIONES:

Está indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial de moderada a severa.

CONTRAINDICACIONES:

El uso de Lisitrol A está contraindicado para los pacientes que manifiesten hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.

No se recomienda utilizar este producto en el embarazo. No se ha estudiado la seguridad y efectividad del Lisitrol A en niños y durante la lactancia.

DOSIFICACION:

Administrar un comprimido vía oral, una vez al día. En casos que con esta dosis no se logre descender los niveles elevados de la presión sanguínea, después de una semana se incrementará la dosis según consideraciones del facultativo.

REACCIONES ADVERSAS:

Se han reportado reacciones adversas leves y de tipo transitorio. La ocurrencia de tos y edema es menor que la observada cuando se utilizan los inhibidores de la ECA solos. Entre los efectos adversos se han presentado mareos, somnolencia, cefalea, sensación de fatiga, náuseas y ligera taquicardia.

ADVERTENCIAS:

Este medicamento no está diseñado para ser utilizado como terapia inicial, en el manejo de la hipertensión sanguínea.

PRESENTACION:

LISITROL-A 5/10: Caja por 30 Comprimidos.
LISITROL-A 20/5: Caja por 30 Comprimidos.
LISITROL-A 20/10: Caja por 30 Comprimidos.

Venta bajo prescripción médica.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar en lugar fresco y seco entre 25-30°C.

Registros Sanitarios.:

LISITROL-A 5/10.: 2006-0564
LISITROL-A 20/5.: 2015-0856
LISITROL-A 20/10.: 2015-0857

Actualizado: JULIO/2016

N.M



Fabricado por:

Laboratorios ALFA, SRL

República Dominicana
www.laboratoriosalfa.com
Reg. Industrial: 13880