



INSECTICIDA DE USO AGRÍCOLA
Gránulos dispersables - WG

No. de Registro ICA: PL0000552026
Titular del registro: CIBOCHEM S.A.S

01 Composición

02 Precauciones y advertencias de uso

03 Primeros auxilios

04 Manejo y disposición de desechos

05 Medidas para la protección del ambiente

06 Modo de acción

07 Mecanismo de acción

08 Modo de empleo

09 Frecuencia y época de aplicación

10 Equipos y volumen de mezcla

11 Compatibilidad y fitotoxicidad

12 Presentaciones

01 Composición

Ingrediente activo:	Contenido:
Indoxacarb	300 g/kg
Methyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e] [1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4'-(trifluoromethoxy)carbanilate	
Ingredientes aditivos	c.s.p. 1 Kg

02 Precauciones y advertencias de uso

"NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO
PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER
ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS"

- No ingiera alimentos, beba ni fume durante la manipulación y la aplicación.
- Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Use overol ajustado en el cuello y muñecas, guantes de caucho, botas y gorra lavable para la manipulación del producto.
- Lavarse las manos y la piel expuesta con agua y jabón después de utilizar el producto. Lavar la ropa protectora con agua y jabón.
- No contamine quebradas, ríos o fuentes de agua, ni prepare el producto cerca de las mismas.
- No se debe transportar ni almacenar con productos de consumo humano o pecuario.
- El producto debe almacenarse en bodegas especiales lejos de casas de habitación en los envases originales, bien cerrados y en un lugar fresco lejos de alimentos, forrajes, semillas, ropa o animales

Importado y distribuido por:

Cibochem



PROTECCIÓN

03 **Primeros auxilios**

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro de asistencia médica y entregue copia de la etiqueta.

NO INDUZCA EL VÓMITO. "En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón". No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS: CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

04 **Manejo y disposición de desechos**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión

05 **Medidas para la protección del ambiente**

"EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS"
"RESPECTAR LAS FRANJAS DE SEGURIDAD CON RELACIÓN A CUERPOS DE AGUA"

"NO CONTAMINAR LAS FUENTES DE AGUA CON LOS RESTOS DE LA APLICACIÓN O SOBRANTES DEL PRODUCTO, DESECHOS O ENVASES VACÍOS"

"ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS"
"PUEDE MATAR INSECTOS POLINIZADORES"

"NO APLICAR ESTE PRODUCTO EN PRESENCIA O ACTIVIDAD DE INSECTOS POLINIZADORES O EN ÉPOCA DE FLORACIÓN"

- Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre
- Nocivo para la fauna benéfica
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Tener en cuenta las franjas de seguridad de 10 metros con relación a cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal

06 Modo de acción

ESEOESE 300 WG es un insecticida que actúa por ingestión y por contacto.

07 Mecanismo de acción

ESEOESE 300 WG interrumpe el impulso nervioso, al bloquear los canales de sodio. Ello impide el flujo de cationes responsable de crear el diferencial eléctrico necesario para que se lleve a cabo la transmisión del impulso nervioso, provocando la paralización de los insectos.

08 Modo de empleo

Cultivo	Plaga	Dosis	P.R.	P.C	LMR
Tomate	Gusano cogollero (<i>Tuta absoluta</i>)	0.2 Kg/Ha	4 horas	1 día	0.5 mg/kg

P.C. Período de Carencia. P.R. Período de Reentrada. LMR: Límite máximo de residuos.

09 Frecuencia y época de aplicación

Aplique una vez por ciclo de cultivo o cosecha, dentro de un programa de manejo integrado de plagas (MIP) una vez alcanzados los umbrales de control químico. Rote con otros productos de diferente modo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de la resistencia. Realice la aplicación con la dosificación recomendada y dirigida al follaje.


10 Equipos y volumen de mezcla

Agregue la dosis total del producto a la mitad del volumen de agua recomendado, agite y agregue el resto del volumen de agua. Para aplicaciones terrestres se recomienda un volumen de mezcla de 200 L/Ha.

11 Compatibilidad y fitotoxidad

ESEOESE 300 WG es compatible con la mayoría de los productos utilizados en el control fitosanitario, en caso de duda realizar pruebas previas.

ESEOESE 300 WG no es fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas, con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.



Nocivo en caso de Ingestión / Nocivo en contacto con la piel / Nocivo si se inhala / Muy tóxico para organismos acuáticos

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4

LIGERAMENTE PELIGROSO

PELIGRO

