

Guías de detección del cáncer colorrectal

para personas con riesgo promedio



45–75 años de edad

Hágase la prueba.

Se pueden usar varios tipos de pruebas. Hable con su médico sobre qué opción es adecuada para usted.

Independientemente de la prueba que elija, lo más importante es que la realice periódicamente.

76–85 años de edad

Hable con su médico

Sobre si debe continuar haciéndose pruebas de detección. Al decidir, tenga en cuenta sus propias preferencias, su estado general de salud y su historial de pruebas de detección anteriores.

Mayor de 85 años de edad

Ya no debe hacerse pruebas de detección.

Las personas mayores de 85 años de edad ya no deberían hacerse pruebas para la detección del cáncer colorrectal.

Opciones de pruebas de detección

- Los exámenes visuales, como la colonoscopia o la colonografía por tomografía computarizada (CT, por sus siglas en inglés), examinan el interior del colon y el recto en busca de pólipos (crecimientos) o cáncer.
- Las pruebas en heces buscan signos de cáncer en las heces y se pueden realizar en casa. Estas pruebas incluyen la prueba inmunoquímica fecal (FIT, por sus siglas en inglés), la prueba de sangre oculta en heces (FOBT, por sus siglas en inglés) y la prueba de ADN en heces de múltiples objetivos.
- Se debe dar seguimiento a todos los resultados anormales en las pruebas que no sean colonoscopias con una colonoscopia de manera oportuna.
- Las personas con antecedentes familiares de pólipos o cáncer colorrectal, o que tienen otros factores de riesgo, podrían necesitar comenzar a hacerse pruebas de detección antes de los 45 años de edad, hacerse pruebas de detección con mayor frecuencia y/o hacerse pruebas específicas.

Las pruebas de detección del cáncer salvan vidas. Hágase la prueba.

Visite: cancer.org/haztelaprueba para consultar las preguntas frecuentes sobre la detección del cáncer, incluida información sobre cómo programar una prueba de detección, cómo pagar las pruebas de detección con o sin seguro médico, y más.