فقيه
مجموعة فقيه للرعاية الصحية
Fakeeh Care Group

فقيه
د. سليمان فقيه | الأكاديمية
Dr. Soliman Fakeeh | Academy



استئصال البروستاتا عبر الإحليل

استئصال البروستاتا عبر الإحليل

ما هو استئصال البروستاتا عبر الإحليل ؟
هو إجراء لإزالة جزء من غدة البروستاتا عندما تتضخم وتعيق تدفق البول. يجرى عبر مجرى البول باستخدام منظار وحلقة سلكية ساخنة.

لماذا يتم إجراء العملية ؟
لتخفيف أعراض التبول مثل ضعف تدفق البول، أو الحاجة للشد أثناء التبول، أو عدم تفريغ المثانة بالكامل، أو التبول المتكرر.

كيف تتم العملية:
١. تُجرى تحت تأثير تخدير نصفي أو عام.
٢. يتم إدخال منظار عبر مجرى البول الطبيعي إلى المثانة.
٣. يُزال الجزء الداخلي من البروستاتا باستخدام حلقة حرارية.
٤. يُوضع قسطرة لتصريف البول و إخراج أي دم منه.

بعد العملية:
١. قد تحتاج للبقاء في المستشفى من 1 إلى 3 أيام.
٢. عادةً تُزال القسطرة بعد 1 إلى 7 أيام.
٣. قد تشعر بحرقة مع التبول أو حاجة متكررة للتبول لعدة أيام .
٤. من الطبيعي وجود دم في البول و سيختفي تدريجيًا.

المخاطر المحتملة:
١. لا يخرج المني مع القذف (يذهب السائل المنوي إلى المثانة).
٢. أعراض بولية مؤقتة : حرقة مع التبول، إلحاح التبول.
٣. وجود دم مع البول أو عدوى.
٤. نادرًا جدا : ضعف انتصاب، تضيق مجرى البول، أو الحاجة لتكرار الجراحة.

نصائح للتعافي:
١. شرب سوائل بكثرة لتنظيف المثانة.
٢. تجنب حمل أشياء ثقيلة لمدة 3 إلى 4 أسابيع.
٣. يعود معظم الرجال إلى العمل خلال 2 إلى 3 أسابيع.

اتصل بطبيبك أو توجه لقسم الطوارئ في الحالات التالية:
١. وجود جلطات دموية كبيرة أثناء التبول.
٢. صعوبة في التبول.
٣. حمى.
٤. ألم شديد.



مجموعة فقيه للرعاية الصحية
Fakeeh Care Group