




ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT PUBÈRE DES FILLES - ÉCHELLE DE TANNER

STADE 1

Préadolescence. Pas de seins, **élévation du mamelon** possible. Aréole petite et plate.

Poitrine




Phase de pré-adolescence, **absence de pilosité.**

STADE 2

8 - 13 ans

Bourgeon mammaire. Sein et mamelon légèrement soulevé. **Élargissement de l'aréole.**



9 - 14 ans


Apparition de **poils longs, légèrement pigmentés**, droits ou bouclés, principalement sur le pourtour des grandes lèvres.

STADE 3

10 - 14 ans

L'aréole s'élargit. **Le volume du sein augmente**, son contour ne se dessine pas encore.

Ménarche
(première menstruation) :
11 ans - 15 ans




10 - 14 ½ ans

Poils plus sombres, plus droits et bouclés. Sur qu'une petite partie du pubis.

STADE 4

11 - 15 ans

L'aréole et le mamelon se surélèvent encore. **Protubérance secondaire sur le sein.**




11- 15 ans

Poils de type adulte, plus épais. Pilosité plus dense.

STADE 5

13 - 18 ans

Anatomie d'adulte. **Aréole dans le même plan que le sein.**



Poils pubiens

12 - 16 ½ ans

Pilosité de type adulte, s'étend sur la **surface interne des cuisses.**

Adapté de l'**Échelle de maturité de Tanner**. Dictionnaire médical de l'**Académie de Médecine**.