
EUROTSA
CATALOGO PRODOTTI 2027



Dopo oltre trent'anni di esperienza nel settore regolatorio, maturata tra Italia e mercati internazionali, un anno fa sono entrata a far parte di Euro TSA. Ho trovato un'azienda dinamica, che investe nella ricerca e guarda all'agricoltura con una visione completa, sviluppando soluzioni innovative per rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione.

Questo catalogo rappresenta il nostro impegno nel mettere a disposizione degli imprenditori agricoli prodotti efficaci, affidabili e di qualità. Tra le novità di quest'anno sono particolarmente lieta di presentare Acticlaster, il nuovo fungicida a base di fosfonato di potassio. Grazie alla sua elevata sistemicità, offre una protezione efficace contro la peronospora di vite, pomodoro, melanzana e patata e contro la ticchiolatura delle pomacee, contribuendo a migliorare la qualità e la resa delle produzioni.

Con Acticlaster e con tutta la gamma Euro TSA, vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per un'agricoltura sempre più efficiente, sostenibile e orientata al futuro.

Stella Agostini

Regulatory Department Euro TSA

LA NOSTRA STORIA

**Una storia ventennale.
Fatta di innovazione, ricerca, affidabilità e qualità.**

2000
EUROPHYTO TSA
Nasce EUROPHYTO TSA e inizia l'avventura nel mercato nazionale dei fertilizzanti liquidi e dei prodotti fitosanitari.

2007
EST EUROPA
EUROPHYTO TSA inizia a sviluppare il mercato Est Europeo.

2008
MICROSEED
Nasce il primo concime microgranulare.

2010
CRESCE LA LINEA MICROSEED
Nascono MICROSEED Zn SUPER, MICROSEED SPECIAL BORON e MICROSEED BIO.

2012
INIZIA IL SOGNO DI EURO TSA
EUROPHYTO TSA si trasforma in EURO TSA, società italiana che commercializza in tutto il mondo fertilizzanti, prodotti fitosanitari e adjuvant.

2013
MICROSED GEO
EURO TSA ottiene la registrazione del prodotto MICROSED GEO.

2015
EURO TSA INVESTE IN R&D
L'Azienda investe in ricerca e sviluppo con i migliori centri di saggio e Università per lo sviluppo dei Biostimolanti e di nuovi prodotti fitosanitari.

2016
MICROSEED WR e NATURAL FORCE
MICROSEED WR, il microgranulo brevettato in grado di combattere la siccità. NATURAL FORCE, il primo formulato 100% di origine vegetale.

2017
MICROSEED AIR O2 e ARGENTINA
MICROSEED AIR O2, nasce il microgranulo in grano di sconfiggere l'asfissia e l'anossia radicale. Nello stesso anno l'azienda apre una filiale in Argentina.

2018
CLEANCLASTER
Nasce CLEANCLASTER: unico coadiuvante per erbicidi a base di Glifosate e altri erbicidi di post-emergenza.

2019
MICROSED GEO IN ROMANIA
Ottenimento autorizzazione MICROSED GEO a base di Teflutrin e Fertilizzante in Romania.

2020
BRIONFLO 100 SC
Ottenimento autorizzazione BRIONFLO 100 SC a base di Cyazofamide.

2021
MICROSED GEO IN EST EUROPA
MICROSED GEO si espande in Est Europa (Ungheria e Bulgaria).

2022
ACTICLASTER
Ottenimento autorizzazione Acticlaster a base di Fosfonato di K.

2023
NF MICRO
Viene lanciata la nuova linea NF MICRO.

2024
NUOVA BRAND STRATEGY
EURO TSA rivoluziona la sua immagine, investendo in marketing e comunicazione

2025
ACTICLASTER
Autorizzazione nuove colture in etichetta

2026
LINEA SUPERFLO
Microelementi in una nuova sospensione concentrata

“Dal 2019 commercializzo prodotti EURO TSA, azienda verso cui nutro un’estrema fiducia. MICROSEED ZN SUPER su frumento e MICROPHYT PLUS e NATURAL FORCE su olivo fanno ottenere maggiori produzioni con qualità al top e i clienti me lo confermano, sempre !”

Antonio
GUGLIELMO SRL
Cliente Euro TSA dal 2019



Ci prendiamo cura dei terreni perchè crediamo nella produttività agricola



PRODUZIONE GARANTITA

Produciamo fertilizzanti speciali, fertilizzanti minerali, adjuvant e prodotti fitosanitari nei nostri impianti.


SUPPORTO CONTINUO, DURATURO E SOSTENIBILE

Supportiamo gli agricoltori e distributori nella scelta della migliore pratica agronomica.

RESPONSABILITA' SOCIALE

La qualità garantita dei nostri prodotti salvaguarda i consumatori.

Qualità dei prodotti, corretta distribuzione dei formulati, salvaguardia del consumatore e tutela dell'ecosistema agricolo, sono i valori guida che hanno permesso a EURO TSA di porre le proprie fondamenta per lo sviluppo di innovativi formulati.



RICERCA E SVILUPPO

Investiamo in ricerca e sviluppo con Centri di Saggio e Centri di ricerca certificati.

QUALITÁ CERTIFICATA

Adottiamo protocolli d'analisi ufficiali e certificati e strumentazioni all'avanguardia.

SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE

I nostri prodotti sono altamente ecosostenibili perché frutto di anni di ricerca.

INDICE **PRODOTTI**

PRODOTTI FITOSANITARI

FUNGICIDI

12 ACTICLASTER®
14 BRIONFLO® 100 SC
15 SUPER LIQUIDO NOVITÀ

INSETTICIDI

18 MICROSED® GEO
20 ORTIFENS BIO BIO

ADJUVANT

23 BUBBLES STOP 30
24 CLEANCLASTER®
25 MELTWAX

CORROBORANTI

27 OLIO DI SENAPE ETSA BIO
28 PROPOLIS BIO

BIOSOLUZIONI

31 FIXALIA EVO BIO
32 MICROPHYT® PLUS BIO
33 NUTRI BORDOX BIO
34 NUTRIVIT 50 BLU BIO
35 NUTRIVIT 50 VERDE BIO
36 SULPHUR 840 L BIO
37 ZINCBACT

FERTILIZZANTI

STARTERS

40 FERTIFOS 10 - 34
41 FOSFODRIP STARTER
42 FOSFONITRIC ACID
43 GRANOFOS® ZN SUPER
45 MICROSEED® BIO BIO
46 MICROSEED® MYCO BIO NOVITÀ
48 MICROSEED® ZN SUPER
50 P54
50 P75

AZOTATI LIQUIDI

52 FERTILCEREAL® 21 DCD
53 N 30 DCD
54 N-DIGEST DCD
55 NITROCAL
56 NITROMAC 24

SPECIALI

58 BLACK HUMONAS BIO
59 BORON CARE BIO
60 CHELIFER 6 WDG BIO
61 GREENLAST® VEG
62 GREENSEA KELP BIO
63 QUICK-R
64 SOLCAL B
65 SUGARBUZZ BIO
67 SUPERFLO CA 545 BIO
68 SUPERFLO MG 580 BIO
69 SUPERFLO MN 400 BIO
70 SUPERFLO ZN 700 BIO
71 SUPERFLO ZN MN 630 BIO
72 VIGOR GREEN

BIOFERTILIZZANTI

74 BIOFERT N5 BIO
75 BIOFERT S BIO
76 NF MICRO CAM BIO
77 NF MICRO MIX BIO
78 NATURAL FORCE® BIO VEGAN

POTASSICI

81 POTASSIO TIOSOLFATO
82 RED - K

LINEE TECNICHE

CEREALI

85 FRUMENTO
85 RISO
86 MAIS

INDUSTRIALI

86 GIRASOLE
87 COLZA
87 SOIA
88 BIETOLA

ORTICOLE

88 POMODORO
89 MELANZANA
89 PEPERONE
90 PATATA
90 CETRIOLO
91 ANGURIA
91 MELONE
92 ZUCCA
92 PISELLO
93 FAGIOLO
93 BASILICO
94 BRASSICACEE

FRUTTICOLE

94 MELO
95 PERO
95 ALBICOCCO
96 CILIEGIO
96 PESCO
97 OLIVO
97 VITE
98 NOCCIOLO
98 CASTAGNO
99 KIWI
99 FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- APPLICAZIONE FOGLIARE
- APPLICAZIONE AL SUOLO
- APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE
- UGELLO A 7 FORI
- TRATTAMENTO SEMENTI

TIPOLOGIA DI AGRICOLTURA

Nella parte superiore delle linee tecniche, sono stati riportati i prodotti consentiti in agricoltura biologica mediante un riquadro verde. Nella parte inferiore sono stati riportati i prodotti consentiti in agricoltura integrata mediante riquadro rosso. I prodotti consentiti in agricoltura biologica possono essere utilizzati anche in agricoltura integrata.

CONFEZIONI



ORDINE DI MISCELAZIONE DELLE FORMULAZIONI

1 INIZIARE VERSANDO ACQUA NELLA BOTTE FINO A METÀ DEL SUO VOLUME

2 AGGUNGERE TUTTI I PRODOTTI NECESSARI

- REGOLATORI DI PH
- SACCHETTI IDROSOLUBILI (WSB)
- PRODOTTI MICRO GRANULARI (WG-SG)
- POLVERI BAGNABILI (WP)
- SOSPENSIONI CONCENTRATE E DISPERSIONI OLEOSE (SC-OD)
- SUSPO-EMULSIONI (SE)
- EMULSIONI ACQUOSE (EW/ME)
- EMULSIONI CONCENTRATE (EC)
- BAGNANTI, OLII, FERTILIZZANTI, PRODOTTI ANTIDERIVA

3 COMPLETARE IL RIEMPIMENTO CON ALTRA ACQUA FINO AL VOLUME DESIDERATO



IL NOSTRO PORTFOLIO PRODOTTI



PRODOTTI FITOSANITARI

Per una migliore protezione delle tue colture

CORROBORANTI

Potenziatori delle difese delle piante

BIOSOLUZIONI

La soluzione biologica per le tue colture

FERTILIZZANTI

Per una nutrizione ad alto livello delle tue colture

EUROTSA

PRODOTTI FITOSANITARI

FUNGICIDI

*Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

BRIONFLO® 100 SC & ACTICLASTER®

Proteggi le tue colture dalla Peronospora con i fungicidi di Euro TSA



ACTICLASTER®

FUNGICIDI



Migliora le resistenze alla peronospora e la qualità della resa produttiva

DESCRIZIONE

ACTICLASTER® è un fungicida a base di Fosfonato di potassio. Il principio attivo è caratterizzato da una notevole mobilità nelle piante e grazie alla sua sistemicità, che si manifesta in modo ascendente e discendente, viene assorbito dalle foglie e dalle radici ed assicura anche la protezione della vegetazione che si forma successivamente al trattamento. Il prodotto ha un effetto diretto contro i funghi patogeni, principalmente oomiceti, inibendo la germinazione delle spore e bloccando lo sviluppo del micelio.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Applicare ACTICLASTER® all'insorgenza dei primi sintomi della malattia. Ripetere i trattamenti ogni 7 – 10 giorni. Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti all'anno sotto riportati.

FUNGICIDA PER IL CONTROLLO DELLA PERONOSPORA DI VITE, POMODORO, MELANZANA E PATATA E PER IL CONTROLLO DELLA TICCHIOLATURA DELLE POMACEE
Liquido Solubile (SL)
Meccanismo d'azione Codice Frac P07

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Fosfonato di potassio puro g 43.9 (= 597 g/L)
Coformulanti q.b. a g100

FORMULAZIONE

Liquido Solubile (SL)

NUMERO DI REGISTRAZIONE

18038 del 22/04/22

INDICAZIONE DI PERICOLO

–

APPLICAZIONE FOGLIARE	PARASSITA	EPOCA DI APPLICAZIONE	DOSE (L/ha)	VOLUMI D'ACQUA L/ha	NUMERO MAX DI TRATTAMENTI / INTERVALLO
Pomacee (melo, pero, cotogno, nespolo, nespolo del Giappone, nashi)	*Venturia inaequalis, Venturia pyrina*	BBCH 10 - 81	2.5	200 - 1500	6 7 - 10 gg
Uve da vino	*Plasmopara viticola*	BBCH 11 - 77	3 - 4	300 - 1000	6 7 - 10 gg
Uve da tavola	*Plasmopara viticola*	BBCH 11 - 77	4	300 - 1000	4 7 - 10 gg
Patata	*Phytophthora infestans*	BBCH 11 - 91	3 - 4	300 - 600	5 7 - 10 gg
Pomodoro, melanzana (Campo)	*Phytophthora infestans*	BBCH 11 - 88	3 - 4	300 - 600	5 7 - 10 gg
Pomodoro, melanzana (Serra)	*Phytophthora infestans*	BBCH 11 - 70	2.5 - 3.5	300 - 600	5 7 - 10 gg

SOSPENDERE I TRATTAMENTI:
35 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU POMACEE
14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI UVA, PATATA, POMODORO, MELANZANA

ACTICLASTER® Marchio Registrato Euro TSA SRL

1 L 5 L

ACTICLASTER® stimola le difese naturali delle piante *(induttore della resistenza)* che producono e accumulano alcune importanti sostanze con attività fungicida.



BRIONFLO® 100 SC

FUNGICIDI



DESCRIZIONE

BRIONFLO® 100 SC è un fungicida a base di Cyazofamide (famiglia Cianoimidazoli) che possiede un'eccellente attività nei confronti della peronospora di vite, pomodoro e patata.
BRIONFLO® 100 SC agisce su diversi stadi del ciclo biologico della peronospora inibendone la germinazione delle zoospore, la germinazione degli sporangi, la crescita del micelio e la formazione di sporangifori e spore.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con gli insetticidi e fungicidi di comune impiego. In caso di miscela estemporanea con altri formulati, effettuare comunque preventivamente un test di compatibilità fisico-chimica.

RESISTENZA

Per evitare o ritardare l'insorgenza di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e applicare BRIONFLO® 100 SC preventivamente.

FUNGICIDA PER IL CONTROLLO DELLA PERONOSPORA DI VITE, POMODORO E PATATA
Meccanismo d'azione Codice Frac 21

COMPOSIZIONE

Cyazofamide puro 9,5% (= 100 g/L)

FORMULAZIONE

Sospensione Concentrata (SC)

NUMERO DI REGISTRAZIONE

16947 del 16.01.2020

INDICAZIONE DI PERICOLO



APPLICAZIONE FOGLIARE	TEMPO DI CARENZA	PARASSITA	EPOCA DI APPLICAZIONE	DOSE (L/ha)	NUMERO MAX DI TRATTAMENTI INTERVALLO
Vite	21 gg	Peronospora (*Plasmopora viticola*)	BBCH 11 - 89 (da prefioritura a maturazione)	0,9 - 1,1	4 8-10 gg (a dose minima) 12-14 gg (a dose max)
Pomodoro (da industria e mensa) in pieno campo e serra	3 gg	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	BBCH 12 - 89 (da prefioritura a maturazione)	0,8	6 7-10 gg
Patata	7 gg	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	BBCH 12 - 89 (da sviluppo fogliare a pre-raccolta)	0,8	6 5 - 7gg (fino a 10 in caso di basso rischio)

BRIONFLO® Marchio Registrato Euro TSA SRL

IMPORT TOLLERANCE USA

1 L 5 L

NOVITÀ

FUNGICIDI

SUPER LIQUIDO

Fluido nella forma Solido nella protezione

FUNGICIDA A BASE DI ZOLFO



BIO

DESCRIZIONE

SUPER LIQUIDO è un prodotto in sospensione concentrata a base di Zolfo che presenta una pronta e facile dispersibilità. SUPER LIQUIDO presenta una formulazione che gli permette di resistere meglio al dilavamento. SUPER LIQUIDO è indicato per trattamenti preventivi e curativi nei confronti di tutte le forme di Oidio o Mal Bianco che colpiscono le colture. Le sue caratteristiche presentano dei vantaggi: elevata selettività nei confronti delle colture alle dosi consigliate; ottima adesività e prolungata efficacia.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), oli minerali. In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

AVVERTENZE

In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

COMPOSIZIONE

Zolfo 800 g/l
Coformulanti q.b. a 100g

FORMULAZIONE

Liquido Solubile (SL)

NUMERO DI REGISTRAZIONE

17263 del 30/07/2018

INDICAZIONE DI PERICOLO

-

APPLICAZIONE FOGLIARE	BERSAGLIO	STUDIO DI APPLICAZIONE	DOSE (L/ha)	N. MAX DI APPLICAZIONI (INTERVALLO GIORNI)
Barbabietola, bietola rossa	Oidio	BBCH 10-89: prima foglia visibile, cotiledoni dispiegati orizzontalmente, maturazione completa	7,5	2 (15)
Grano	Oidio	BBCH 10-89: prima foglia vera, granella matura	10	2 (14)
Melone	Oidio	BBCH 10-89: cotiledoni completamente dispiegati, frutto maturo	3,5	5 (7)
Orzo	Oidio	BBCH 10-89: prima foglia vera, granella matura	10	2 (14)
Melo	Oidio	A partire dallo stadio BBCH 60 (primi fiori aperti)	7,5	9 (7)
Zucchini	Oidio	BBCH 10-89: cotiledoni completamente dispiegati, frutto maturo	3,5	3 (7)
Roseto	Oidio	A partire dallo stadio BBCH 60 (apertura primi fiori)	3	5 (10)
Vite	Oidio	A partire dallo stadio BBCH 15 (quinta foglia aperta)	4	8 (7)
Pomodoro, melanzana	Oidio	BBCH 10-89: cotiledoni completamente dispiegati, frutto maturo	2	6 (10)
Pesco, ciliegio, susino	Oidio	A partire dallo stadio BBCH 69 (fine fioritura: tutti i petali caduti)	5	3 (7)
Cetriolo, cetriolino (e altre cucurbitacee a buccia edibile)	Oidio	BBCH 10-89: cotiledoni completamente dispiegati, frutto maturo	3,5	6 (7)
Peperone (dolce e piccante)	Oidio	BBCH 10-89: cotiledoni completamente dispiegati, frutto maturo	5	6 (10)
Piselli senza baccello, freschi, cece, cicerchia	Oidio	A partire dallo stadio BBCH 60 (primi fiori aperti)	7,5	1
Zucca e anguria e altre cucurbitacee a buccia non edibile	Oidio	BBCH 10-89: cotiledoni completamente dispiegati, frutto maturo	3,5	8 (7)
Lattuga e simili, Erbe fresche	Oidio	BBCH 10-89: cotiledoni completamente dispiegati, frutto maturo	7,5	4 (15)
Fragola (campo)	Oidio	A partire dallo stadio BBCH 60 (apertura primi fiori)	7,5	8 (9)



PRODOTTI FITOSANITARI

INSETTICIDI

*Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

MICROSED® GEO



Difesa e nutrizione in un solo microgranulo

DESCRIZIONE

MICROSED® GEO è un insetticida piretroide in formulazione microgranulare a base di Teflutrin su un supporto costituito da Azoto e Fosfoto (NP 11.47), efficace per contatto contro i principali artropodi terricoli che infestano le colture agrarie. MICROSED® GEO agisce per contatto e, grazie ad una marcata fase di vapore, esplica inoltre una rilevante attività repellente che contribuisce a potenziare l'efficacia protettiva. MICROSED® GEO va distribuito localizzato unicamente nel solco di semina o di trapianto mediante microgranulatori e deve essere sempre interrato.

COMPOSIZIONE

Teflutrin 0,5%

FORMULAZIONE

Microgranulare di diametro 0,3 - 1,0 mm

NUMERO DI REGISTRAZIONE

12090 del 19.01.2006

INDICAZIONE DI PERICOLO



AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Il prodotto va impiegato da solo. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Usare guanti e maschera filtrante EN 149 FFP2 durante la fase di carico del prodotto e guanti durante l'applicazione. Non applicare con attrezzature manuali. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia vegetata non trattata dai corpi idrici superficiali di 5 metri per ortaggi a frutto, di 10 metri per ortaggi da foglia, ortaggi da radice, soia e tabacco. Il coformulante del prodotto contiene Azoto e Fosforo (NP 11.47) che devono essere considerati nel piano di concimazione per evitare inutili sovradosaggi di fertilizzanti.

APPLICAZIONE AL SUOLO	TEMPO DI CARENZA	DOSE (Kg/ha)	PARASSITI
Barbabietola da zucchero	-	12 - 15	*Agriotes spp., Chaetocnema tibialis, Atomaria linearis, Scutigerella immaculata, Tipula spp.*
Frumento	-	10 - 12 12 - 15	*Bibio hortulanus, Hylemya spp., Scutigerella immaculata, Tipula spp.* *Agriotes spp., Melolontha melolontha*
Mais, Mais dolce, Sorgo	-	12 - 15	*Agriotes spp., Agrotis spp., Diabrotica spp., Scutigerella immaculata, Tipula spp., Hylemya spp.*
Girasole, Soia	-	12 - 15	*Agriotes spp., Agrotis spp., Chaetocnema tibialis, Hylemya spp.*
Ortaggi (Pomodoro, Melanzana, Carota, Rapa, Navone, Melone, Cocomero, Cetriolo, Cavolfiore, Cavolo cappuccio, Dolcetta, Crescione e altri germogli e gemme, Barbarea, Rucola, Senape juncea, Fagiolo, Pisello, Fagiolino, Sedano, Finocchio)*	-	16 - 20	*Agriotes spp., Agrotis spp., Chaetocnema tibialis, Ceutorhynchus pleurostigma, Blaniulusguttulatus, Hylemya spp., Chamaepsila rosae, Tipula spp., Melolontha melolontha, Centipeda spp.*
Patata	-	12 - 15	*Agriotes spp.*
Tabacco	-	12 - 15	*Agriotes spp., Agrotis spp., Tipula spp.*

* solo alla semina per Carota, Fagiolo, Pisello, Fagiolino, Sedano, Finocchio

MICROSED® Marchio Registrato Euro TSA SRL

10 KG



Efficace per contatto contro i principali insetti terricoli che infestano le colture agrarie

MICROSED® GEO è la soluzione che difende e nutre le colture fin dalla semina. Le protegge dagli insetti terricoli, favorisce una germinazione vigorosa e omogenea e assicura nutrimento mirato già nel solco di semina.

Grazie alla sua formulazione microgranulare, **MICROSED® GEO** unisce difesa e nutrizione in un unico gesto, garantendo un avvio sicuro e un raccolto di qualità. L'alleato ideale per massimizzare il tuo lavoro in campo!

ORTIFENS BIO

INSETTICIDI BIO



Per il controllo di afidi, acari e funghi

DESCRIZIONE

L'estratto di ortica contenuto in ORTIFENS BIO agisce direttamente sul patogeno e indirettamente stimolando le difese naturali della pianta. ORTIFENS BIO è un prodotto sviluppato per il controllo di acari ed afidi e altri fitofagi, rappresentando un'aggiunta alle soluzioni per la difesa delle colture, in agricoltura biologica ed integrata.

AVVERTENZE

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei prodotti di comune impiego. In caso di miscela estemporanea con altri formulati, effettuare comunque preventivamente un test di compatibilità. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per tutte le colture.

VOLUMI D'ACQUA

Scegliere l'appropriato volume di distribuzione per applicare la sostanza in modo uniforme sull'intera superficie fogliare. In caso di basso volume di impiego utilizzare l'equivalente di estratto d'ortica per un volume di 1000 l/ha.

SOSTANZA DI BASE UTILIZZATA AI SENSI DELL'ART.23 DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1107/2009 CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1165

COMPOSIZIONE

Estratto acquoso di ortica 15 g/L

FORMULAZIONE

Liquida

CONTROLLO INSETTI (PIENO CAMPO)

APPLICAZIONE FOGLIARE	AVVERSITÀ	DOSE (ml/ha)	EPOCA DI APPLICAZIONE	NUMERO DI TRATTAMENTI	PHI (gg)
Melo, Prugno, Pesco, Noce, Ciliegio, Ribes	Afide verde (*Myzus persicae, Macrosiphum rosae*), Afide del melo (*Eriosoma Lanigerum*), Afide del ribes (*Cryptomyzus ribis*), Afide del noce (*Callaphis juglandis*), Afide nero del ciliegio (*Myzus cerasi*)	4-5 (4-5 L/ha)	Dalla primavera fino a maturazione dei frutti (BBCH 87)	1-5 applicazioni fogliari ogni 7-15 gg	7
Fagioli	Afide del fagiolo nero (*Aphis fabae*)		Dalla primavera fino alla completa maturazione (BBCH 89)		
Patata	Afide verde (*Myzus persicae*)		Dalla primavera fino alla completa maturazione del tubero (BBCH 89)		
Lattuga, Cavolo	Afide del cavolo (*Brevicoryne brassicae, Nazonovia ribisnigri*)		Primavera-estate		
Sambuco	Afide del sambuco (*Aphis sambuci*)		Primavera-estate		
Rosa	Afide della rosa (*Macrosyphum rosae*)		Primavera-estate		
Spiraea Sp.	*Aphis spiraephaga*		Primavera-estate		
Cavolo, Colza, Ravanello	Scarafaggio (*Phyllotreta nemorum*)		Dalla primavera fino allo stadio di 9 o più foglie vere (BBCH 19)	1-6 applicazioni fogliari ogni 7-15 gg	
	Falena del cavolo (*Plutella xylostella*)		Dalla primavera fino a massa fogliare tipica raggiunta (BBCH 49)		
Melo, Pero	Carpocapsa del melo (*Cydia pomonella*)		2 trattamenti ad aprile 1 trattamento a maggio	3 applicazioni fogliari ogni 15 gg	

CONTROLLO ACARI (PIENO CAMPO)

APPLICAZIONE FOGLIARE	AVVERSITÀ	DOSE (ml/ha)	EPOCA DI APPLICAZIONE	NUMERO DI TRATTAMENTI	PHI (gg)
Fagioli	Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*)	4-5 (4-5 L/ha)	Dalla primavera fino alla maturazione (BBCH 89)	1-6 applicazioni fogliari (normalmente 3) ogni 7-21 giorni (normalmente 2-3 settimane)	7
Vite	Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae, Tetranychus telarius*)		Dalla primavera fino a maturazione dei frutti (BBCH 87)	1-6 applicazioni fogliari (3 prima della fioritura e 3 dopo la fioritura) ogni 7-21 giorni (normalmente 2-3 settimane)	

CONTROLLO FUNGHI (PIENO CAMPO)

APPLICAZIONE FOGLIARE	AVVERSITÀ	DOSE (ml/ha)	EPOCA DI APPLICAZIONE	NUMERO DI TRATTAMENTI	PHI (gg)
Brassicacee (Brassica sp., Sinapis sp.), Ravanello (Raphanus sativus)	Alternaria sp.	4-5 (4-5 L/ha)	Dalla primavera fino a massa fogliare tipica raggiunta (BBCH 49)	1-6 applicazioni ogni 7-15 gg	7
Cetriolo	Oidio (*Erysiphe polygoni*), Alternaria alternata f. sp.cucurbitae		Fino a completa maturazione dei frutti (BBCH 89)		
Fruttiferi: Melo, Susino, Pesco, Ciliegio	Macchie nelle foglie (*Alternaria alternata*), Marciume bruno/marciume fiorale (*Monilinia laxa, Botrytis cinerea*), Muffa nera (*Rhizopus stolonifer*)		Dalla primavera fino a maturazione dei frutti (BBCH 87)		
Vite	Peronospora (*Plasmopora viticola*)		Dalla primavera fino a maturazione del grappolo (BBCH 89)		
Patata	Peronospora della patata (*Phytophthora infestans*)		Dalla primavera fino alla completa formazione tuberi (BBCH 49)		

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Assicurarsi che tutta l'attrezzatura da impiegare sia pulita e non contenga residui di soluzioni precedentemente utilizzate. Aggiungere il prodotto nel serbatoio per ultimo mantenendo attivo l'agitatore. Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. Continuare l'agitazione della soluzione fino al completamento dell'applicazione. Preparare solo la quantità di soluzione necessaria per l'applicazione. Al termine dell'applicazione risciacquare tre volte l'attrezzatura utilizzata con acqua.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, tuttavia si consiglia di effettuare piccoli test preliminari per verificarne la compatibilità. Il prodotto può essere miscelato con gli olii. Si consiglia di non miscelare con prodotti a base di Rame e sostanze alcaline.



PRODOTTI FITOSANITARI

ADJUVANT

Per aumentare l'efficacia dei tuoi prodotti.

*Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

BUBBLES STOP 30

ADJUVANT



Elimina rapidamente la schiuma

Antischiuma siliconico
in emulsione 30%

DESCRIZIONE

BUBBLES STOP 30 è un formulato sviluppato per eliminare la formazione di schiuma superficiale nella fase di preparazione di soluzioni e miscele. BUBBLES STOP 30 agisce velocemente riducendo e abbattendo in tempi brevi lo strato schiumoso grazie ai siliconi che si legano alle molecole d'acqua modificando, a livello chimico, i legami che determinano la formazione della schiuma.

MODALITÀ E DOSE D'IMPIEGO

Versare la quantità necessaria di Bubbles STOP 30 nel serbatoio contenente la soluzione acquosa per primo.
Dose d'impiego: 1,5-3 mL/hL. Le dosi dipendono dalla quantità di schiuma presente nel serbatoio.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

BUBBLES STOP 30 è miscibile con i prodotti comunemente impiegati in agricoltura. Il prodotto deve essere conservato in ambiente protetto, evitando temperature inferiori a 0°C o superiori a 35°C. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

COMPOSIZIONE

Sostanze siliconiche in emulsione 30%

FORMULAZIONE

Liquida

INDICAZIONI DI PERICOLO



150 mL

CLEANCLASTER®

ADJUVANT



L'unico coadiuvante autorizzato per tutti i diserbi di post-emergenza e Glifosate

DESCRIZIONE
CLEANCLASTER® è un coadiuvante di nuova generazione che assicura un più rapido assorbimento e una più efficiente ed efficace traslocazione degli erbicidi in senso basipeto ed acropeto, esaltandone le modalità d'azione e riducendo le perdite di prodotto durante il trattamento. CLEANCLASTER® potenzia l'attività di tutti gli erbicidi sistemici e di post-emergenza anche in presenza di infestanti molto sviluppate o in condizioni vegetative non ottimali. Si possono ottenere risultati ottimali anche nei confronti delle infestanti considerate mediamente e scarsamente sensibili all'impiego degli erbicidi. L'aggiunta di CLEANCLASTER® consente di ottenere una maggiore prontezza d'azione anche a basse temperature.

AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non deve essere miscelato con prodotti a reazione alcalina e con prodotti contenenti calcio.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Si impiega in miscela con tutti gli erbicidi sistemici e di post-emergenza e nel caso di miscela con formulati sistemici a base di Glifosate consente di ridurre fino al 50% le dosi di prodotto normalmente utilizzate, con notevole beneficio ambientale.

NOTA
Si consiglia di inserire per primo CLEANCLASTER® nella botte per acidificare la soluzione e successivamente mettere gli altri erbicidi.

COMPOSIZIONE
Magnesio fosfonato g. 36,6 (478.2 g/L)

FORMULAZIONE
Concentrato solubile (SL)

NUMERO DI REGISTRAZIONE
16208 del 12.01.2018

INDICAZIONE DI PERICOLO
-

SOSTANZA	DOSE L/ha	EPOCA
Erbicida post-emergenza	1 - 1,5	Utilizzare la dose in funzione delle infestanti e dello stadio vegetativo in cui si applica
Glifosate	1	Dosaggio indicato in etichetta per formulati a base di glifosate
	1,5	50% del dosaggio indicato in etichetta per formulati a base di glifosate

CLEANCLASTER® Marchio Registrato Euro TSA SRL

1 L 5 L

MELTWAX

ADJUVANT



Tensioattivo non ionico per sciogliere le cere

DESCRIZIONE

MELTWAX è un formulato sviluppato per sciogliere le cere cuticolari in modo da favorire una migliore penetrazione dei prodotti. MLETWAX agisce velocemente riducendo e abbattendo in tempi brevi le cere cuticolari grazie agli alcoli tensioattivi organici che alterando la tensione superficiale favoriscono l'alterazione della struttura cuticolare e migliorano la permeabilità.

MODALITÀ E DOSE D'IMPIEGO

Versare la quantità necessaria di MELTWAX nel serbatoio contenente la soluzione acquosa per primo.
Dose d'impiego: 200-250 mL/ha

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Il prodotto deve essere conservato in ambiente protetto, evitando temperature inferiori a 0°C o superiori a 35°C. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
MELTWAX è miscibile con i prodotti comunemente impiegati in agricoltura.

COMPOSIZIONE

Alcoli tensioattivi organici 100%

FORMULAZIONE

Liquida

INDICAZIONI DI PERICOLO



1L

CORROBORANTI

Potenziatore delle difese delle piante

OLIO DI SENAPE ETSA

CORROBORANTI BIO



Potenziatore delle difese delle piante

DESCRIZIONE

OLIO DI SENAPE ETSA è un prodotto a base di olio di senape ottenuto da estrazione meccanica dei semi e trattato esclusivamente con procedimenti fisici. OLIO DI SENAPE ETSA possiede un'azione corroborante regolando il metabolismo e potenziando la difesa delle piante (parte epigea ed ipogea) nei confronti di stress di varia natura. OLIO DI SENAPE ETSA viene distribuito per via radicale e favorisce lo sviluppo dell'apparato radicale rendendo le colture più rigogliose e produttive.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Effettuare gli interventi nelle ore più fresche della giornata. Evitare di miscelare con prodotti rameici, polisolfuri o emulsioni oleose.

Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici
CORROBORANTE NATURALE PER LE PIANTE CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONTENUTO

15,5%	Olio di senape

CARATTERISTICHE

Aspetto	Densità a 20°C	pH (20°C)
Liquido marrone	1 Kg/L	6,5 - 7,5

APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE Bassa pressione dello stress	DOSE Kg/ha	EPOCA
Vite, Agrumi, Actinidia, Pomacee (Melo, Pero, Cotogno), Drupacee (Pesco, Nettarino, Ciliegio e Albicocco), Noce, Nocciolo, Mandorlo e altra frutta a guscio, Olivo	5	N. interventi: 5 1° intervento dopo 10 gg dall'impianto 2° intervento dopo 10 gg dal 1° intervento 3-5° intervento ogni 20 gg
Patata, Pomodoro, Asparago, Carciofo, Cavolo, Cavolfiore, Broccolo, Cetriolo, Cocomero, Melone, Zucchino, Zucca, Peperone, Insalata e altri ortaggi a foglia, Basilico e altre erbe fresche, Rucola, Pisello, Fagiolo e altri legumi, Fagiolino, Melanzana, Sedano, Carota, Ravanello, Finocchio, Cipolla, Aglio e altre bulbacee, Tabacco		
Fragola e altri piccoli frutti		
Colture ornamentali e floreali		

APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE Alta pressione dello stress	DOSE Kg/ha	EPOCA
Vite, Agrumi, Actinidia, Pomacee (Melo, Pero, Cotogno), Drupacee (Pesco, Nettarino, Ciliegio e Albicocco), Noce, Nocciolo, Mandorlo e altra frutta a guscio, Olivo	10	N. interventi: 5 1° intervento dopo 10 gg dall'impianto 2° intervento dopo 10 gg dal 1° intervento 3-5° intervento ogni 20 gg
Patata, Pomodoro, Asparago, Carciofo, Cavolo, Cavolfiore, Broccolo, Cetriolo, Cocomero, Melone, Zucchino, Zucca, Peperone, Insalata e altri ortaggi a foglia, Basilico e altre erbe fresche, Rucola, Pisello, Fagiolo e altri legumi, Fagiolino, Melanzana, Sedano, Carota, Ravanello, Finocchio, Cipolla, Aglio e altre bulbacee, Tabacco		
Fragola e altri piccoli frutti		
Colture ornamentali e floreali		

Intervento curativo

Dose: 10 Kg/ha. Intervenire immediatamente ed eseguire una seconda applicazione dopo 10 gg dal primo intervento. Successivamente eseguire altri 3-4 interventi a distanza di 20 giorni.

5 L

PROPOLIS



Potenziatore delle difese delle piante

DESCRIZIONE

PROPOLIS è un prodotto contenente cere, resine, acidi aromatici e sostanze volatili. PROPOLIS ha un'azione corroborante nei confronti delle piante colpite da stress di varia natura. PROPOLIS stimola la radicazione, la fioritura, favorisce l'allegagione e migliora la produzione durante l'accrescimento donando colore, sapore e conservabilità ai frutti. Favorisce la cicatrizzazione delle ferite dovute a traumi e/o potature. L'applicazione preventiva di PROPOLIS può essere fatta in qualsiasi momento del ciclo produttivo.

PRECAUZIONI

Nell'applicazione per il trattamento dei semi, diluire il prodotto in acqua (q.b.). Nell'applicazione fogliare utilizzare la dose più bassa per le piante sane a scopo preventivo e la dose più alta per le piante che presentano sintomi di stress di diversa natura. Il prodotto utilizzato diluito alle dosi consigliate è innocuo per gli animali, l'uomo e gli insetti utili.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Effettuare gli interventi nelle ore più fresche della giornata. Evitare di miscelare con prodotti rameici, polisolfuri o emulsioni oleose. Teme il gelo. Conservare il prodotto puro/concentrato lontano dalla portata di persone, bambini e animali. Non ingerire. Si declina ogni responsabilità per uso improprio del prodotto. Smaltire l'imballo nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici
CORROBORANTE NATURALE PER LE PIANTE CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONTENUTO

200g/L	Propoli estratto acquoso

CARATTERISTICHE

Aspetto
Liquido

Densità a 20°C
0,93 – 0,99 Kg/L

pH (20°C)
7 – 7,5

TRATTAMENTO SEMENTI	DOSE
Sementi di cereali (Mais, Grano, Orzo)	2 kg x 1000 kg di seme

APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE	DOSE
Orticoltura, Frutticoltura, Vigneti, Oliveti, Vivaismo, Ornamentali	0,5-1 kg/1000 m2

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE
Orticoltura, Frutticoltura, Vigneti, Oliveti, Vivaismo, Ornamentali	250-500 g/hL

5 L



Un connubio naturale a supporto della biodiversità in campo: **PROPOLIS** e **SUGARBUZZ** valorizzano la presenza degli insetti utili, creando condizioni favorevoli ai processi di impollinazione e allo sviluppo della coltura.

BIOSOLUZIONI

La soluzione biologica per le tue colture

FIXALIA EVO



DESCRIZIONE

FIXALIA EVO è un prodotto a base di batteri azotofissatori miscelati direttamente con una matrice organica vegetale nobile che svolge l'azione di substrato nutrizionale. Gli azotofissatori di FIXALIA EVO, grazie al substrato, si alimentano e si riproducono velocemente andando a colonizzare meglio la coltura e garantendo una migliore fissazione dell'azoto atmosferico. FIXALIA EVO, grazie alla sua particolare formulazione, permette di risparmiare fino al 50% le unità di azoto apportate chimicamente al terreno, di alimentare la pianta con un elemento fondamentale per la crescita e per la qualità sia dall'apparato radicale e dall'apparato fogliare. La fissazione dell'azoto avviene in maniera omogenea per una durata di 60-70 giorni.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Agitare prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da raggi solari e fonti di calore. Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti fluidi sia minerali che organici e dei prodotti fitosanitari, tuttavia si consiglia di effettuare piccoli test preliminari per verificarne la compatibilità. Non miscelare con prodotti a base di Rame o antibatterici.

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA BIOSTIMOLANTE
Inoculo di funghi micorrizici
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
N. Reg. 0045909/25

COMPOSIZIONE

0,1%	Micorrize
$3x10^8$	Batteri della rizosfera (UFC/gr)
$1x10^8$	Azotobacter venelandi spp (UFC/gr)
$1x10^8$	Azotobacter antagonensis spp (UFC/gr)
$1x10^8$	Bacillus licheniformis spp (UFC/gr)

CARATTERISTICHE

Aspetto	Densità a 20 °C	pH (20°C)
Liquido bruno	1,2 Kg/L circa	5 - 7

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE Kg/ha	EPOCA
Frumento, Orzo, altri cereali a paglia, Mais, Sorgo, Riso, Soia, Barbabietola da zucchero, Girasole, Colza	5	Fase di levata (BBCH 11-60) In miscela con prodotti fitosanitari
Drupacee (Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino), Pomacee (Melo, Pero), Olivo, Agrumi, Vite, Actinidia, Noce, Nocciolo, Mandarlo e altra frutta	5	Sviluppo vegetativo (BBCH 11-60) In miscela con prodotti fitosanitari
Pomodoro, Patata, Melanzana, Peperone, Lattuga e altri ortaggi a foglia, Melone, Cocomero, Zucchino, Cetriolo e altre orticole	5	Sviluppo vegetativo (BBCH 11-60) In miscela con prodotti fitosanitari

12 KG

MICROPHYT® PLUS

BIOSOLUZIONI BIO



Il formulato ideale per una agricoltura di qualità

DESCRIZIONE

MICROPHYT® PLUS è una miscela liquida di Silicati di rocce solubili contenente diversi microelementi Ferro, Manganese, Zinco, Rame. MICROPHYT® PLUS grazie ai suoi Silicati crea sui tessuti vegetali una pellicola trasparente, traspirante e persistente. Permette gli scambi gassosi dei tessuti vegetali, isolandoli e proteggendoli dalle colonie batteriche e dagli inoculi fungini. Regola l'umidità dei tessuti vegetali proteggendoli dalle avversità, fortificandoli, cicatrizzandoli nel caso di lesioni. Ha un forte potere disidratante e disgregante su melate e fumaggini che imbrattano frutti e piante. Grazie ai suoi Microelementi ha una forte azione fogliare Rinverdente prevenendo e curando le fisiopatie dovute a carenze di Ferro Manganese Zinco e Rame. Se miscelato con Rame ne esalta l'attività pertanto la dose di Rame va ridotta del 50% rispetto a quella consigliata.

PRECAUZIONI

Applicato su vegetazione affetta da inoculo fungino può determinarne la necrosi.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Effettuare gli interventi nelle ore più fresche della giornata. Evitare di miscelare con prodotti rameici, polisolfuri o emulsioni oleose. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C. Conservare il prodotto puro/ concentrato lontano dalla portata di persone, bambini e animali. Non ingerire. Si declina ogni responsabilità per uso improprio del prodotto. Smaltire l'imballo nel rispetto delle norme vigenti in materia.

PFC 1(C)(I)(b)(i)

CONCIME INORGANICO COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI
Concime minerale a base di microelementi in soluzione
Consentito in agricoltura biologica

COMPOSIZIONE

0,5 %	Rame (Cu), nella forma solfato, idrosolubile
2 %	Ferro (Fe), nella forma solfato, idrosolubile
0,5 %	Manganese (Mn), nella forma solfato, idrosolubile
0,5 %	Zinco (Zn), nella forma solfato, idrosolubile

CARATTERISTICHE

Aspetto
Verde - marrone scuro

Densità a 20 °C
1,19 - 1,21 Kg/L circa

pH (20°C)
1 - 1,5

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE L/ha	EPOCA
Vite	3 -5	Da Germogliamento a Pre Raccolta
Olivo	3 -5	3 interventi: ripresa vegetativa, prefioritura, fine estate
Drupacee, Agrumi, Pomacee, Actinidia e altre piante da frutto	3 -5	3 interventi: ripresa vegetativa, prefioritura, fine estate
Colture orticole (pieno campo e serra)	1,5 - 3	Trattamenti ripetuti in vegetazione
Brassicacee (pieno campo e serra)	2 - 3	Trattamenti ripetuti ogni 7 - 12 giorni (si consiglia 7 nei primi trattamenti e 12 negli ultimi)
Ortaggi a foglia (pieno campo e serra)	1,5 - 4	Trattamenti ripetuti ogni 7 - 12 giorni in funzione dello stress

APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE	DOSE L/ha	EPOCA
Vite, Olivo, Drupacee, Agrumi, Pomacee, Actinidia e altre piante da frutto	10 - 20	Per tutto il ciclo ripetere ogni 15 giorni
Colture orticole (pieno campo e serra)	5 - 10	Per tutto il ciclo ripetere ogni 15 giorni

MICROPHYT® Marchio Registrato Euro TSA SRL

CE

6 KG

NUTRI BORDOX

BIOSOLUZIONI BIO



DESCRIZIONE

NUTRI BORDOX è un concime a base del microelemento Rame che svolgendo una funzione catalitica risulta importante per il metabolismo vegetale. NUTRI BORDOX previene e riduce le carenze di Rame e grazie alla sua forma (solfato neutralizzato) ripristina velocemente il regolare svolgimento delle attività metaboliche della pianta in quanto il Rame è un costituente di alcuni enzimi ed è importante per la sintesi della clorofilla.
NUTRI BORDOX distribuito per via fogliare previene e riduce le carenze di Rame rendendolo facilmente disponibile alla pianta. Il Rame è assorbito con difficoltà per via radicale in quanto viene trattenuto dal terreno, in particolare in quelli ricchi di sostanza organica e a reazione alcalina.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Evitare di miscelare con prodotti a reazione alcalina. Verificare la compatibilità di volta in volta. Considerato il gran numero di varietà e specie, nonché le differenti condizioni ambientali, qualora si dovesse miscelare il prodotto con altri formulati (soprattutto contenenti solventi) è sempre consigliabile effettuare saggi d'impiego preliminari.

PFC 1(C)(II)(a):

CONCIME INORGANICO SEMPLICE A BASE DI MICROELEMENTI
Concime a base di microelementi

CONTENUTO

20%	Rame (Cu) totale, nella forma di solfato

CARATTERISTICHE

Aspetto
Polvere

Colore
Blu/verde

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE g/hL
Vite, Agrumi	300-400
Pomacee (Melo, Pero), Drupacee (Pesco, Albicocca, Ciliegio, Susino), Noce, Nocciolo, Mandorlo e altra frutta a guscio	300-400
Olivo	300-400
Patata	300-400
Pomodoro, Peperone, Melanzana	300-400
Fragola e altri piccoli frutti	300-400
ORTICOLE (Asparago, Carciofo, Cavolo, Cavolfiore, Cetriolo, Cocomero, Melone, Zucchino, Fragola, Insalata e altri ortaggi a foglia, Pisello, Fagiolo, Fagiolino, Sedano, Finocchio, Radicchio, Cicoria, ecc)	300-400
Colture ornamentali	300-400

10 KG

NUTRIVIT 50 BLU

BIOSOLUZIONI BIO



DESCRIZIONE

NUTRIVIT 50 BLU è un concime a base del microelemento Rame che svolge principalmente una funzione catalitica risultando indispensabile per il metabolismo vegetale. NUTRIVIT 50 BLU permette di regolare lo svolgimento delle attività metaboliche della pianta in quanto il rame è un costituente di alcuni enzimi ed è importante per la sintesi della clorofilla.
NUTRIVIT 50 BLU previene le carenze di Rame incrementandone la disponibilità soprattutto nei suoli ricchi di sostanza organica o a reazione alcalina. NUTRIVIT 50 BLU deve essere impiegato per concimazione fogliare.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Evitare di miscelare con prodotti a reazione alcalina. Verificare la compatibilità di volta in volta.
L'impiego dei concimi a base di Rame si deve limitare ai casi in cui sussistano specifiche esigenze nutritive, tale impiego, è possibile in presenza di una dimostrata necessità e da una relativa documentazione tecnica (vedi Circolare n. N.0026663 del 10/04/2018).

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE Kg/ha
Frutticoltura, Vite, Olivo	1,4 - 1,8
Ortaggi e Fragola	1,8 - 2,2
Barbabietola, Cereali, Tabacco	1 - 1,4

L'impiego dei concimi a base di Rame si deve limitare ai casi in cui sussistano specifiche esigenze nutritive, tale impiego, e possibile in presenza di una dimostrata necessità e da una relativa documentazione tecnica (vedi Circolare n. N.0026663 del 10/04/2018)

PFC 1(C)(II)(a)

CONCIME INORGANICO SEMPLICE A BASE DI MICROELEMENTI
Concime a base di microelementi

COMPOSIZIONE

50 %	Rame (Cu) totale, nella forma di triidrossocloruro di dirame

CARATTERISTICHE

Aspetto
Polvere fine di colore blu

Densità a 20 °C
3,67 Kg/L

CE

1 KG 5 KG 15 KG

NUTRIVIT 50 VERDE

BIOSOLUZIONI BIO



PFC 1(C)(II)(a)
CONCIME INORGANICO SEMPLICE A BASE DI MICROELEMENTI
Concime a base di microelementi

DESCRIZIONE

NUTRIVIT 50 VERDE è un concime a base del microelemento Rame che svolge principalmente una funzione catalitica risultando indispensabile per il metabolismo vegetale. NUTRIVIT 50 VERDE permette di regolare lo svolgimento delle attività metaboliche della pianta in quanto il rame è un costituente di alcuni enzimi ed è importante per la sintesi della clorofilla.
NUTRIVIT 50 VERDE previene le carenze di Rame incrementandone la disponibilità soprattutto nei suoli ricchi di sostanza organica o a reazione alcalina. NUTRIVIT 50 VERDE deve essere impiegato per concimazione fogliare.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Evitare di miscelare con prodotti a reazione alcalina. Verificare la compatibilità di volta in volta.
L'impiego dei concimi a base di Rame si deve limitare ai casi in cui sussistano specifiche esigenze nutritive, tale impiego, è possibile in presenza di una dimostrata necessità e da una relativa documentazione tecnica (vedi Circolare n. N.0026663 del 10/04/2018).

COMPOSIZIONE

50 % Rame (Cu) totale, nella forma di triidrossocloruro di dirame

CARATTERISTICHE

Aspetto
Polvere fine di colore verde

Densità a 20 °C
3,67 Kg/L

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE Kg/ha
Frutticoltura, Vite, Olivo	1,4 - 1,8
Ortaggi e Fragola	1,8 - 2,2
Barbabietola, Cereali, Tabacco	1 - 1,4

L'impiego dei concimi a base di Rame si deve limitare ai casi in cui sussistano specifiche esigenze nutritive, tale impiego, e possibile in presenza di una dimostrata necessità e da una relativa documentazione tecnica (vedi Circolare n. N.0026663 del 10/04/2018)

1 KG 5 KG 15 KG CE

SULPHUR 840 L

BIOSOLUZIONI BIO



CORRETTIVO
CORRETTIVO DIVERSO
SOSPENSIONE DI ZOLFO IN ACQUA
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
N. Reg. 0044241/25
UFI: XVWW-PMU3-0SEJ-UFGR

DESCRIZIONE

SULPHUR 840 L è un concime correttivo a base di Zolfo ideale per sopperire a eventuali carenze del meso elemento Zolfo. SULPHUR 840 L permette di abbassare il pH in modo da poter migliorare la disponibilità dei microelementi presenti nel terreno avendo effetti positivi sulla qualità delle produzioni. L'impiego di SULPHUR 840 L porta a una serie di vantaggi funzionali per la coltura come incremento qualitativo e quantitativo delle produzioni, prevenzione da carenze di nutrienti.

FITOTOSSICITÀ

Può essere dannoso ad alcune cultivar di Melo (Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Jonathan, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap), Pero (Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, Decana del Comizio) e alle cucurbitacee, su alcune cultivar di melone, si raccomanda pertanto di effettuare saggi preliminari prima dell'impiego. Non trattare con pianta bagnata (es. rugiada) o con temperature molto elevate. Per evitare problemi di scottature solari (sun burn) prestare attenzione alle giornate limpide e particolarmente soleggiate. Limitare i volumi di bagnatura per evitare gocciolamenti e depositi. Visto il rapido evolversi di nuove varietà si consiglia di effettuare sempre una prova di saggio su una porzione limitata di campo prima dell'impiego.

AVVERTENZE

Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Evitare di miscelare con prodotti a reazione alcalina e oli minerali. Verificare la compatibilità di volta in volta.

COMPOSIZIONE

60%	Zolfo (S) totale

CARATTERISTICHE

Aspetto
Leggermente giallo

Densità a 20 °C
1,4 Kg/L

pH (20°C)
6,5 – 7,5

Punto di congelamento
0° C

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE g/hL
Vite, Agrumi, Actinidia, Pomacee (Melo, Pero, Cotogno), Drupacee (Pesco, Nettarino, Ciliegio e Albicocco), Noce, Nocciolo, Mandorlo e altra frutta a guscio, Olivo	300 - 400
Patata, Pomodoro, altre Colture Orticole (Asparago, Carciofo, Cavolo, Cavolfiore, Broccolo, Cetriolo, Cocomero, Melone, Zucchino, Zucca, Peperone, Insalata e altri ortaggi a foglia, Basilico e altre erbe fresche, Rucola, Pisello, Fagiolo e altri legumi, Fagiolino, Melanzana, Sedano, Carota, Ravanello, Finocchio, Cipolla, Aglio e altre bulbacee, ecc)	300 - 400
Fragola e altri piccoli frutti	300 - 400
Grano, Orzo e altri cereali a paglia, Mais, Riso, Girasole, Colza, Soia, Barbabietola da zucchero	300 - 400
Colture ornamentali e floreali	300 - 400

10 L

ZINCBACT



DESCRIZIONE

ZINCBACT è un formulato a base di Zinco con una particolare formulazione che permette un rapido assorbimento fogliare. L'applicazione di ZincBact permette di prevenire e curare alcune gravi fisiopatie quali: foglie piccole con apici biancastri, sviluppo stentato (nanismo), accorciamento degli internodi e scarsa fruttificazione. ZINCBACT svolge un importante ruolo fisiologico nelle piante in quanto favorisce la formazione e lo sviluppo dei semi, catalizza importanti processi metabolici, essenziale per la stabilità ed il mantenimento della struttura dei ribosomi nella sintesi proteica, promuove l'allungamento dello stelo e favorisce la trasformazione degli zuccheri. ZINCBACT, grazie alla sua particolare formulazione, permette di mantenere pulita la superficie fogliare e inoltre il pH acido permette di migliorare la qualità delle acque.

PFC 1(C)(II)(a):

CONCIME INORGANICO SEMPLICE A BASE DI MICROELEMENTI
Concime in soluzione a base di microelementi

CONTENUTO

2%

Zinco (Zn) totale
di cui 2 % Zinco (Zn) chelato con EDTA
Agente chelante: EDTA. Intervallo di pH della frazione chelata: 2-10

CARATTERISTICHE

Aspetto	Densità a 20 °C	pH (20°C)
Soluzione incolore	1,10 - 1,15 Kg/L	< 1

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Evitare l'uso durante le ore più calde della giornata, è opportuno che il prodotto asciughi in modo corretto. Il prodotto è miscelabile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti. Inserire ZincBact come primo elemento nella soluzione acquosa. Non mescolare con composti contenenti metalli (in particolare chetati), olii, Zolfo, Cloro, Ipoclorito, Tiosolfati, Solfiti, Metabisolfiti, materiali infiammabili e sostanze riducenti, in caso di dubbi, verificare la miscibilità in anticipo. Non sono state finora evidenziate incompatibilità varietali, in ogni caso effettuare un test preliminare prima dell'applicazione. Nel caso si utilizzino acque dure o con pH anomali, utilizzare preferibilmente il dosaggio più elevato. In caso di bisogno riconosciuto non aumentare i dosaggi, ma ridurre il tempo di intervento.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE

Dotare di adeguata ventilazione i luoghi di lavoro. Tenere lontano da fiamme libere, scintille, altre fonti di ignizione e sorgenti di calore. Evitare l'esposizione diretta al sole. Conservare a temperature < 25°C. Areare i locali: conservare in ambienti freschi e sempre ben areati. Evitare l'esposizione diretta al sole. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. Durante la manipolazione indossare occhiali integrali e indumenti protettivi per agenti chimici EN340, stivali. Indossare guanti antiacido EN 374; per la scelta del materiale valutare il processo di utilizzo del prodotto: a) uso frequente: spessore del guanto: ≥ 0.7 mm. Valore per la permeazione: Level = 480 min (cat. 6 norma EN 374); b) uso bassa frequenza (protezione da schizzi): NBR (gomma nitrilica). Spessore del materiale: ≥ 0.5 mm. Tempo di penetrazione: ≥ 60 min. In ambienti poco ventilati: elmetto di protezione delle vie respiratorie. Per utilizzo prolungato: Filtro ABEK- P2 EN 14387.

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE L/ha	EPOCA
Actinidia, Vite, Pomacee, Drupacee, Nocciolo, Noce e altra frutta a guscio, Olivo	3	3-4 applicazioni da ripetere a distanza di 7-10 giorni
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucca, Zucchina, Carciofo	1,5 - 2,5	3-4 applicazioni da ripetere a distanza di 7-10 giorni
Altre Colture Orticole	1,5 - 2,5	3-4 applicazioni da ripetere a distanza di 7-10 giorni
Patata	1,5 - 2,5	3-4 applicazioni da ripetere a distanza di 7-10 giorni
Vivaismo	1,5 - 2	2-3 applicazioni da ripetere a distanza di 7 giorni
Prati erbosi	3 - 4	1-2 applicazioni da ripetere a distanza di 10-15 giorni

10 KG


I NOSTRI TECNICI IN CAMPO,
VERI E PROPRI MEDICI
DELLE TUE COLTURE.

FERTILIZZANTI

STARTERS

Concimi ad altissima efficienza nutritiva in grado di generare un rapido effetto starter.

FERTIFOS 10-34

STARTER



CONTENUTO

10 %	Azoto (N) totale di cui 10% Azoto (N) ammoniacale
34 %	Anidride Fosforica (P_2O_5) totale 34% anidride fosforica (P_2O_5) idrosolubile

PFC 1(C)(I)(b)(ii)

CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime NP 10-34 in soluzione

CARATTERISTICHE

Aspetto
Soluzione di colore verde

Densità a 20 °C
1,40 Kg/L

pH (20°C)
5,5–7

APPLICAZIONE AL SUOLO	DOSE Kg/ha	EPOCA
Mais, Sorgo	50 - 60	Alla semina localizzato
Frumento, Cereali a paglia	50 - 60	Alla semina localizzato
Barbabietola da zucchero	50 - 60	Alla semina localizzato
Colza, Girasole	50 - 60	Alla semina localizzato
Pomodoro	50 - 60	Alla semina localizzato
Colture orticole pieno campo	50 - 60	Al trapianto localizzato
Patata	50 - 60	Al trapianto localizzato
Tabacco	50 - 60	Al trapianto localizzato
Colture orticole in serra	50 - 60	Al trapianto localizzato in fertirrigazione
Ornamentali e vivai	40 - 80 g/pianta	All'impianto in fertirrigazione

CE

30 KG 1000 L 30 T

FOSFODRIP STARTER

STARTER



DESCRIZIONE

FOSFODRIP STARTER è un concime fosfo-azotato in cui la componente da polifosfato d'ammonio risulta opportunamente stabilizzata per consentire l'impiego anche in presenza di terreni calcarei, di acque dure e con impianti di fertirrigazione sofisticati. Grazie alla presenza dello ione polifosfato, manifesta un marcato effetto "starter" ed una maggiore mobilità nel suolo rispetto ad altre forme fosforiche. Se ne consiglia l'utilizzo come fertirrigante nelle fasi iniziali del ciclo colturale o tal quale in localizzazione nelle semine/trapianti di colture a pieno campo o in serra.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Negli impieghi in fertirrigazione si consiglia di distribuire almeno 5 mc di acqua per 10.000 mq. È consigliabile non superare la concentrazione del 2‰ in presenza di acque dure.

PFC 1(C)(I)(b)(ii)

CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime NP con microelemento, 5-30 in soluzione

CONTENUTO

5 %	Azoto (N) totale 2,5% Azoto (N) nitrico 2,5% Azoto (N) ammoniacale
30 %	Anidride Fosforica (P_2O_5) totale 30% anidride fosforica (P_2O_5) idrosolubile
0,2 %	Zinco (Zn) totale, nella forma di solfato

CARATTERISTICHE

Aspetto
Liquido limpido verde

Densità a 20 °C
1,35 – 1,37 Kg/L circa

pH (20°C)
< 1

APPLICAZIONE AL SUOLO	DOSE Kg/ha	EPOCA
Mais, Sorgo	50 - 60	Alla semina localizzato
Frumento, Cereali a paglia	50 - 60	Alla semina localizzato
Barbabietola da zucchero	50 - 60	Alla semina localizzato
Colza, Girasole	50 - 60	Alla semina localizzato
Pomodoro	50 - 60	In localizzazione alla semina/trapianto
Ortive pieno campo	50 - 60	In localizzazione alla semina/trapianto
Tabacco	50 - 60	Alla semina localizzato
Ortive in serra	50 - 60	Alla semina localizzato

30 KG 1000 L 30 T

CE

FOSFONITRIC ACID

STARTER



DESCRIZIONE

FOSFONITRIC ACID è un concime fluido minerale composto ad alta concentrazione di P_2O_5 abbinata all'azoto in forma nitrica prontamente disponibile per tutte le colture sia erbacee che arboree. FOSFONITRIC ACID, grazie al suo pH fortemente acido, è ideale per le applicazioni in fertirrigazione per soddisfare i fabbisogni in fosforo delle colture e per favorire lo sviluppo degli apparati radicali ed un rapido avvio della coltura. FOSFONITRIC ACID facilita la preparazione di soluzioni fertirriganti più complete essendo miscibile con quasi tutti i fertilizzanti.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Le miscele con altri concimi devono essere eseguite con soluzioni diluite. Si consiglia di fare delle prove in quantità ridotte per testarne la compatibilità.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Stoccare in ambienti freschi ed areati, al riparo dai raggi solari diretti e lontano da potenziali fonti di calore. Evitare il riscaldamento dei contenitori, saldature o lavori a caldo su apparecchi o impianti che possono aver contenuto il prodotto.

PFC 1(C)(I)(b)(ii)

CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime NP 3-40 in soluzione

CONTENUTO

3 %	Azoto (N) totale 3% Azoto (N) nitrico
40 %	Anidride Fosforica (P_2O_5) totale 30% Anidride Fosforica (P_2O_5) idrosolubile

CARATTERISTICHE

Aspetto
Liquido limpido verde

Densità a 20 °C
1,54 – 1,56 Kg/L

pH (20°C)
< 1

L'acquisizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di questo prodotto da parte di privati sono soggetti a restrizioni a norma del Regolamento (UE) 2019/1148. Tutte le transazioni sospette e le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati al punto di contatto nazionale competente.

APPLICAZIONE AL SUOLO	DOSE Kg/ha	EPOCA
Mais, Sorgo	50 - 60	Alla semina localizzato
Frumento, Cereali a paglia	50 - 60	Alla semina localizzato
Barbabietola da zucchero	50 - 60	Alla semina localizzato
Colza, Girasole	50 - 60	Alla semina localizzato
Pomodoro	50 - 60	Alla semina/trapianto localizzato applicare in fertirrigazione
Ortive pieno campo	50 - 60	Alla semina/trapianto localizzato applicare in fertirrigazione
Tabacco	50 - 60	Alla semina/trapianto localizzato applicare in fertirrigazione
Ortive in serra	50 - 60	Alla semina/trapianto localizzato applicare in fertirrigazione

CE

30 KG 1000 L 30 T

GRANOFOS® ZN SUPER

STARTER



DESCRIZIONE

GRANOFOS® ZN SUPER è un concime liquido binario a base di polifosfato d'ammonio che si caratterizza per un'elevata efficienza fertilizzante dovuta all'effetto sinergico che si instaura tra la componente ammoniacale, la componente fosforica e lo Zinco. Il fosforo, abbinato allo Zinco, induce ad una più intensa attività radicale delle piante permettendo un vigoroso sviluppo dell'apparato radicale.
GRANOFOS® ZN SUPER manifesta un marcato effetto starter nei confronti delle colture.
GRANOFOS® ZN SUPER può essere utilizzato nelle semine e nei trapianti delle colture o in fertirrigazione nelle fasi iniziali del ciclo colturale.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Negli impieghi in fertirrigazione si consiglia di distribuire almeno 5m³ di acqua per ettaro. È consigliabile non superare la concentrazione del 2% in presenza di acque dure.
GRANOFOS® ZN SUPER può essere utilizzato nelle semine e nei trapianti delle colture o in fertirrigazione nelle fasi iniziali del ciclo colturale.

PFC 1(C)(I)(b)(ii)

CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
CONCIME NP in soluzione 7-20 con microelemento

CONTENUTO

7 %	Azoto (N) totale 7% Azoto (N) ammoniacale
20 %	Anidride Fosforica (P_2O_5) totale 20% Anidride Fosforica (P_2O_5) idrosolubile
1 %	Zinco (Zn) totale, nella forma di solfato

CARATTERISTICHE

Aspetto
Liquido opalescente giallo paglierino

Punto di congelamento
-3°C

Densità a 20 °C
1,25 – 1,30 Kg/L circa

pH (20°C)
5-7

Conducibilità elettrica (0,1%)
1,3 mS/cm

APPLICAZIONE AL SUOLO	DOSE Kg/ha	EPOCA
Mais, Sorgo	50 - 60	Alla semina localizzato
Riso in asciutta	60 - 80	Alla semina localizzato
Frumento, Cereali a paglia	60 - 80	Alla semina localizzato
Barbabietola da zucchero	60 - 80	Alla semina localizzato
Colza, Girasole	60 - 80	Alla semina localizzato
Pomodoro	60 - 80	Alla semina localizzato
Ortive pieno campo	60 - 80	Alla semina localizzato
Tabacco	60 - 80	Alla semina localizzato
Ortive in serra	60 - 80	Al trapianto localizzato in fertirrigazione
Ornamentali e vivai	40 - 80 g/pianta	All'impianto in fertirrigazione

30 KG 1000 L 30 T

CE

GRANOFOS® Marchio Registrato Euro TSA SRL

COSA RENDE UNICA LA LINEA MICROSEED® DI EURO TSA?



Concezione Tecnica

La formulazione microgranulare di Euro TSA si caratterizza per:

- Diametro omogeneo compreso tra 0,3-1 mm che determina un ***aumento della superficie di contatto fino a 5-6 volte***
- ***Assenza di polverosità*** grazie all'elevata scorrevolezza del microgranulo
- ***Omogenea composizione chimica*** di ogni singolo microgranulo
- ***Elasticità di utilizzo*** in pieno campo, serra e terricciati.

Praticità di distribuzione

- Con microgranulatore
- All'interno della tramoggia stratificato con la semente
- Miscelato con i substrati di coltivazione

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI DELLA LINEA MICROSEED® →

MICROSEED® BIO

STARTERS BIO



Unico microgranulo biologico con elevato titolo di fosforo

CONCIME ORGANO-MINERALE
CONCIME ORGANO-MINERALE NP
Consentito in Agricoltura Biologica
N. Reg. f 0004729/15

DESCRIZIONE

MICROSEED® BIO è un concime microgranulare fosfo-azotato NP per l'agricoltura biologica adatto nella concimazione localizzata alla semina o al trapianto di colture quali mais, pomodoro, girasole, bietola da zucchero, cereali autunno-vernini.
MICROSEED® BIO contiene Azoto organico a lento rilascio e Anidride fosforica proveniente da fosfati naturali teneri. I fosfati naturali miscelati con una matrice organica nobile permettono di avere un prodotto molto attivo anche in terreni alcalini.
MICROSEED® BIO presenta un effetto starter che si manifesta con un pronto sviluppo dell'apparato radicale e un vigoroso sviluppo delle giovani piantine. Si distribuisce con l'ausilio dei microgranulatori presenti sulle seminatrici. Con la localizzazione del concime alla semina si riducono gli sprechi e si ottimizzano i tempi e i relativi costi della distribuzione, massimizzando l'efficienza della fertilizzazione.

Materie prime: Fosforite naturale, cuoio e pelli idrolizzati

CONTENUTO

5 %	Azoto (N) totale 5% Azoto (N) organico
16 %	Anidride Fosforica (P_2O_5) totale 13% anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acido formico al 2%
25 %	Carbonio (C) organico

CARATTERISTICHE

Aspetto
Microgranulo di diametro 0,3 - 1,0 mm

Densità a 20 °C
0,8 Kg/L

APPLICAZIONE AL SUOLO	DOSE Kg/ha	EPOCA
Mais	35 - 45	In localizzazione alla semina
Barbabietola da zucchero	30 - 40	In localizzazione alla semina
Soia, Girasole, Sorgo	30 - 50	In localizzazione alla semina
Pomodoro	35 - 50	In localizzazione alla semina
Tabacco	35 - 50	In localizzazione alla semina/trapianto
Colture orticole	30 - 45	In localizzazione alla semina
Cereali autunno-vernini, Colza	30 - 45	In localizzazione alla semina/trapianto
Tappeti erbosi	35 - 50	In localizzazione alla semina/trapianto
Piante ornamentali e officinali	35 - 50	Al momento dell'impianto
Terricciati	60 g/m2 800 g/m3	Miscelare in modo uniforme in prossimità dell'utilizzo

10 KG

QUALITALY
MEZZI TECNICI (INPUT)

MICROSEED® Marchio Registrato Euro TSA SRL

NOVITÀ STARTERS BIO

MICROSEED® MYCO

Coltiva il potenziale partendo dal suolo

SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE
SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE MISTO
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
N. Reg. 0029800/20



DESCRIZIONE

MICROSEED® MYCO è un prodotto misto utilizzabile anche in agricoltura biologica contenente concime microgranulare organo minerale contenente Azoto organico a lento rilascio, Anidride fosforica proveniente da fosfati naturali teneri e Micorrize concentrate. I fosfati naturali miscelati con una matrice organica nobile e con le micorrize permettono di avere un prodotto molto attivo nella stimolazione della germinazione e dello sviluppo radicale della coltura interessata favorendo e incrementando un maggiore assorbimento dei nutrienti presenti nel suolo, una maggiore resistenza agli stress idrici, climatici e fisiologici come crisi post-trapianto.

MICROSEED® MYCO presenta un effetto starter che si manifesta con un pronto sviluppo dell'apparato radicale e un vigoroso sviluppo delle giovani piantine. Si distribuisce con l'ausilio dei microgranulatori presenti sulle seminatrici o mediante stratificazione nella tramoggia con la semente. Con la localizzazione del concime alla semina si riducono gli sprechi e si ottimizzano i tempi e i relativi costi della distribuzione, massimizzando l'efficienza della fertilizzazione.

MICROSEED® MYCO è adatto nella concimazione localizzata alla semina o al trapianto di colture estensive (mais, pomodoro, girasole, bietola da zucchero, cereali autunno-vernini e riso, ecc) o di colture arboree, orticole e floreali (cucurbitacee, ortaggi a foglia, ortaggi a frutti, insalate, fragole, ecc).

CONTENUTO

5 %	Azoto (N) totale di cui 5% Azoto (N) organico
16 %	Anidride Fosforica (P_2O_5) totale di cui 13% Anidride Fosforica (P_2O_5) solubile in acido formico al 2%
25 %	Carbonio (C) organico di cui 24% Carbonio (C) organico su sostanza secca
Dose concentrata di spore e propaguli attivi	Micorizze (*Rhizophagus irregularis, Claroideoglomus luteum, Claroideoglomus etunicatum e Claroideoglomus claroideum*) e batteri della rizosfera

CARATTERISTICHE

Aspetto
Microgranulo di diametro 0,3 - 1,0 mm

pH (20°C)
5.0 - 6.0

Densità a 20 °C
0,8 Kg/L

Conducibilità elettrica (0,1%)
0,95 mS/cm

Porosità totale
1%

APPLICAZIONE AL SUOLO	DOSE Kg/ha	EPOCA
Mais	35	In localizzazione alla semina
Cereali autunno-vernini	35	In localizzazione alla semina
Riso	35	In localizzazione alla semina
Oleaginose	35	In localizzazione alla semina
Vite da vino e da tavola	35 (5-10 g/pianta)	In localizzazione alla semina/trapianto Mescolare bene il prodotto e non superare la dose consigliata
Piante da frutto	35 (5-10 g/pianta)	In localizzazione alla semina/trapianto Mescolare bene il prodotto e non superare la dose consigliata
Pomodoro (in pieno campo o serra)	35	In localizzazione alla semina/trapianto
Fragola (in pieno campo o serra)	35	In localizzazione alla semina/trapianto
Peperoni, melanzana, ortaggi a frutto (in pieno campo o serra)	35	In localizzazione alla semina/trapianto
Cucurbitacee (in pieno campo o serra)	35	In localizzazione alla semina/trapianto
Ortaggi a foglia, lattughe e altri tipi di insalate (in pieno campo o serra)	35	In localizzazione alla semina/trapianto
Ortaggi a radice e tubero	35	In localizzazione alla semina/trapianto
Legumi	35	In localizzazione alla semina/trapianto
Ortaggi a stelo	35	In localizzazione alla semina/trapianto
Bulbose e liliacee	35	In localizzazione alla semina/trapianto
Bacche e piccola frutta	35	In localizzazione alla semina/trapianto
Piante aromatiche (in pieno campo o serra)	35	In localizzazione alla semina/trapianto
Floreali e ornamentali (in pieno campo o serra)	35	In localizzazione alla semina/trapianto
Patata, Tabacco	35	In localizzazione alla semina
Tappeti Erbosi e Prati	35	Al momento dell'impianto
Terricciati	60 g/m² / 800 g/m³	Miscelare in modo uniforme in prossimità dell'utilizzo

10 KG

MICROSEED® Marchio Registrato Euro TSA SRL

MICROSEED® ZN SUPER

STARTER



Garantisci un rapido effetto starter alla tua coltura

DESCRIZIONE

MICROSEED® ZN SUPER è un concime prill (microgranulare) che garantisce un rapido "effetto starter" grazie alla perfetta combinazione di azoto, fosforo e zinco protetti da matrice organica che ne assicura la disponibilità e ne impedisce la retrogradazione. MICROSEED® ZN SUPER si caratterizza per un microgranulo sferico, compatto e scorrevole dal diametro di 1,05 mm che può essere distribuito mediante microgranulatore o stratificato con la semente, solo quella dei cereali a paglia (10 kg di MICROSEED® ZN SUPER ogni 100 kg di seme) riducendo in questo modo gli sprechi, ottimizzando la logistica e massimizzando l'efficienza fertilizzante.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione.

PFC 1(C)(I)(a)(ii)

CONCIME INORGANICO SOLIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime NP con microelemento, 11-47

CONTENUTO

11 %	Azoto (N) totale 11% Azoto (N) ammoniacale
47 %	Anidride Fosforica (P_2O_5) totale 43% Anidride Fosforica (P_2O_5) idrosolubile 4% Anidride Fosforica (P_2O_5) solubile in citrato ammonico neutro
1 %	Zinco (Zn) totale, nella forma di ossido

CARATTERISTICHE

Granulometria
Prill. Il 99% del prodotto passa attraverso il setaccio di 1,05 mm di diametro

Densità a 20 °C
0,8 Kg/L

Ingredienti
MAP 12:52[1], Leonardite[1] CAS 129521-66-0.
1 - CMC 1: sostanze e miscele a base di materiale grezzo

APPLICAZIONE AL SUOLO	DOSE Kg/ha	EPOCA
Mais	25 - 35	In localizzazione alla semina
Riso	25 - 35	In localizzazione alla semina
Barbabietola da zucchero	30 - 40	In localizzazione alla semina
Soia, Girasole, Sorgo	20 - 35	In localizzazione alla semina
Pomodoro	30 - 45	In localizzazione alla semina/trapianto
Tabacco	30 - 45	In localizzazione alla semina/trapianto
Colture orticole	25 - 35	In localizzazione alla semina/trapianto
Cereali autunno-vernini, Colza	25 - 40	In localizzazione alla semina
Terricciati	30 g/m2 300 g/m3	Miscelare in modo uniforme in prossimità dell'utilizzo

MICROSEED® Marchio Registrato Euro TSA SRL

CE

10 KG

“Sono due anni che utilizzo i microgranulari Euro TSA e mi sono trovato molto bene. Resiste alle piogge e si comporta bene anche con i terreni asciutti.”

Aldo
AZIENDA AGRICOLA DOGLIANI ALDO
Cliente Euro TSA dal 2024



P 54

STARTER



CONTENUTO

40 % Anidride Fosforica (P_2O_5) totale da acido ortofosforico

CONCIME MINERALE SEMPLICE
FOSFATICO FLUIDO
Acido Fosforico
N. Reg. 0004705/15

CARATTERISTICHE

Aspetto
Liquido limpido verde

Punto di congelamento
-17.5°C

Densità a 20 °C
1,40 Kg/L

pH (20°C)
< 2

Conducibilità elettrica (0,1%)
1.00 mS/cm

30 KG 1000 L 30 T

P 75

STARTER



CONTENUTO

54 % Anidride Fosforica (P_2O_5) totale da acido ortofosforico

CONCIME MINERALE SEMPLICE
CONCIME FOSFATICO FLUIDO
Acido Fosforico
N. Reg. 0017440/16

CARATTERISTICHE

Aspetto
Liquido limpido verde

Punto di congelamento
-17.5°C

Densità a 20 °C
1,65 Kg/L

pH (20°C)
< 0,5

Conducibilità elettrica (0,1%)
1.00 mS/cm

30 KG 1000 L 30 T

AZOTATI LIQUIDI

Concimi liquidi a base di azoto a elevata efficienza nutrivitiva, a lenta cessione, contenenti calcio, magnesio e zolfo.

FERTILCEREAL® 21 DCD



Azoto a lenta cessione con Zolfo per incrementare la sintesi proteica

CONCIME MINERALE SEMPLICE
CONCIME AZOTATO FLUIDO
SOLUZIONE DI CONCIME AZOTATO
CONTENENTE DICIANDIAMMIDE E ZOLFO
N. Reg. 0039082/23
UFI: VF10-J0AV-7002-W5NC

DESCRIZIONE

FERTILCEREAL® 21 DCD è un concime liquido azotato semplice nel quale la funzione del nutriente azoto (ureico e ammoniacale) è stata legata alla Diciandiammide in modo da ottenere positivi vantaggi economici e ambientali di gestione di questo macronutriente relativamente ai processi di trasformazione biologica. Grazie all'inibitore Diciandiammide, l'azoto ammoniacale viene trasformato in azoto nitrico in un periodo di tempo compreso tra le 8 e le 12 settimane riducendo l'apporto tradizionale di azoto. L'attività inibitoria della Diciandiammide nei confronti dell'ureasi e dei batteri nitrificanti si manifesta in una riduzione delle perdite per lisciviazione e volatilizzazione. L'azione inibitoria della Diciandiammide, presenta assoluta invarianza rispetto alle condizioni ambientali e questo, unitamente alla facilità di impiego, fa di FERTILCEREAL® 21 DCD un prodotto decisamente interessante rispetto ad altri composti analoghi, in quanto l'azoto distribuito viene assorbito completamente dalla coltura interessata.
FERTILCEREAL® 21 DCD è un prodotto studiato appositamente per l'impiego efficace nelle concimazioni azotate primaverili (colza, mais, cereali a paglia) effettuate unitamente al diserbo o ai trattamenti fungicidi e insetticidi, in manichetta e/o con le calate.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

La definizione della dose da apportare alla coltura interessata dovrà essere stabilita prendendo in considerazione la fertilità del suolo e lo stato fisiologico della pianta.
Si consiglia per l'utilizzo del prodotto a pieno campo di usare ugelli appositi per fertilizzanti liquidi. Si consiglia l'uso del prodotto in fertirrigazione.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Miscelabile con tutti i prodotti liquidi a pH > 7,5.
Miscibilità con diserbanti da verificare.
Effettuare le applicazioni nelle ore più fresche della giornata.

COMPOSIZIONE

21 %	Azoto (N) totale 4% Azoto (N) ammoniacale 17% Azoto (N) ureico
10 %	Anidride Solforica (SO_3) solubile in acqua
0,47 %	Inibitore DCD in massa dell'azoto ureico eammoniacale

CARATTERISTICHE

Aspetto
Liquido blu

Densità a 20 °C
1,22 Kg/L circa

Conducibilità elettrica (0,1%)
0,72 mS/cm

Punto di congelamento
-5°C

pH (20°C)
6,5 - 7

Per concimazioni fogliari usare ugelli a sette fori.

FERTILCEREAL® Marchio Registrato Euro TSA SRL

30 KG 1000 L 30 T

N 30 DCD



Azoto a lenta cessione

CONCIME MINERALE SEMPLICE
CONCIME AZOTATO FLUIDO
SOLUZIONE DI NITRATO AMMONICO E UREA
CONTENENTE DICIANDIAMMIDE
N. Reg. 0039081/23
UFI: S740-R0EK-000W-239E

DESCRIZIONE

N30 DCD è un concime le cui tre forme azotate (nitrica, ammoniacale, ureica) risultano perfettamente bilanciate. In questo modo la coltura dispone di una quota di azoto prontamente disponibile e di una quota in grado di soddisfare i fabbisogni nelle fasi successive del ciclo colturale. La presenza della DICIANDIAMMIDE permette la massimizzazione dell'efficienza e della disponibilità dell'unità di azoto rallentando il processo di nitrificazione e riducendo le perdite per volatilizzazione e per lisciviazione. N30 DCD è indicato sia nei periodi di intenso sviluppo vegetativo sia nel caso la coltura debba superare fasi di blocchi di crescita dovuti a stress ambientali. N30 DCD è applicabile su tutte le colture agrarie che necessitano azoto e viene distribuito a pieno campo, localizzato in banda o in fertirrigazione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Applicazione in fertirrigazione e pieno campo. La definizione della dose da apportare alla coltura interessata dovrà essere stabilita prendendo in considerazione la fertilità del suolo e lo stato fisiologico della pianta.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Miscelabile con tutti i prodotti liquidi. Prestare attenzione alle miscele con prodotti contenenti potassio. In ambiente protetto (serra, tunnel) la dose non deve superare i 200 gr/hl d'acqua. In caso di attrezzature con parti in stagno, rame e relative leghe, si consiglia di lavare accuratamente le attrezzature dopo l'uso. Effettuare le applicazioni nelle ore più fresche della giornata.

Questo prodotto è disciplinato dal Regolamento (UE) 2019/1148: tutte le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore al punto di contatto nazionale competente.

COMPOSIZIONE

30 %	Azoto (N) totale di cui 7,5% Azoto (N) nitrico 7,5% Azoto (N) ammoniacale 15% Azoto (N) ureico
0,5 %	Inibitore DCD in massa dell'azoto ureico e ammoniacale

CARATTERISTICHE

Aspetto
Liquido blu

Densità a 20 °C
1,25-1,30 Kg/L circa

Punto di congelamento
-10°C

pH (20°C)
6 - 8

Per l'applicazione a pieno campo si consiglia l'impiego di ugelli a 7 fori

30 KG 30 T

N-DIGEST DCD



Valorizza la concimazione azotata

PFC 5(A): INIBITORE DELLA NITRIFICAZIONE

DESCRIZIONE

N-DIGEST DCD è una formulazione liquida che, aggiunta al digestato o al letame o ai fertilizzanti azotati liquidi, riduce le perdite dovute alla volatilizzazione e alla lisciviazione dell'azoto, aumentandone così la disponibilità fino a 8-12 settimane. N-DIGEST DCD consente di fissare l'azoto nitrificabile nel terreno in modo che sia completamente disponibile per la coltivazione.

CONTENUTO

26,6%	Diciandiamide (DCD)

CARATTERISTICHE

Aspetto
Incolore

Punto di congelamento
<0°C

Densità a 20 °C
1,23 - 1,25 Kg/L

pH (20°C)
3 - 5

DOSI, MODALITÀ D'IMPIEGO E COMPATIBILITÀ

Il prodotto deve essere miscelato a prodotti fertilizzanti in cui almeno il 50% del contenuto totale di azoto è costituito dalle forme di azoto ammoniacale e ureico. In caso di miscelazione con fertilizzanti minerali liquidi e granulari si consiglia di aggiungere 1,5-5 L per ogni 100 kg di fertilizzante in base al contenuto di azoto ammoniacale e ureico (N-DIGEST DCD dovrebbe essere il 2,25% della somma delle due forme azotate). Aggiungere N-DIGEST DCD al digestato o al letame secondo la seguente tabella:

VOLUME DIGESTATO O LIQUAME DISTRIBUITO	CONCENTRAZIONE % N TOTALE	VOLUME N-DIGEST- DCD DA AGGIUNGERE AL DIGESTATO O LIQUAME
500 q.li/ha	0,2	7 L
	0,3	10 L
	0,7	24 L
1000 q.li/ha	0,2	14 L
	0,3	20 L
	0,7	48 L

30 KG 1250 KG

NITROCAL



Azoto semplice e Calcio

PFC 1(C)(I)(b)(i)

CONCIME INORGANICO LIQUIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI
Concime N (Ca), 8 (+15) in soluzione

CONTENUTO

8 %	Azoto (N) totale 8% Azoto (N) nitrico
15 %	Ossido di Calcio (CaO) idrosolubile

CARATTERISTICHE

Aspetto
Soluzione limpida

Densità a 20 °C
1,40 Kg/L circa

Conducibilità elettrica (0,1%)
1,21 mS/cm

Punto di congelamento
-6°C

pH (20°C)
1 - 3

IMPIANTO	APPLICAZIONE FERTIRRIGAZIONE CON EFFETTO DESALINIZZANTE
Pre-impianto	Distribuire alla dose di 20 - 40 l/ha con abbondante lavaggio
Post-impianto	Distribuire alla dose di 5 - 7 l/ha ogni 7 -15 giorni

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE L/ha	EPOCA
Pomacee, Drupacee, Kiwi	3 - 5	2 - 3 interventi da allegagione a ingrossamento frutti
Vite	3 - 5	2 - 3 interventi da allegagione a ingrossamento frutti
Colza	3 - 5	2 - 3 interventi da allegagione a ingrossamento frutti
Erba medica	3 - 5	Dopo ogni sfalcio
Patata	3 - 5	2 - 3 interventi da allegagione a ingrossamento frutti
Pomodoro	3 - 5	2 - 3 interventi da allegagione a ingrossamento frutti
Colture orticole	3 - 5	2 - 3 interventi da allegagione a ingrossamento frutti
Fragola e piccoli frutti	3 - 5	2 - 3 interventi da allegagione a ingrossamento frutti

30 KG | 1000 L | 30 T

CE

NITROMAC 24



Azoto semplice in abbinamento a Calcio e Magnesio

PFC 1(C)(I)(b)(i)

CONCIME INORGANICO LIQUIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI
Concime N (Ca, Mg), 8 (+14 +2) in soluzione

CONTENUTO

8 %	Azoto (N) totale 8% Azoto (N) nitrico
14 %	Ossido di Calcio (CaO) idrosolubile
2 %	Ossido di Magnesio (MgO) idrosolubile

CARATTERISTICHE

Aspetto
Soluzione paglierina

Densità a 20 °C
1,40-1,45 Kg/L circa

Conducibilità elettrica (0,1%)
0,937 mS/cm

pH (20°C)
4,5 - 5,5

IMPIANTO	APPLICAZIONE FERTIRRIGAZIONE CON EFFETTO DESALINIZZANTE
Pre-impianto	Distribuire alla dose di 20 - 40 l/ha con abbondante lavaggio
Post-impianto	Distribuire alla dose di 3 - 5 l/ha ogni 7 -15 giorni

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE L/ha	EPOCA
Pomacee, Drupacee, Kiwi	3 - 5	2 - 3 interventi da allegagione a ingrossamento frutti
Vite	3 - 5	2 - 3 interventi da allegagione a ingrossamento frutti
Colza	3 - 5	2 - 3 interventi da allegagione a ingrossamento frutti
Erba medica	3 - 5	Dopo ogni sfalcio
Patata	3 - 5	2 - 3 interventi da allegagione a ingrossamento frutti
Pomodoro	3 - 5	2 - 3 interventi da allegagione a ingrossamento frutti
Colture orticole	3 - 5	2 - 3 interventi da allegagione a ingrossamento frutti
Fragola e piccoli frutti	3 - 5	2 - 3 interventi da allegagione a ingrossamento frutti

CE

30 KG 1000 L 30 T

FERTILIZZANTI

SPECIALI

Prodotti sviluppati per aumentare ed esaltare le rese produttive e le caratteristiche organolettiche dei tuoi raccolti.

BLACK HUMONAS



Energia da acidi umici e acidi fulvici

Leonardite
Ammendante
Leonardite del Nord Dakota (USA)
Consentito in agricoltura biologica
N. Reg 0019923/17

DESCRIZIONE

BLACK HUMONAS è l'unico fisioattivatore liquido che contiene estratti umici e fulvici provenienti dalla Leonardite estratti mediante un metodo naturale.
BLACK HUMONAS possiede un pH acido che favorisce la miscibilità con la maggior parte dei prodotti fitosanitari e fertilizzanti, favorisce la radicazione e la crescita durante le diverse fasi fenologiche della coltura, permette di affrontare efficacemente gli stress di varia natura.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Il prodotto può essere utilizzato con tutti i più comuni fitofarmaci ed è miscibile con i principali fertilizzanti liquidi della linea Euro TSA, ma data l'ampia varietà di prodotti in caso di miscela effettuare una prova preventiva in compatibilità e selettività. Si consiglia di agitare e miscelare prima dell'applicazione.

COMPOSIZIONE

30 %	Carbonio (C) organico sul secco
60 %	Carbonio (C) organico estraibile sul carbonio (C) organico totale
60 %	Carbonio (C) organico umificato sul carbonio (C) estraibile (G.U.)
0,5 %	Azoto (N) organico sul secco
90 %	Sostanza organica sul secco
60 %	Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica
60 %	Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica estraibile
20,5%	Acidi umici
4,5 %	Acidi fulvici

CARATTERISTICHE

Aspetto
Soluzione scura

Punto di congelamento
-5°C

Densità a 20 °C
1,10 Kg/L circa

pH (20°C)
4,2

COLTURE	DOSE L/ha	DOSE L/ha	EPOCA
Pomacee, Drupacee, Kiwi, Frutta a guscio, Olivo, Agrumi, Vite e altra frutta	2	8 - 10	Durante tutto il ciclo ogni 7-10 gg
Fragola e Piccoli frutti	1- 2	6 - 8	Durante tutto il ciclo ogni 7-10 gg
Cereali a paglia, Riso	1 - 1,5	4- 6	Dalla fase di levata alla spigatura
Colza, Girasole Soia, e altre oleaginose	2	4- 6	Dalla fase di accrescimento alla formazione dei baccelli
Mais, Sorgo	1- 2	4- 6	Dalla fase di levata fino alla fioritura
Colture orticole in campo e serra	1- 2	4- 6	Dalla 4 foglia fino all'accrescimento della radice
Barbabietola da zucchero	2	6 - 8	Dalla 4 foglia fino all'accrescimento della radice
Patata	2	6 - 8	Durante tutto il ciclo ogni 7-10 gg
Colture da trapianto	-	25 ml/pianta	Nelle prime fasi successive al trapianto

1,1 KG 5,5 KG

BORON CARE



Assicura la fecondazione dei tuoi fiori

DESCRIZIONE

BORON-CARE è un formulato a base di boro con una particolare formulazione che permette un rapido assorbimento fogliare e stabilità nel suolo entro un ampio intervallo di pH. L'applicazione del prodotto permette di prevenire e curare alcune gravi fisiopatie quali: acinellatura della vite, suberosità dei frutti, cuore cavo della barbabietola da zucchero, ecc.
BORON-CARE svolge un importante ruolo fisiologico nelle piante, risultando determinante nella fase di fioritura, favorisce la fecondazione ed i processi di allegagione, regola la produzione degli zuccheri e catalizza l'assorbimento dei macroelementi.
BORON-CARE si presta ad applicazioni fogliari e radicali.

PFC 1(C)(I)(b)(i)
CONCIME INORGANICO SEMPLICE
A BASE DI MICROELEMENTI
Concime in soluzione a base di microelementi
N. Reg. 0004716/15

COMPOSIZIONE

11 % Boro (B) idrosolubile

CARATTERISTICHE

Aspetto
Soluzione limpida paglierina

Densità a 20 °C
1,35-1,40 Kg/L circa

Conducibilità elettrica (0,1%)
2,40 mS/cm

Punto di congelamento
-3°C

pH (20°C)
8 - 10

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE L/ha	EPOCA
Olivo	1	1° trattamento in pre fioritura - 2° trattamento in allegagione
Vite	1- 2	1° trattamento al germogliamento - 2° trattamento a grappoli separati 3° trattamento all'allegagione
Agrumi	1	1° trattamento alla prima fioritura - 2° trattamento in allegagione
Pomacee, Drupacee	1	1° trattamento in pre fioritura - 2° trattamento in allegagione
Erba medica	1	Dopo ogni sfalcio
Girasole	2	Da 4 a 6 paia di foglie vere
Colza	4	Alla ripresa vegetativa
Colture Orticole	2	Da 4 a 6 paia di foglie vere

1,37 KG 1 L
13,7 KG 10 L
1370 KG 1000 L

CE

CHELIFER 6 WDG



Previeni le clorosi

PFC 1(C)(I)(b)(i)
CONCIME INORGANICO SEMPLICE
A BASE DI MICROELEMENTI
Chelato di Ferro EDDHA

DESCRIZIONE

CHELIFER 6 WDG è un chelato di Ferro granulare per uso radicale solubile in acqua. Il Ferro è chelato con EDDHA al 4,8 % come isomero [O-O] ed al 1,2% come isomero [O-P]. Previene e cura la Clorosi Ferrica. L'ottima solubilità in acqua e l'elevato contenuto dell'isomero orto - orto esaltano la rapida azione rinverdente e la persistenza del CHELIFER 6 WDG nel terreno. Particolarmente indicato per tutte le colture esigenti e sensibili alla carenza di Ferro: Drupacee, Frutteti, Vigneti, Agrumi, Ortaggi, Floricole etc.
CHELIFER 6 WDG esplica la migliore efficacia in somministrazioni radicali ed in fertirrigazioni.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Si consiglia di iniziare i trattamenti alla fine del riposo vegetativo. Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Il prodotto è fotolabile. La responsabilità del fabbricante è limitata solamente alla composizione sull'imballaggio. Il fabbricante non può essere ritenuto responsabile del cattivo impiego. In caso di incendio in cui il prodotto venga coinvolto, utilizzare acqua in abbondanza. Il prodotto è compatibile con i comuni prodotti fitosanitari ad esclusione delle poltiglie alcaline. In casi di fuoriuscita accidentale del prodotto raccogliere con mezzi idonei e smaltire secondo normative locali.

COMPOSIZIONE

6 %

Ferro (Fe) totale di cui
4,8% Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHA
1,2% Ferro (Fe) chelato con [o,p] EDDHA

CARATTERISTICHE

Aspetto
Microgranulo

pH (1%)
2 - 11

Colore
Marrone rossiccio

APPLICAZIONE AL SUOLO	DOSE Kg/ha
Actinidia, Olivo	20
Agrumi	50 - 100
Pomacee	30 - 50
Drupacee	30 - 80
Vite	30 - 50
Orticole e Floricole	2 - 4 g/m2

CONSIGLI DI UTILIZZO

1) miscelare CHELIFER 6 WDG con Black-Humonas 1–2 L/ha, per aumentare l'assorbimento radicale e la traslocazione linfatica;

2) Bagnare il terreno intorno ad alberi e arbusti avendo cura di irrorare bene le radici. CHELIFER 6 WDG puo essere distribuito anche a secco mescolato a un supporto (es. sabbia), incorporato al terreno e quindi seguito da irrigazione.

APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE	DOSE (g/PIANTA)	EPOCA
-	0,005 - 0,2% (50 - 200 g/hl)	-

CE 5 KG

GREENLAST® VEG



Ricco di aminoacidi vegetali per migliorare la qualità dei cereali

DESCRIZIONE

GREENLAST® VEG è un concime organo-minerale azotato fluido in sospensione, pratico, sicuro ed efficace, per applicazioni fogliari. Apporta tre forme di azoto minerale e una di azoto organico, bilanciate tra loro, a rilascio variabile per rispondere al meglio alle esigenze della coltura nei momenti fenologici più critici.
GREENLAST® VEG ha un elevato potere stimolante sul metabolismo della coltura grazie alla presenza di una componente organica nobile: Amminoacidi Vegetali. La combinazione degli Amminoacidi vegetali con lo Zolfo favoriscono la sintesi di Metionina e Cisteina che costituiscono le proteine nobili dei cereali: Gliadina e Glutenina (la combinazione favorisce la formazione del Glutine).
GREENLAST® VEG in miscela con fungicidi e/o insetticidi ne migliora l'uniformità di distribuzione, la persistenza di azione e l'assorbimento (sinergia con l'assorbimento dell'azoto).

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci e fertilizzanti liquidi, si raccomanda comunque di fare delle prove in quantità ridotte, per testarne la totale compatibilità. Conservare il prodotto in ambiente sufficientemente fresco ed ombreggiato.
Questo prodotto è disciplinato dal Regolamento (UE) 2019/1148: tutte le transazioni sospette e le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati al punto di contatto nazionale competente.

CONCIME ORGANO MINERALE AZOTATO IN SOSPENSIONE
N. Reg. 0033676/2

COMPOSIZIONE

21 %	Azoto(N) totale di cui 1% Azoto (N) organico 2,7% Azoto (N) ammoniacale 17% Azoto (N) ureico 0,3% Azoto (N) nitrico
>3,3 %	Carbonio (TOC) organico di origine biologica
>5,6 %	Sostanza organica
13 %	Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua

CARATTERISTICHE

Aspetto
Liquido bruno

Punto di congelamento
-8 °C

Densità a 20 °C
1,25 - 1,30 Kg/L circa

pH (20°C)
5 - 7

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE L/ha	EPOCA
Mais	10 - 30	Dallo stadio di 4 - 5 foglie fino a pre-fioritura in abbinamento a eventuali trattamenti della difesa
Grano, Orzo e altri cereali	10 - 30	Da accestimento a inizio fioritura per aumentare il tenore proteico in abbinamento a eventuali trattamenti della difesa
Girasole	10 - 30	Dallo stadio di 4 - 5 foglie fino a pre-fioritura in abbinamento a eventuali trattamenti della difesa
Colza	10 - 30	Da allungamento stelo fino a pre-fioritura in abbinamento a eventuali trattamenti della difesa
Orticole	250 ml/hl	Durante il ciclo vegetativo

12,5 KG · 30 KG · 1000 L

GREENLAST® Marchio Registrato Euro TSA SRL

GREENSEA KELP



DESCRIZIONE

GREENSEA KELP è un prodotto di origine naturale a base di estratto di lievito contenente alghe brune del genere Eklonia maxima che lo rende ricco amminoacidi, fitormoni auxino-simili, carboidrati e vitamine. Tutte le sostanze si concentrano in GREENSEA KELP grazie al particolare processo di estrazione dell'alga. GREENSEA KELP assicura benefici alla coltura in quanto potenzia la risposta della pianta favorendo lo sviluppo radicale e fogliare e favorendo l'ingrossamento dei frutti delle colture orticole e frutticole.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Agitare prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da raggi solari e fonti di calore. Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari, tuttavia si consiglia di effettuare piccoli test preliminari per verificarne la compatibilità.

CONCIME ORGANICO AZOTATO
CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO
Estratto fluido di lievito contenente alghe brune
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONTENUTO

1%	Azoto (N) totale 1% di cui Azoto (N) organico 1%
10%	Carbonio (C) Organico 10%
30%	Sost. organica con peso molec. - SO PM<50kDa %
11	Auxine naturali (mg/L)
0,03	Citochinine naturali (mg/L)

CARATTERISTICHE

Aspetto	Densità a 20 °C	pH (20°C)
Liquido denso scuro	1 - 1,10 Kg/Lt	4 - 5

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE L/ha	EPOCA
Vite, Pomacee (Melo, Pero), drupacee (Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino, Noce, Mandorlo, Nocciolo, altra frutta a guscio, Olivo, Agrumi)	1 - 3	Durante tutto il ciclo colturale. In abbinamento ai trattamenti fitosanitari
Masi, Sorgo, Frumento, Orzo, altri cereali a paglia, Riso, Girasole, Soia, Barbabietola da zucchero, Colza	1 - 3	Durante tutto il ciclo colturale. In abbinamento ai trattamenti fitosanitari
Pomodoro, Melanzana, Peperone, Patata, Zucchino, Cetriolo, Cocomero, Melone, Zucca, Lattuga e altri ortaggi a foglia, Cipolla, Aglio, Scalogno, Carota e altre colture orticole	1 - 3	Durante tutto il ciclo colturale. In abbinamento ai trattamenti fitosanitari
Fragola e altri piccoli frutti	1 - 3	Durante tutto il ciclo colturale. In abbinamento ai trattamenti fitosanitari
Piante ornamentali	1 - 3	Durante tutto il ciclo colturale. In abbinamento ai trattamenti fitosanitari

APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE	DOSE L/ha	EPOCA
Vite, Pomacee (Melo, Pero), drupacee (Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino, Noce, Mandorlo, Nocciolo, altra frutta a guscio, Olivo, Agrumi)	5 - 10	Durante tutto il ciclo colturale.
Masi, Sorgo, Frumento, Orzo, altri cereali a paglia, Riso, Girasole, Soia, Barbabietola da zucchero, Colza	5 - 10	Durante tutto il ciclo colturale.
Pomodoro, Melanzana, Peperone, Patata, Zucchino, Cetriolo, Cocomero, Melone, Zucca, Lattuga e altri ortaggi a foglia, Cipolla, Aglio, Scalogno, Carota e altre colture orticole	5 - 10	Durante tutto il ciclo colturale.
Fragola e altri piccoli frutti	5 - 10	Durante tutto il ciclo colturale.
Piante ornamentali	5 - 10	Durante tutto il ciclo colturale.

1 L 5 L

QUICK-R



DESCRIZIONE

QUICK-R è un concime Organo – Minerale NP contenente una ricca e nobile matrice vegetale. Grazie al suo alto contenuto di Aminoacidi Vegetali Levogiri, induce un'immediata e rapida Radicazione e superamento dello stress da trapianto delle giovani piantine, anche in terreni Freddi, Calcarei, Alcalini, Sabbiosi, Asfittici o stanchi. Promuove la rapida formazione e sviluppo di nuove radici e di getti ascellari, conferendo alle giovani piante un rapido attecchimento, un veloce sviluppo ed un ottimale equilibrio Vegeto – Produttivo.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti fluidi sia minerali che organici (compreso il rame), tuttavia si consiglia di effettuare piccoli test preliminari per verificarne la compatibilità. Non miscelare con olii minerali. Conservare il prodotto in recipienti o serbatoi di plastica (es. polietilene o polipropilene) e in ambiente sufficientemente fresco ed ombreggiato. Evitare esposizioni prolungate ad alte temperature (30-35°C) al fine di evitare possibili processi fermentativi con possibili alterazioni delle caratteristiche del prodotto.

CONSIGLI DI UTILIZZO

Miscelare QUICK – R 5 L + FOSFONITRIC 6,5 L + NITROCAL 21 L
La dose si intende per ettaro. Amplifica l'azione radicante.

CONCIME ORGANO-MINERALE
Concime Organo-Minerale Np 3.7,5
Concime Organo-Minerale Np 3.7,5 Fluido In sospensione
Concime Organo-Minerale Np 3.7,5 In sospensione
N. Reg. 0035573/22

COMPOSIZIONE

3 %	Azoto(N) totale di cui 0,3% Azoto (N) organico 2,7% Azoto (N) ureico
5,2 %	Sostanza organica
3 %	Carbonio (C) organico
7,5 %	Anidride Fosforica (P_2O_5) solubile in acqua

CARATTERISTICHE

Aspetto	Densità a 20 °C	pH (20°C)
Marrone scuro	1,25 - 1,30 Kg/L circa	4 - 5

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE ml/HL	EPOCA
Pomodoro	100 - 200	Nelle prime fasi del ciclo
Colture orticole pieno campo	100 - 200	Nelle prime fasi del ciclo
Colture orticole in serra	100 - 200	Nelle prime fasi del ciclo
Pomacee, Drupacee, Agrumi, Olivo, Actinidia, Vite	150 - 300	Nelle prime fasi del ciclo
Ornamentali e Vivaio	50 - 100	Nelle prime fasi del ciclo

APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE	DOSE L/ha	EPOCA
Pomodoro	3 - 5	Due trattamenti: a 8 gg da trapianto e a 20 giorni da trapianto
Colture orticole pieno campo	3 - 5	Due trattamenti: a 8 gg da trapianto e a 20 giorni da trapianto
Colture orticole in serra	3 - 5	Due trattamenti: a 8 gg da trapianto e a 20 giorni da trapianto
Pomacee, Drupacee, Agrumi, Olivo, Actinidia, Vite	8 - 10	Nelle prime fasi del ciclo
Ornamentali e Vivaio	4 - 5	Due trattamenti: a 8 gg da trapianto e a 20 giorni da trapianto

12 KG

SOLCAL B



La soluzione alle carenze di calcio

DESCRIZIONE

SOLCAL B è un concime liquido ad alto titolo in calcio con aggiunta di boro che lo rende ideale sia per applicazioni fogliari che per applicazioni in fertirrigazione su fruttiferi, ortaggi e colture fuori suolo. SOLCAL B, grazie alla combinazione dell'elemento Calcio con il Boro, è ideale per previene l'insorgenza di fisiopatie causate dalla carenza dei due elementi e per migliorare la qualità dei frutti (consistenza, shelf life e qualità organolettiche). SOLCAL B ha un buon effetto positivo sulla conservabilità post-raccolta di frutti e di fiori recisi favorendo la resistenza ai marciumi.
Autorizzato l'uso in agricoltura biologica a norma dell'attuale normativa europea.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i diversi fertilizzanti. È consigliabile eseguire delle prove per testare la completa compatibilità. Evitare la miscelazione con soluzioni acide, con soluzioni saline concentrate e con soluzioni contenenti Fosforo. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione.

PFC 1(C)(I)(b)(i)
CONCIME INORGANICO LIQUIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI
Concime minerale (Ca), (+17,4)

CONTENUTO

17,4%	Ossido di calcio (CaO) idrosolubile
0,1%	Boro (B) idrosolubile

CARATTERISTICHE

Aspetto
Soluzione limpida

Colore
Da incolore a giallo paglierino

Densità a 20 °C
1,34 – 1,38 Kg/L

pH (20°C)
2 - 3

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE L/ha	EPOCA
Actinidia	5	3 Applicazioni a partire da 5 gg dopo la fase di caduta petali ogni 30-35 gg
Pomacee*, Drupacee, Olivo, Nocciolo, Noce, Mandorlo e altra frutta a guscio, Agrumi	7 - 10	2-4 Applicazioni a partire dopo la fase di caduta petali ogni 7-10 gg
Vite	7 - 10	2-4 Applicazioni ogni 7-14 gg a partire dall'allegagione
Colture orticole in pieno campo e in serra	7 - 10	2-4 applicazioni dalla fase di allegagione ogni 7-14 gg
Fragola e piccoli frutti	7 - 10	3 Applicazioni a partire dall'inizio della fioritura ogni 7-14 gg

* Autorizzato l'uso in agricoltura biologica a norma dell'attuale normativa europea Reg. 2018/848 solo per la coltura del melo per trattamento fogliare per prevenire una carenza di calcio.

APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE	DOSE L/ha	EPOCA
Actinidia Pomacee, Drupacee, Olivo, Nocciolo, Noce, Mandorlo e altra frutta a guscio, Agrumi, Vite	10-20	4 applicazioni dalla fase di caduta petali ogni 14 gg
Colture orticole in pieno campo e in serra	10-20	4 applicazioni dalla fase di allegagione ogni 7-14 gg
Fragola e piccoli frutti	10-20	4 Applicazioni a partire dall'inizio della fioritura ogni 7-14 gg

30 KG
1370 KG
1000 L

SUGARBUZZ



Attrattivo per insetti

Soluzione di Glucosio, Fruttosio e Saccarosio

DESCRIZIONE

SUGARBUZZ è una soluzione di vari zuccheri che attira i tripidi, afidi e altri insetti dai loro rifugi. Aggiungendo SUGARBUZZ a una soluzione insetticida da nebulizzare, gli insetti sono più esposti al prodotto, il che determina un maggiore controllo.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei prodotti di comune impiego. In caso di miscela estemporanea con altri formulati, effettuare comunque preventivamente un test di compatibilità. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CONTENUTO

100%	Sciroppo di glucosio, fruttosio e saccarosio

CARATTERISTICHE

Aspetto
Liquido sciropposo

Colore
Giallo pallido

Densità a 20 °C
1,40 – 1,45 kg/L

pH (20°C)
5.0 – 5.5

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE	EPOCA
Colture all'aperto	2-4 L/ha	In miscela con trattamenti insetticidi
Colture in serra	100-200 mL/hL	In miscela con trattamenti insetticidi

1L 4L



Piante super forti, con la Linea SUPERFLO

SUPERFLO CA 545

SPECIALI BIO



DESCRIZIONE

SUPERFLO CA 545 è un prodotto a base di Carbonato di Calcio in micro particelle (< 5 µm) in sospensione, a elevato titolo di Calcio, che vengono assorbite direttamente dalle foglie mediante gli stomi. Le particelle di
Carbonato così assorbito si dissociano liberando CO_2 e CaO. SUPERFLO CA 545 penetra negli stomi si ottiene un duplice effetto: apporto di Calcio per prevenire e curare le fisiopatie causate da carenze di calcio e incremento della concentrazione di CO_2 nella foglia per aumentare e ottimizzare il processo di fotosintesi. Nella pianta si notano: accelerazione della crescita e miglioramento della colorazione verde delle foglie; aumento della resistenza a gelate, siccità e malattie fitosanitarie, della crescita e della vitalità in condizioni di stress; miglioramento della disponibilità di Calcio per la pianta; riduzione della richiesta di acqua; miglioramento della produzione, della qualità e delle proprietà di conservazione dei frutti.

PFC 1(C)(I)(b)(i):

CONCIME INORGANICO LIQUIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI
Concime CaO 33 in sospensione

CONTENUTO

33%	Ossido di Calcio (CaO) totale

CARATTERISTICHE

Aspetto
Sospensione bianca

Punto di congelamento
< 0°C

Densità a 20 °C
1,62 – 1,67 Kg /L

pH (20°C)
8,5 – 9,5

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE L/ha	DOSE L/ha
Pomacee, Drupacee, Kiwi, Olivo, Noce, Nocciolo e altra frutta a guscio e altra frutta	3-5	3-5 applicazioni a intervalli di 15-20 giorni dalla formazione della 3° foglia
Vite	3-5	3 applicazioni (pre-fioritura, pre-chiusura grappolo e invaiatura)
Mais, Sorgo, Girasole	3-5	Alla 4-6° foglia
Barbabietola da zucchero	3-5	Alla 4-6° foglia e ripetere il trattamento 2 e 4 settimane più tardi
Soia, Colza	3-5	2 applicazioni: 4-6° foglia e prima della fioritura
Frumento, Orzo, Riso e altri cereali	3-5	Applicazioni dalla fase di levata fino alla spigatura
Pomodoro, Peperone e Melanzana	3-5	2-4 applicazioni a partire dalla prima fioritura
Patata	3-5	2 applicazioni: dopo la prima fogliazione e 15 gg dopo
Fragola e piccoli frutti	3-5	3 applicazioni: pre fioritura, ingrossamento frutti e dopo 15 gg
Colture orticole in pieno campo	3-5	2-4 applicazioni a partire dalla prima fioritura
Piante ornamentali	3-5	2-4 applicazioni a partire dalla 3° foglia

1 L 10 L

SUPERFLO MG 580

SPECIALI BIO



DESCRIZIONE

SUPERFLO MG 580 è un formulato a base di Magnesio in alta concentrazione con una particolare formulazione che permette un rapido assorbimento fogliare. L'applicazione di SUPERFLO MG 580 permette di prevenire e curare alcune gravi fisiopatie quali: ingiallimento (clorosi) delle foglie più vecchie (basali) e la loro caduta anticipata, ridotto sviluppo per scarsa fotosintesi clorofilliana, limitata colorazione degli ortaggi per la mancata formazione dai pigmenti coloranti, dissecamento del rachide della vite, filloptosi del melo. SUPERFLO MG 580 svolge un importante ruolo fisiologico nelle piante in quanto il suo effetto è di lunga durata e servono poche applicazioni per ottenere i benefici grazie all'altissima micronizzazione del sale di magnesio che lo rende più facilmente assorbibile e traslocabile nella pianta.

PFC 1(C)(I)(b)(i):

CONCIME INORGANICO LIQUIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI
Concime MgO 38 in sospensione

CONTENUTO

38%	Ossido di Magnesio (MgO) totale

CARATTERISTICHE

Aspetto
Sospensione beige chiaro

Punto di congelamento
< 0°C

Densità a 20 °C
1,50 – 1,55 Kg /L

pH (20°C)
10 - 11

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE L/ha	EPOCA
Pomacee (Melo, Pero, ecc)	1 – 2	3-5 applicazioni a intervalli di 15-20 giorni dalla formazione della 3° foglia
Drupacee (Albicocco, Ciliegio, Pesco, Susino, ecc)	1 – 2	3 applicazioni (pre-fioritura, pre-chiusura grappolo e invaiatura)
Kiwi, Noce, Nocciolo e altra frutta a guscio e altra frutta	1 – 2	Alla 4-6° foglia
Olivo	1,5 – 2	Alla 4-6° foglia e ripetere il trattamento 2 e 4 settimane più tardi
Vite	1,5 – 2	2 applicazioni: 4-6° foglia e prima della fioritura
Agrumi	1 – 2	Applicazioni dalla fase di levata fino alla spigatura
Mais, Sorgo, Girasole, Barbabietola da zucchero, Soia, Colza, Frumento, Orzo, Riso e altri cereali a paglia	1 – 2	2-4 applicazioni a partire dalla prima fioritura
Pomodoro, Peperone e Melanzana, Patata	1 – 2	2 applicazioni: dopo la prima fogliazione e 15 gg dopo
Lattuga e altri ortaggi a foglia	1 – 1,5	3 applicazioni: pre fioritura, ingrossamento frutti e dopo 15 gg
Fragola e piccoli frutti	1 – 1,2	2-4 applicazioni a partire dalla prima fioritura
Colture orticole in pieno campo	1 – 1,5	2-4 applicazioni a partire dalla 3° foglia
Piante ornamentali	70 – 100 mL/hL	2-4 applicazioni a partire dalla 3° foglia

SUPERFLO

1 L 10 L

SUPERFLO MN 400

SPECIALI BIO



DESCRIZIONE

SUPERFLO MN 400 è un formulato a base di Manganese in alta concentrazione con una particolare formulazione che permette un rapido assorbimento fogliare. L'applicazione di SUPERFLO MN 400 permette di prevenire e curare alcune gravi fisiopatie quali: ingiallimento delle foglie più giovani, colorazione anomala delle foglie, la crescita stentata della pianta con ridotta produzione di fiori e uno scarso sviluppo radicale. SUPERFLO MN 400 svolge un importante ruolo fisiologico nelle piante in quanto il suo effetto è di lunga durata e servono poche applicazioni per ottenere i benefici.

PFC 1(C)(II)(a):

CONCIME INORGANICO SEMPLICE A BASE DI MICROELEMENTI
Concime in soluzione a base di microelementi

CONTENUTO

25%	Manganese (Mn), nella forma di carbonato, idrosolubile

CARATTERISTICHE

Aspetto
Sospensione beige

Punto di congelamento
< 0°C

Densità a 20 °C
1,60 – 1,65 Kg /L

pH (20°C)
8,5 – 9,5

Cond. elettrica (0,1%)
2 µS/cm

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE L/ha	EPOCA
Actinidia	1	Durante lo sviluppo dei germogli e a partire da due settimane dopo la caduta dei petali. Evitare il periodo della fioritura
Agrumi	1	Durante la ripresa vegetativa e autunno
Vite	1	Applicare a grappoli visibili, a grappoli separati e all'allegagione
Pomacee (Melo, Pero)	1	Prima della fioritura. Ripetere dopo la caduta petali e ogni 10-14 giorni
Drupacee (Albicocco, Nettarine, Pesco, ciliegio, Susino)	1	Durante l'allegagione e ripetere se necessario ogni 10- 14 giorni
Nocciolo, Noce e altra frutta a guscio	1	Dopo la fecondazione e ripetere dopo 10-14 giorni se necessario
Olivo	1	Prima della fioritura e ripetere ogni 10-14 giorni
Cereali a paglia (Frumento, Orzo, ecc)	1	Da accestimento a inizio levata (1° nodo visibile)
Mais, Sorgo	1	Allo stadio di 4-8 foglie
Riso	1	Da accestimento a inizio spigatura
Girasole	1	Allo stadio di 4-6 foglie
Soia e altre leguminose	1	Allo stadio di 4-6 foglie, a inizio e fine fioritura e ripetere ogni 10-14 giorni
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucca, Zucchina, Carciofo e altre colture orticole	1	Allo stadio di 4-6 foglie e ripetere ogni 10-14 giorni
Patata	1	Da 4 a 6 paia di foglie vere e ripetere ogni 10-14 giorni

1 L 10 L

SUPERFLO

SUPERFLO ZN 700

SPECIALI BIO



Migliori processi fisiologici della coltura

DESCRIZIONE

SUPERFLO ZN 700 è un formulato a base di Zinco in alta concentrazione con una particolare formulazione che permette un rapido assorbimento fogliare. L'applicazione di SUPERFLO Zn 700 permette di prevenire e curare alcune gravi fisiopatie quali: foglie piccole con apici biancastri, sviluppo stentato (nanismo), accorciamento degli internodi e scarsa fruttificazione.
SUPERFLO ZN 700 svolge un importante ruolo fisiologico nelle piante in quanto favorisce la formazione e lo sviluppo dei semi, catalizza importanti processi metabolici, essenziale per la stabilità ed il mantenimento della struttura dei ribosomi nella sintesi proteica, promuove l'allungamento dello stelo e favorisce la trasformazione degli zuccheri

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti fluidi sia minerali che organici, tuttavia si consiglia di effettuare piccoli test preliminari per verificarne la compatibilità, in particolare quando si impiegano olii minerali e prodotti rameici (prodotti fitosanitari e concimi). Conservare il prodotto in recipienti o serbatoi di plastica (es. polietilene o polipropilene) e in ambiente sufficientemente fresco ed ombreggiato. Evitare esposizioni prolungate ad alte temperature (30-35 °C).

PFC 1(C)(II)(b)

CONCIME INORGANICO SEMPLICE A BASE DI MICROELEMENTI
Concime in soluzione a base di microelementi

COMPOSIZIONE

40 %	Zinco (Zn) idrosolubile

CARATTERISTICHE

Aspetto
Sospensione bianca

Densità a 20 °C
1,70 – 1,75 Kg/L

Conducibilità elettrica (0,1%)
7-10 uS/cm

Punto di congelamento
< 0°C

pH (20°C)
8,3 - 9,3

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE L/ha	EPOCA
Actinidia	1	Da apertura gemme fino alle prime foglie aperte. Ripetere dopo la raccolta (prima della senescenza)
Vite	1	Da grappoli visivi fino a fine fioritura
Pomacee	1	Prima della fioritura. Ripetere dopo la raccolta (prima della senescenza)
Drupacee	1	Da fioritura fino ad allegagione. Ripetere dopo la raccolta (prima della senescenza)
Nocciolo, Noce e altra frutta a guscio	1	Dopo la fecondazione e ripetere dopo 10-14 giorni se necessario
Cereali a paglia (Frumento, Orzo, ecc)	1	Da accestimento a inizio levata (1° nodo visibile)
Mais, Sorgo	1	Allo stadio di 4-8 foglie
Riso	1	Da accestimento a inizio spigatura
Girasole	1	Allo stadio di 4-6 foglie
Soia e altre leguminose	1	Dallo stadio di 5-15 cm della piantina
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucca, Zucchina, Carciofo	1	Allo stadio di 4-6 foglie
Altre Colture Orticole	1	Allo stadio di 4-6 foglie
Patata	1	Da 4 a 6 paia di foglie vere

Nelle applicazioni in serra non superare la dose di 50 mL/hL per via fogliare. Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi consigliate.

SUPERFLO

CE

1,7 KG 1 L

17 KG 10 L

SUPERFLO ZN MN 630

SPECIALI BIO



DESCRIZIONE

SUPERFLO ZN MN 630 è un formulato a base di Zinco e Manganese in alta concentrazione con una particolare formulazione che permette un rapido assorbimento fogliare. L'applicazione di SUPERFLO ZN MN 630 permette di prevenire e curare alcune gravi fisiopatie quali: ingiallimento delle foglie più giovani, colorazione anomala delle foglie, la crescita stentata della pianta con ridotta produzione di fiori e uno scarso sviluppo radicale. SUPERFLO ZN MN 630 svolge un importante ruolo fisiologico nelle piante in quanto il suo effetto è di lunga durata e influenza importanti processi biochimici, quali la formazione di aminoacidi come il triptofano, entra nella sintesidi enzimi responsabili del processo fotosintetico e della colorazione dei frutti.

PFC 1(C)(II)(a):

CONCIME INORGANICO COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI
Concime in sospensione a base di microelementi

CONTENUTO

15%	Manganese (Mn), nella forma di carbonato, idrosolubile
20%	Zinco (Zn), come ossido, totale

CARATTERISTICHE

Aspetto
Sospensione beige chiaro

Punto di congelamento
< 0°C

Densità a 20 °C
1,77 – 1,83 Kg /L

pH (20°C)
9 – 10

Cond. elettrica (0,1%)
1,87 µS/cm

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE L/ha	EPOCA
Actinidia	1,0-1,2	2-4 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni
Agrumi	0,8-1,5	1-3 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni
Vite	1,0-1,2	1-3 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni
Pomacee (Melo, Pero)	1,0-1,2	1-3 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni
Drupacee (Albicocco, Nettarine, Pesco, ciliegio, Susino)	0,8 -1,0	1-2 applicazioni da "frutto noce", ripetere ogni 8 giorni
Nocciolo, Noce e altra frutta a guscio	1,0-1,2	2-4 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni
Olivo	1,0-1,2	1-2 applicazioni da frutto allegato, ogni 10 giorni
Cereali a paglia (Frumento, Orzo, ecc)	0,8-1,5	1-2 applicazioni a partire dalle fasi iniziali di sviluppo
Mais, Sorgo, Riso, Girasole, Soia	0,8-1,5	1-2 applicazioni a partire dalle fasi iniziali di sviluppo
Pomodoro, Peperone, Melanzana	1,0-1,2	2-3 applicazioni da ingrossamento frutti del 1° palco, ogni 10-12 giorni
Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucca, Zucchina, Carciofo, Lattughe e altri ortaggi a foglia, Patata e altre colture orticole	0,8-1,2	1-3 applicazioni da piante sviluppate ogni 7-8 giorni
Fragola e piccoli frutti	0,8 -1,0	1-3 applicazioni da frutto formato, ogni 8-10 giorni
Floricole e ornamentali	70-100 mL/hL	1-2 applicazioni nelle fasi iniziali. Non applicare dopo la bocciolatura.
Arbusti e Vivaismo	70-100 mL/hL	1-3 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni

1 L 10 L

SUPERFLO

VIGOR GREEN



Aumenta la vigoria della tua coltura

DESCRIZIONE

VIGOR GREEN è un concime organo-minerale a base di sostanze di origine vegetale (Aminoacidi, Peptidi, Carboidrati, Zuccheri, Vitamine), Ormoni Vegetali (Auxine, Citochinine, Gibberelline). Contiene Betaina, un potente Osmolita che insieme ai derivati dell'acido Salicilico proteggono le piante dagli Stress dovuti a Siccità, Salinità, Alte Temperature e Patogeni vari. VIGOR GREEN stimola fortemente l'emissione di palchi fiorali ravvicinati, così come l'emissione di nuove branche e getti ascellari, favorendo lo sviluppo di piante con ottimale equilibrio vegeto – produttivo sia nelle colture Orticole che Frutticole, sia in Serra che in campo aperto. Determina una migliore Fioritura ed una maggiore Allegagione. Induce la formazione di tessuti vegetali più spessi e più resistenti agli attacchi dei patogeni; Riduce la traspirazione fogliare causata dalle alte temperature o deficit idrici; Aumenta la ritenzione idrica cellulare nelle foglie e nei frutti; Riduce l'effetto Cracking nei frutti; Migliora la Shelf-Life dei frutti nel Post – Raccolta e nella Frigoconservazione. VIGOR GREEN grazie ai suoi componenti facilita la ripresa vegetativa dopo stress si abiotici che abiotici. Migliora i caratteri qualitativi ed organolettici delle colture. VIGOR GREEN utilizzato nel trattamento delle sementi stimola i processi di germinazione e favorisce l'emergenza delle plantule.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Il prodotto può essere utilizzato con tutti i più comuni prodotti fitosanitari ed è miscibile con i principali fertilizzanti fogliari e per fertirrigazione della linea Euro TSA. Temperatura ottimale di impiego fra 10°C e 30°C. Si consiglia di agitare e miscelare prima dell'applicazione.

CONCIME ORGANO-MINERALE
Concime organo-minerale azotato
Concime organo-minerale azotato fluido in sospensione
N. Reg. 0022177/18

COMPOSIZIONE

16 %	Azoto(N) totale di cui 0,6% Azoto (N) organico 1,7% Azoto (N) nitrico 12,6% Azoto (N) ureico 1,7% Azoto (N) ammoniacale
3 %	Carbonio (C) organico
4,8 %	Sostanza organica

CARATTERISTICHE

Aspetto
Liquido marrone

Punto di congelamento
-5 °C

Densità a 20 °C
1,30 Kg/L circa

pH (20°C)
4 - 5

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE Kg/ha	EPOCA
Agrumi, Pomacee, Drupacee, Actinidia, Olivo, Vite da tavola e da vino	2 - 2,5	4 trattamenti da pre-fioritura a ingrossamento frutto
Colture orticole pieno campo	2 - 2,5	4 trattamenti da pre-fioritura a ingrossamento frutto
Colture orticole in serra	2 - 2,5	4 trattamenti da pre-fioritura a ingrossamento frutto
Colture estensive	2 - 2,5	Trattamento in abbinamento a prodotti fitosanitari
Floricole	6- 7	Applicare 10 gg dopo il trapianto, emissione boccioli fiorali, allungamento stili fiorali

APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE	DOSE	EPOCA
Colture con impianti di fertirrigazione	200 - 350 g/1000 m2	Durante tutto il ciclo

TRATTAMENTO AI SEMI	DOSE	EPOCA
Seme	200 - 350 g/1000 Kg seme	-

1 KG 5 KG

BIOFERTILIZZANTI

Formulati altamente compatibili con il metabolismo vegetale.

BIOFERT N5



DESCRIZIONE

BIOFERT N5 è un concime organico innovativo contenente Azoto completamente di origine vegetale derivante da matrice vegetale nobile per apportare sostanza organica di pregio. BIOFERT N5 presenta, un azoto organico a cessione graduale in quanto legato ai processi biochimici della matrice vegetale nel terreno. BIOFERT N5 riduce al minimo le perdite in profondità per percolazione e di superficie per dilavamento.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti fluidi, sia minerali che organici, tuttavia si consiglia di effettuare piccoli test preliminari per verificarne la compatibilità. Non miscelare con oli minerali. Conservare il prodotto in ambiente fresco, evitando esposizioni prolungate ad alte temperature (25° - 35°).

CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO
Miscela di concimi organici azotati fluidi
Consentito In Agricoltura Biologica
N. Reg. 0035581/22

COMPOSIZIONE

5 %	Azoto (N) totale di cui 5% Azoto (N) organico
>10 %	Carbonio (C) organico
>20 %	Sostanza organica

CARATTERISTICHE

Aspetto
Liquido bruno

Punto di congelamento
-5°C

Densità a 20 °C
1,18 - 1,22 Kg/L circa

pH (20°C)
4,5 - 5,0

Materia prima: miscela di vari concimi azotati fluidi

APPLICAZIONE IN PIENO CAMPO RESO RADICE	DOSE Kg/ha	EPOCA
Cereali (frumento, orzo e altri cereali a paglia, mais, riso)	1200 - 2000	Presemina
Cereali (frumento, orzo e altri cereali a paglia, mais, riso)	500 - 1200	Fase di levata*
Girasole, Colza, Soia	1200 - 2000	Presemina
Drupacee, Pomacee, Olivo, Agrumi, Vite, Actinidia	300 - 500	Ripresa vegetativa

* per agricoltura convenzionale completare la concimazione con Fertilcereal 21 o N30

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE L/ha	EPOCA
Colture orticole e floricole in pieno campo	3- 5	2-3 interventi da prefioritura ad accrescimento frutti
Colture orticole e floricole in serra	3- 5	2-3 interventi da prefioritura ad accrescimento frutti
Colture orticole a foglia	3- 5	2-3 interventi nelle fasi iniziali del ciclo colturale
Agrumi, Actinidia, Pomacee, Drupacee, Vite e Olivo	3- 5	4 interventi da prefioritura a post-allegagione
Cereali a paglia, Riso, Mais	3- 5	1 - 2 interventi dalla levata alla spigatura

APPLICAZIONE IN IN FERTIRRIGAZIONE	DOSE Kg/ha	EPOCA
Pomacee, Drupacee, Agrumi, Olivo, Vite, Actinidia	300 - 500	Da pre-fioritura a pre-raccolta
Colture orticole pieno campo	300 - 500	Da pre-fioritura a pre-raccolta
Colture orticole serra	10-30 kg/1000 m2	Da pre-fioritura a pre-raccolta
Piante ornamentali	10-30 kg/1000 m2	Da pre-fioritura a pre-raccolta

30 KG 1000 L 30 T

BIOFERT S



DESCRIZIONE

BIOFERT S è un concime organico fluido azoto-potassico, completamente di origine vegetale, caratterizzato da un'elevata concentrazione di aminoacidi liberi e polipeptidi con presenza di betaina e polisaccaridi. BIOFERT S è sottoposto a un trattamento speciale di filtrazione e si presta ad un utilizzo in fertirrigazione. BIOFERT S permette di apportare significative quote di azoto organico, potassio e sostanza organica. È inoltre un forte promotore dell'attività microbica del suolo.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti fluidi, sia minerali che organici, tuttavia si consiglia di effettuare piccoli test preliminari per verificarne la compatibilità. Non miscelare con oli minerali. Conservare il prodotto in ambiente fresco, evitando esposizioni prolungate ad alte temperature (25° - 35°).

CARATTERISTICHE

Aspetto
Liquido bruno

Punto di congelamento
-5°C

pH (20°C)
6.5 – 8.0

Densità a 20 °C
1,25 Kg/L circa

Conducibilità elettrica (0,1%)
1,3 mS/cm

CONCIME ORGANICO
CONCIME ORGANICO AZOTATO
CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO
BORLANDA FLUIDA
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
N. Reg. 0004696/15
UFI: HC00-Y0CQ-700M-9R2H

COMPOSIZIONE

3 %	Azoto (N) totale di cui 3% Azoto (N) organico
6 %	Ossido di Potassio (K_2O) solubile in acqua
1,8 %	Anidride Solforica (SO_3) solubile in acqua
14 %	Carbonio (C) organico
≥24 %	Sostanza Organica

APPLICAZIONE IN PIENO CAMPO RESO RADICE	DOSE Kg/ha	EPOCA
Pomacee, Drupacee, Agrumi, Olivo, Vite, Actinidia	1200 - 2000	Pre-trapianto o ripresa vegetativa sottochioma
Mais, Riso, Cereali a paglia, Pomodoro, Soia, Colza, Barbabietole, Prati	1200 - 2000	Da pre-aratura a pre-semina o pre-trapianto

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE L/ha	EPOCA
Pomacee, Drupacee, Agrumi, Olivo, Vite, Actinidia	3- 5	Da pre-fioritura a raccolta
Colture orticole a pieno campo	3- 5	Da pre-fioritura a raccolta
Colture orticole serra	3- 5	Da pre-fioritura a raccolta
Mais, Riso, Cereali a paglia, Soia, Girasole, Colza	3- 5	Durante la fase di levata in miscela con trattamenti fitosanitari
Piante ornamentali	3- 5	Da pre-fioritura a raccolta

APPLICAZIONE IN IN FERTIRRIGAZIONE	DOSE Kg/ha	EPOCA
Pomacee, Drupacee, Agrumi, Olivo, Vite, Actinidia	200 - 300	Da pre-fioritura a pre-raccolta
Colture orticole pieno campo	200 - 500	Da pre-fioritura a pre-raccolta
Colture orticole serra	10-30 kg/1000 m2	Da pre-fioritura a pre-raccolta
Piante ornamentali	10-30 kg/1000 m2	Da pre-fioritura a pre-raccolta

30 KG 1000 L 30 T

NF MICRO CAM

BIOFERTILIZZANTI BIO



DESCRIZIONE

NF MICRO CAM è un concime organico costituito da una matrice vegetale nobile ricca di Aminoacidi (levogiri) con aggiunta di Calcio e Magnesio. NF MICRO CAM svolge un'azione molto importante sulle colture in quanto favorisce un'elevata penetrazione del Calcio e Magnesio che sono complessati dagli Aminoacidi vegetali, i quali si comportano come le chele di un granchio. Questa particolare formulazione permette a NF MICRO CAM di essere efficace in tutte le fasi andando a migliorare il metabolismo della coltura grazie alla elevata presenza di Aminoacidi vegetali e di favorire una migliore traslocazione all'interno della pianta di Calcio e Magnesio permettendo di prevenire le fisiopatie da carenze e migliorando l'attività fotosintetica. NF MICRO CAM favorisce l'aumento della resistenza della coltura a svariati stress come quelli idrici, ossidativi, da freddo, da caldo, da eccessi di salinità, ecc.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti fluidi, sia minerali che organici, tuttavia si consiglia di effettuare piccoli test preliminari per verificarne la compatibilità. Non miscelare con oli minerali. Conservare il prodotto in ambiente fresco, evitando esposizioni prolungate ad alte temperature (25° - 35°).

CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO
Borlanda vitivinicola fluida con aggiunta di calcio e magnesio
Consentito in agricoltura biologica
N. Reg. 0035569/22

COMPOSIZIONE

2 %	Azoto (N) totale
2 %	Azoto (N) organico
1,5 %	Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua
7 %	Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua
10 %	Carbonio (C) organico

CARATTERISTICHE

Aspetto
Marrone scuro

pH (20°C)
3,5 - 4,5

Densità a 20 °C
1,30 - 1,35 Kg/L circa

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE Kg/ha	EPOCA
Mais, Sorgo	3- 6	2 applicazioni a 4-6 foglie e alla fioritura
Frumento, Orzo, Riso e altri Cereali a paglia	3- 6	2 applicazioni in fase di levata e spigatura
Barbabietola da zucchero	3- 6	3 applicazioni durante la fase di sviluppo fogliare
Colza, Girasole, Soia	3- 6	2 applicazioni in fase di levata e alla fioritura
Pomodoro	3- 6	3-4 applicazioni da pre-fioritura a prima della raccolta
Colture orticole pieno campo	3- 6	3-4 applicazioni da pre-fioritura a prima della raccolta
Colture orticole in serra	3- 6	3-4 applicazioni da pre-fioritura a prima della raccolta
Pomacee, Drupacee, Agrumi, Olivo, Actinidia, Vite	3- 6	3-4 applicazioni da pre-fioritura a prima della raccolta
Tabacco	3- 6	3-4 applicazioni durante lo sviluppo fogliare
Ornamentali	3- 6	3-4 applicazioni durante il ciclo vegetale

Questo prodotto è disciplinato dal Regolamento (UE) 2019/1148: tutte le transizioni sospette e le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati al punto di contatto nazionale competente.

6 KG

NF MICRO MIX



DESCRIZIONE

NF MICRO MIX è una miscela di diversi microelementi quali Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo), Zinco (Zn) con aggiunta di Zolfo che vengono complessati da una particolare matrice. La presenza della matrice nobile all'interno di NF MICRO MIX permette ai microelementi contenuti di essere altamente disponibili per la coltura. Questa matrice si lega ai singoli ioni dei microelementi generando un complesso analogo alle chele di un granchio, in questo modo viene favorita la penetrazione sia fogliare che radicale permettendo ai singoli elementi di svolgere al meglio le loro azioni a livello metabolico ed enzimatico. NF MICRO MIX è indicato per tutto il ciclo colturale svolgendo la sua massima funzione nei momenti di stress in quanto i microelementi, altamente disponibili, permettono di tenere attiva la coltura. NF MICRO MIX è appositamente studiato per prevenire e curare clorosi e carenze multiple, tramite applicazioni fogliari su tutte le colture. Le carenze multiple, causate dalla scarsa presenza di due o più elementi, sono difficilmente diagnosticabili e provocano gravi danni alla fisiologia della pianta e nei casi più gravi ne possono compromettere la produzione e la vitalità.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti fluidi, sia minerali che organici, tuttavia si consiglia di effettuare piccoli test preliminari per verificarne la compatibilità. Non miscelare con oli minerali. Conservare il prodotto in ambiente fresco, evitando esposizioni prolungate ad alte temperature (25° - 35°).

PFC 1(B)(II)
CONCIME ORGANO MINERALE LIQUIDO

COMPOSIZIONE

2,6 %	Azoto (N) totale
2,6 %	Azoto organico (N_{org}), proveniente dall'industria alimentare
3,3 %	Anidride fosforica (P_2O_5) totale
2,6 %	Ossido di potassio (K_2O) totale
0,5 %	Anidride solforica (SO_3) idrosolubile
0,5 %	Boro (B) totale
0,5 %	Rame (Cu) totale
0,5 %	Ferro (Fe) totale chelato con EDTA
0,5 %	Manganese (Mn) totale 0,3% Manganese (Mn) idrosolubile 0,2% Manganese (Mn) chelato con EDTA
0,5 %	Molibdeno (Mo) totale
0,5 %	Zinco (Zn) totale chelato con EDTA
8 %	Carbonio organico (C_{org})
50 %	Materia secca

CARATTERISTICHE

Aspetto
Sospensione di colore verde scuro

Punto di congelamento
< 0°C

Densità a 20 °C
1,20-1,25 Kg/L circa

pH (20°C)
4 - 5

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE Kg/ha	EPOCA
Mais, Sorgo	3- 6	2 applicazioni a 4-6 foglie e alla fioritura
Frumento, Orzo, Riso e altri Cereali a paglia	3- 6	2 applicazioni in fase di levata e spigatura
Barbabietola da zucchero	3- 6	3 applicazioni durante la fase di sviluppo fogliare
Colza, Girasole, Soia	3- 6	2 applicazioni in fase di levata e alla fioritura
Pomodoro	3- 6	3-4 applicazioni da pre-fioritura a prima della raccolta
Colture orticole pieno campo	3- 6	3-4 applicazioni da pre-fioritura a prima della raccolta
Colture orticole in serra	3- 6	3-4 applicazioni da pre-fioritura a prima della raccolta
Pomacee, Drupacee, Agrumi, Olivo, Actinidia, Vite	3- 6	3-4 applicazioni da pre-fioritura a prima della raccolta
Tabacco	3- 6	3-4 applicazioni durante lo sviluppo fogliare
Ornamentali	3- 6	3-4 applicazioni durante il ciclo vegetale

6 KG

CE

NATURAL FORCE®

BIOFERTILIZZANTI BIO



Energia da amminoacidi vegetali

DESCRIZIONE

NATURAL FORCE® Concentrato proteico fluido completamente di origine vegetale ad alto contenuto di **amminoacidi levogiri (31%)**, peptoni a basso p.m., vitamine, macro e microelementi. Consente alla pianta un risparmio energetico su tutti i processi di sintesi proteica, enzimatica e zuccherina. È indicato per il superamento di tutte le condizioni di stress della coltura.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti fluidi, sia minerali che organici, tuttavia si consiglia di effettuare piccoli test preliminari per verificarne la compatibilità. Non miscelare con oli minerali. Conservare il prodotto in ambiente fresco, evitando esposizioni prolungate ad alte temperature (25° - 35°).

CONCIME ORGANICO
CONCIME ORGANICO AZOTATO
CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO NPK 3,2-3,9-3,2
BORLANDA AGROALIMENTARE FLUIDA DI FRUTTA E CEREALI
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
N. Reg. 0012866/15

COMPOSIZIONE

3,2 %	Azoto (N) totale di cui 3,2% Azoto (N) organico
3,9 %	Anidride Fosforica (P_2O_5) solubile in acqua
3,2 %	Ossido di Potassio (K_2O) solubile in acqua
>10 %	Carbonio (C) organico

CARATTERISTICHE

Aspetto
Liquido denso bruno scuro

Conducibilità elettrica (0,1%)
16,4 mS/m

Densità a 20 °C
1,20 - 1,25 Kg/L circa

pH (20°C)
3,5 - 4,5

LE PROTEINE E GLI AMMINOACIDI VEGETALI DI NATURAL FORCE

Proteine	*20%*	Arginina	*2,27%*	Alanina	*3,81%*	Cisteina	*<0,1%*	Metionina	*0,60%*
Amminoacidi liberi	*31%**	Glicina	*2,21%*	Lisina	*<0,1%*	Prolina	*3,44%*	Leucina+Isoleucina	*1,78%*
Glutamina	*<0,1%*	Asparagina	*<0,1%*	Ac. Aspartico	*2,10%*	Treonina	*1,42%*	Tirosina	*1,10%*
Istidina	*1%*	Serina	*1,80%*	Ac. Glutammico	*5,73%*	Valina	*1,70%*	Fenilalanina	*1%*

**degli amminoacidi totali*

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE L/ha	EPOCA
Colture orticole e floricole in pieno campo	3- 5	2-3 interventi da prefioritura ad accrescimento frutti
Colture orticole e floricole in serra	3- 5	2-3 interventi da prefioritura ad accrescimento frutti
Colture orticole a foglia	3- 5	2-3 interventi nelle fasi iniziali del ciclo colturale
Agrumi, Actinidia, Pomacee, Drupacee, Vite e Olivo	3- 5	4 interventi da prefioritura a post-allegagione
Cereali a paglia, Riso, Mais	3- 5	1 - 2 interventi dalla levata alla spigatura

I valori citati si riferiscono a irrorazioni effettuate con attrezzature a volume normale.

APPLICAZIONE IN IN FERTIRRIGAZIONE	DOSE L/ha	EPOCA
Pomacee, Drupacee, Agrumi, Olivo, Vite, Actinidia	30 - 60	Da pre-fioritura a pre-raccolta
Colture orticole pieno campo	40 - 80	Da pre-fioritura a pre-raccolta
Colture orticole serra	30 - 50	Da pre-fioritura a pre-raccolta
Piante ornamentali	50 - 70	Da pre-fioritura a pre-raccolta

QUALITALY MEZZI TECNICI (INPUT) · QUALITALY VEGAN · STABILITÀ GARANTITA 3 ANNI · RISPETTA LE API QUALITÀ SOSTENIBILE

1 L · 6 KG · 30 KG · 1000 L

In un contesto climatico sempre più imprevedibile, **NATURAL FORCE®** sostiene il metabolismo della pianta nei momenti di stress ambientale, favorendo un risparmio energetico su tutti i processi di sintesi proteica, enzimatica e zuccherina e una più rapida ripresa vegetativa.



FERTILIZZANTI

POTASSICI

Linea appositamente sviluppata per promuovere l'accumulo zuccherino nel frutto.

POTASSIO TIOSOLFATO



Concime minerale semplice potassico fluido
Soluzione di tiosolfato di potassio
N. Reg. 0004702/15

DESCRIZIONE

POTASSIO TIOSOLFATO è un concime in soluzione con un elevato titolo in potassio (25% K_2O) e zolfo (42% SO_3) che, grazie all'originale processo di sintesi, accomuna alla funzione fertilizzante del potassio una serie di proprietà non riscontrabili in altri concimi potassici:

- grazie all'azione dell'anione tiosolfato, un moderato inibitore dei processi di nitrificazione e dell'ureasi, consente di ridurre sensibilmente le perdite di azoto per volatilizzazione e lisciviazione;
- aumenta il grado di assimilabilità dei fosfati in virtù dell'azione riducente e acidificante svolta negli strati di terreno esplorati dalle radici;
- apporta considerevoli quote di zolfo elementare (azione fertilizzante e correttiva);
- protegge microelementi come ferro e manganese da fenomeni di insolubilizzazione, riducendo manifestazioni di clorosi e microcarenze.

La particolare formulazione del POTASSIO TIOSOLFATO di EURO TSA, per la sua totale assenza di cloro, è particolarmente idonea per l'impiego in fertirrigazione sulle colture orticole e per applicazioni fogliari sulle colture da frutto e sulla vite.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Miscibile con la maggior parte dei prodotti liquidi da verificare di volta in volta. Evitare soluzioni acide a pH inferiore a 4,8. In caso di attrezzature con parti in stagno, rame e relative leghe, si consiglia di lavare accuratamente le attrezzature dopo l'uso. Effettuare le applicazioni nelle ore più fresche della giornata.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

La definizione della dose da apportare alla coltura interessata dovrà essere stabilità prendendo in considerazione le fertilità del suolo e lo stato fisiologico della coltura.

COMPOSIZIONE

25 %	Ossido di Potassio (K_2O) solubile in acqua
42 %	Anidride Solforica (SO_3) solubile in acqua
39,5%	Anidride solforica (SO_3) da tiosolfato solubile in acqua

CARATTERISTICHE

Aspetto
Liquido da incolore a leggermente giallo

Densità a 20 °C
1,45–1,50 Kg/L circa

Conducibilità elettrica (0,1%)
1,14 mS/cm

Punto di congelamento
-10°C

pH (20°C)
7.5 – 8.5

30 KG 1000 L 30 T

RED K



DESCRIZIONE

RED-K è un concime liquido in soluzione con un elevato titolo di Potassio da formiato. RED-K, grazie alla sua particolare formulazione, possiede una funzione determinante che si manifesta in una migliore fruttificazione e conferisce una migliore qualità a ogni tipo di coltura. Il Potassio è l'elemento ordinatore delle funzioni vegetative della pianta ed è di vitale importanza nella fotosintesi clorofilliana, nella sintesi degli zuccheri e degli amidi. Le piante trattate con RED-K risultano più robuste e resistenti alle avversità climatiche e alla scarsa disponibilità idrica; viene inoltre intensificata la colorazione dei fiori e vengono migliorati il sapore, il colore e la conservabilità dei frutti.

PFC 1(C)(I)(b)(i)

CONCIME INORGANICO LIQUIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI
Concime K 42 in soluzione

COMPOSIZIONE

42 % Ossido di Potassio (K_2O) solubile in acqua

CARATTERISTICHE

Aspetto	Densità a 20 °C	pH (20°C)
Liquido chiaro paglierino	1,57-1,58 Kg/L	9 - 10

APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE Kg/ha	EPOCA
Agrumi, Pomacee, Drupacee, Actinidia, Olivo, Vite da tavola e da vino	3- 4	4 trattamenti da ingrossamento frutto a raccolta
Colture orticole pieno campo	3- 4	4 trattamenti da ingrossamento frutto a raccolta
Colture orticole in serra	3- 4	4 trattamenti da ingrossamento frutto a raccolta
Colture estensive	3- 4	Trattamento in abbinamento a prodotti fitosanitari
Floricole	3- 4	Applicare 10 gg dopo il trapianto, emissione boccioli fiorali, allungamento stili fiorali

APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE	DOSE Kg/ha	EPOCA
Colture con impianti di fertirrigazione	40 - 60	Durante tutto il ciclo

NOME PRODOTTO	SOLUBILITA' g/100 ml (20°C)
POTASSIO FORMIATO	337
Potassio Citrato	260
Potassio Acetato	256
Potassio Tiosolfato	155
Potassio Carbonato	111
Potassio Diidrogeno fosfato	92.3
Potassio Cloruro	34
Potassio Nitrato	32
Solfato di Potassio e Magnesio (Langberneite)	24
Potassio Solfato	11

CE

6 KG 30 KG 1000 L 30 T



Potassio ad alta efficienza per sostenere la fisiologia della pianta nelle fasi chiave dello sviluppo e valorizzare ogni aspetto qualitativo della produzione, dalla formazione del frutto alla raccolta.

ANNO 2026

LINEE TECNICHE

Ogni fase fenologica è accompagnata dalla “Scala Fenologica BBCH” con la relativa descrizione dello sviluppo fenologico della coltura.

Cos’è la Scala Fenologica BBCH?

La Scala Fenologica BBCH è un sistema numerico ideato per codificare uniformemente tutti gli stadi fenologici delle colture. Ogni stadio di sviluppo viene indicato tramite un numero e/o range di numeri che descrivono per la coltura e/o famiglia botanica presa in considerazione, il rispettivo stadio di sviluppo.

Nella parte superiore delle linee tecniche, sono stati riportati i prodotti consentiti in agricoltura biologica mediante un riquadro verde. Nella parte inferiore sono stati riportati i prodotti consentiti in agricoltura integrata mediante riquadro rosso.

NB. I prodotti consentiti in agricoltura biologica possono essere utilizzati anche in agricoltura integrata.


APPLICAZIONE FOGLIARE


APPLICAZIONE AL SUOLO


APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE


UGELLO A 7 FORI


TRATTAMENTO SEMENTI

FRUMENTO

CEREALI



		12-20	21-29	30-36	37-39	41-49	51-59	61-69	71-89	97-99
Presemina	Semina	Più foglie distese	Accestimento	Levata	Foglia bandiera	Botticella	Spigatura	Fioritura	Maturazione	Pianta morta Prodotto raccolto
1200-2200 Kg/ha BIOFERT S	35-50 Kg/ha MICROSEED BIO		20 L/ha NATURAL FORCE + FIXALIA EVO 5 Kg/ha				1 Kg/ha BLACK HUMONAS + 1 L/ha NATURAL FORCE + 1,5 Kg/ha di NUTRIVIT 50 BLU/VERDE			
	30 Kg/ha MICROSEED		Ugelli a 7 fori: 400 Kg/ha FERTILCEREAL 21 DCD				30 Kg/ha GREENLAST VEG			
	50-60 Kg/ha GRANOFOS Zn SUPER		3-5 L/ha NF MICRO MIX + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700 + 5 Kg/ha FIXALIA EVO							
1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE			1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + ERBICIDI DI POST EMERGENZA							

RISO


CEREALI



		11-19	21-29	30-39	41-49	51-59	61-69	71-89
Presemina	Semina	Più foglie distese	Accestimento	Formazione panicolo e levata	Botticella	Spigatura	Fioritura	Maturazione Raccolta
1200-2200 Kg/ha BIOFERT S	35-50 Kg/ha MICROSEED BIO	3 L/ha NATURAL FORCE + 3Kg/ha BLACK HUMONAS + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700 + FIXALIA EVO 5 Kg/ha			+ 1,5 Kg/ha di NUTRIVIT 50 BLU/VERDE + 20 L/ha NATURAL FORCE			
	30 Kg/ha AZOFOS SP. 24.10 DCD		300 L/ha FERTIRIS 21 DCD (ugelli a induzione)					
	30 Kg/ha MICROSEED AIR 02		25-30 Kg/ha GREENLAST VEG					
1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE			3-5 L/ha NF MICRO MIX + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700 + 5 Kg/ha FIXALIA EVO					
		1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + ERBICIDI DI POST EMERGENZA						

MAIS


CEREALI



		13-19	30-39	51-57	61-67	69	71-89	97-99
Presemina	Semina	Da 3 foglie distese o più foglie distese	Allungamento culmo	Spigatura emergenza pennacchio	Fioritura	Fine fioritura	Maturazione	Pianta morta Prodotto raccolto
1200-2200 Kg/ha BIOFERT S	35-45 Kg/ha MICROSEED BIO	5 L/ha NATURAL FORCE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700	20 L/ha NATURAL FORCE + 5Kg/ha FIXALIA EVO	3 Kg/ha BLACK HUMONAS + 3 L/ha NATURAL FORCE + 1,5 Kg/ha di NUTRIVIT 50 BLU/VERDE				
		30 Kg/ha GREENLAST VEG						
	30 Kg/ha MICROSEED	Calate: 600 Kg/ha FERTILCEREAL 21 DCD oppure 400 Kg/ha N30 DCD						
	50-60 Kg/ha GRANOFOS Zn SUPER	3 - 5 L/ha NF MICRO MIX + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700 + 5Kg/ha FIXALIA EVO						
		600 Kg/ha FERTILCEREAL 21 DCD oppure 400 Kg/ha N30 DCD + 40 L/ha NATURAL FORCE						
1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE	12-15 Kg/ha MICROSED GEO	1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + ERBICIDI DI POST EMERGENZA						

GIRASOLE

INDUSTRIALI



		10-19	30-39	51-59	61-69	71-79	80-89	92-99
Presemina	Semina	Sviluppo fogliare: da 2 a 9 o più foglie distese	Allungamento stelo	Emissione dell'infiorescenza	Da inizio fioritura a fine fioritura	Sviluppo frutto: i semi raggiungono le dimensioni finali	Maturazione	Maturazione Raccolta
1200-2200 Kg/ha BIOFERT S	30-50 Kg/ha MICROSEED BIO	3-5 L/ha NATURAL FORCE + 3 L/ha BORON CARE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700 + 5 Kg/ha FIXALIA EVO						
		Calate: 500 Kg/ha FERTILCEREAL 21 DCD						
	30 Kg/ha MICROSEED	3-5 L/ha NF MICRO MIX + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700 + 5 Kg/ha FIXALIA EVO						
1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE	12-15 Kg/ha MICROSEED GEO	1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + ERBICIDI DI POST EMERGENZA						

COLZA


INDUSTRIALI



		12-19	20-29	30-39	50-59	60-69	71-79	80-89	99
Presemina	Semina	Sviluppo fogliare fino a 9 o più foglie distese	Formazione germogli laterali	Allungamento stelo	Fuoriuscita dell'infiorescenza: "Bottone Giallo"	Da inizio fioritura a fine fioritura	Sviluppo silique	Da inizio a piena maturazione	Raccolta
1200-2200 Kg/ha BIOFERT S	30-50 Kg/ha MICROSEED BIO	3-5 L/ha NATURAL FORCE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700			3 L/ha NATURAL FORCE + 1 L/ha BORON CARE		3 L/ha NATURAL FORCE + 3 L/ha BLACK HUMONAS		
	30 Kg/ha MICROSEED BIO	Ugelli a 7 fori: 200 Kg/ha FERTILCEREAL 21 DCD		Ugelli a 7 fori: 200 Kg/ha FERTILCEREAL 21 DCD	3-5 L/ha NATURAL FORCE + INSETTICIDA 3-5 L/ha NF MICRO MIX + INSETTICIDA				
1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE		1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + ERBICIDI DI POST EMERGENZA		4-5 L/ha ORTIFENS BIO					

SOIA

INDUSTRIALI



		10	10-11	12-19	51-59	61-69	70-79	80-89	91-99
Presemina	Semina	Cotiledoni aperti	Sviluppo fogliare	Sviluppo foglie trifogliate	Petali visibili ma bocciolo ancora chiuso	Da inizio a fine fioritura	Sviluppo bacelli	Da inizio a piena maturazione	Foglie scolorite Raccolta semi
1200-2200 Kg/ha BIOFERT S	30-50 Kg/ha MICROSEED BIO	3-5 L/ha NATURAL FORCE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700 + 5 Kg/ha FIXALIA EVO			3-5 L/ha NATURAL FORCE +3 L/ha BORON CARE	3-5 L/ha NATURAL FORCE			
	20-35 Kg/ha MICROSEED	15 L/ha GREENLAST VEG + 5 L/ha NATURAL FORCE + 5 Kg/ha FIXALIA EVO			1,5 Kg/ha di NUTRIVIT 50 BLU/VERDE + 5 L/ha NATURAL FORCE + INSETTICIDA				
	12-15 Kg/ha MICROSED GEO				3-5 L/ha NF MICRO CAM + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700				
1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE	300 Kg/ha FERTILCEREAL 21 DCD PRE EMERGENZA COLTURA		1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + ERBICIDI DI POST EMERGENZA						

BIETOLA

INDUSTRIALI



		10	12	14		
Presemina	Semina	Cotiledoni distesi	Due foglie distese	Da quattro foglie distese a più foglie distese	Sviluppo fittone	Raccolta
1200-2200 Kg/ha BIOFERT S	30-40 Kg/ha MICROSEED BIO	3-5 L/ha NATURAL FORCE	3 L/ha NATURAL FORCE + 1,5 Kg/ha di NUTRIVIT 50 BLU/VERDE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700	5 L/ha NATURAL FORCE + 1,5 Kg/ha di NUTRIVIT 50 BLU/VERDE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		
	50-60 Kg/ha GRANFOS Zn SUPER					
	400 kg/ha FERTILCEREAL 21 DCD		5 L/ha NATURAL FORCE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700			
		2,5 Kg/ha VIGOR GREEN + 1,5 Kg/ha di NUTRIVIT 50 BLU/VERDE				
			1,5 Kg/ha di NUTRIVIT 50 BLU/VERDE			
	30 Kg/ha MICROSEED		3-5 L/ha NF MICRO MIX + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700			
	12-15 Kg/ha MICROSED GEO					
1,5 L/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE			1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + ERBICIDI POST EMERGENZA			

POMODORO

ORTICOLE



		13-29	51-59	61-69	71-79	81-89
Pre trapianto	Trapianto	Sviluppo fogliare e formazione germogli laterali	Emissione delle infiorescenze	Fioritura: dalla prima infiorescenza aperta fino a 9 o più infiorescenze aperte	Sviluppo del frutto: dal primo grappolo di bacche fino a 9 o più grappoli	Inizio maturazione fino a piena maturazione
1200-2200 Kg/ha BIOFERT S	35-50 Kg/ha MICROSEED BIO	3 L/ha NATURAL FORCE + 1 L/ha BORON CARE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700			5 Kg/ha SUPERFLO CA 545	3 L/ha NATURAL FORCE + 1,5 Kg/ha di NUTRIVIT 50 BLU/VERDE + 3 L/ha BLACK HUMONAS
		10 L/ha NATURAL FORCE + 10 Kg/ha BLACK HUMONAS			10 L/ha NATURAL FORCE	
	30 Kg/ha MICROSEED	3-5 L/ha NATURAL FORCE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		3 L/ha NITROCAL + 3-5 L/ha NF MICRO MIX	5 L/ha di NATURAL FORCE + 3-5 L/ha NF MICRO CAM	
	50-60 Kg/ha FOSFODRIP STARTER	100 Kg/ha N30 DCD			40 L/ha NITROCAL	80 Kg/ha POTASSIO TIOSOLFATO
1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE	50-60 L/ha FOSFONITRIC ACID				50 - 80 Kg/ha RED-K	
	16-20 Kg/ha MICROSED GEO	1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + ERBICIDI DI POST EMERGENZA				
		3 L/ha ACTICLASTER + 250 g/ha CONTROLLO 450 WG + 2 L/ha SUPER LIQUIDO		0,6 L/ha KATOOMBA + 250 g/ha CONTROLLA 450 WG + 2 L/ha SUPER LIQUIDO	3 L/ha ACTICLASTER + 0,8 L/ha BRIONFLO 100 SC + 250 g/ha CONTROLLA 450 WG + 2 L/ha SUPER LIQUIDO	
		5-10 Kg/ha OLIO DI SENAPE ETSA				

MELANZANA

ORTICOLE








		13-29	51-59	61-69	71-79	81-89
Pre Trapianto	Trapianto	Sviluppo fogliare e formazione germogli laterali	Emissione delle infiorescenze	Fioritura: dalla prima infiorescenza aperta fino a 9 o più infiorescenze aperte	Sviluppo del frutto: dal primo grappolo di bacche fino a 9 o più grappoli	Inizio maturazione fino a piena maturazione
1200-2200 Kg/ha BIOFERT S	35-50 Kg/ha MICROSEED BIO	3-5 L/ha NATURAL FORCE + 1 Kg/ha di NUTRIVIT 50 BLU/VERDE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		2 L/ha BORON CARE + 3-5 L/ha NATURAL FORCE	3 L/ha BLACK HUMONAS + 1 Kg/ha di NUTRIVIT 50 BLU/VERDE	3-5 L/ha NATURAL FORCE + 1 Kg/ha di NUTRIVIT 50 BLU/VERDE
			3-5 L/ha NATURAL FORCE 1 Kg/ha di NUTRIVIT 50 BLU/VERDE		5 Kg/ha SUPERFLO CA 545	3-5 L/ha NATURAL FORCE + 1 Kg/ha di NUTRIVIT 50 BLU/VERDE
		40 L/ha NATURAL FORCE + 40 Kg/ha BLACK HUMONAS			10 L/ha NATURAL FORCE	
	30 Kg/ha MICROSEED		2 Kg/ha VIGOR GREEN + 3-5 L/ha NF MICRO MIX + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		3 L/ha NATURAL FORCE	2 Kg/ha VIGOR GREEN + 3-5 L/ha NF MICRO CAM
	50-60 L/ha FOSFONITRIC ACID			40 L/ha NITROMAC 24		50-80 kg/ha RED-K
1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE	16-20 Kg/ha MICROSED GEO	1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + ERBICIDI POST EMERGENZA + 3 L/ha ACTICLASTER	3 L/ha ACTICLASTER + 2 L/ha SUPER LIQUIDO			
	5-10 Kg/ha OLIO DI SENAPE ETSA					

PEPERONE

ORTICOLE








		13-29	51-59	61-69	71-79	81-89
Pre Trapianto	Trapianto	Sviluppo fogliare e formazione germogli laterali	Emissione delle infiorescenze	Fioritura: dalla prima infiorescenza aperta fino a 9 o più infiorescenze aperte	Sviluppo del frutto: dal primo grappolo di bacche fino a 9 o più grappoli	Inizio maturazione fino a piena maturazione
1200-2200 Kg/ha BIOFERT S	35-50 Kg/ha MICROSEED BIO	3 - 5 L/ha NATURAL FORCE + 1 Kg/ha NUTRVIT 50 BLU/VERDE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		2 L/ha BORON CARE + 3-5 L/ha NATURAL FORCE	3 L/ha BLACK HUMONAS + 1 Kg/ha NUTRVIT 50 BLU/VERDE	3 - 5 L/ha NATURAL FORCE + 1 Kg/ha NUTRVIT 50 BLU/VERDE
			3-5 L/ha NATURAL FORCE 1 Kg/ha di NUTRIVIT 50 BLU/VERDE		5 Kg/ha SUPERFLO CA 545	3-5 L/ha NATURAL FORCE + 1 Kg/ha di NUTRIVIT 50 BLU/VERDE
		40 L/ha NATURAL FORCE + 40 Kg/ha BLACK HUMONAS			10 L/ha NATURAL FORCE	
	30 Kg/ha MICROSEED		2 Kg/ha VIGOR GREEN + 3-5 L/ha NF MICRO MIX + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		+ 3 L/ha NATURAL FORCE	2 Kg/ha VIGOR GREEN + 3-5 L/ha NF MICRO CAM
	50-60 L/ha FOSFONITRIC ACID			40 L/ha NITROMAC 24		50 - 80 kg/ha RED-K
1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE	16-20 Kg/ha MICROSED GEO	1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + ERBICIDI POST EMERGENZA + 5 L/ha SUPER LIQUIDO	5 L/ha SUPER LIQUIDO			
	5-10 Kg/ha OLIO DI SENAPE ETSA					

PATATA

ORTICOLE






		09	10-39	40-49	92-99
Pre Trapianto	Trapianto	Emissione delle infiorescenze	Fioritura: dalla prima infiorescenza aperta fino a 9 o più infiorescenze aperte	Sviluppo del frutto: dal primo grappolo di bacche fino a 9 o più grappoli	Inizio maturazione fino a piena maturazione
1200-2200 Kg/ha BIOFERT S	35-50 Kg/ha MICROSEED BIO		3 L/ha NATURAL FORCE +1 Kg/ha NUTRVIT 50 BLU/VERDE+ 3 L/ha BLACK HUMONAS + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		
			1,5 kg/ha NUTRIVIT 50 VERDE/BLU	5 Kg/ha SUPERFLO CA 545	
	30 Kg/ha MICROSEED	Rincalzatura: 200 Kg/ha FERTICEREAL 21 DCD	5 L/ha SUPERFLO CA 545	2 Kg/ha POTASSIO TIOSOLFATO +3 L/ha NATURAL FORCE	
	50-60 Kg/ha GRANOFOS ZN SUPER		40 L/ha NITROMAC 24		
	12-15 Kg/ha MICROSED GEO	3-5 L/ha NF MICRO MIX + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		3-5 L/ha NATURAL FORCE + INSETTICIDA + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700	3-5 L/ha NF MICRO CAM
1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE			1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + ERBICIDI POST EMERGENZA		
			3 L/ha ACTICLASTER + 0,6 L/ha KATOOMBA + 250 g/ha CONTROLLA 450 WG	0,6 L/ha KATOOMBA + 250 g/ha CONTROLLA 450 WG	3 L/ha ACTICLASTER + 0,8 L/ha BRIONFLO 100 SC + 250 g/ha CONTROLLA 450 WG + 60 mL/hs SOLUNTUS 20 SC
	5-10 Kg/ha OLIO DI SENAPE ETSA				

CETRIOLO

ORTICOLE










		15-18	19	21-29	51-59	61-69	71-79	81-89
Pre Trapianto	Trapianto	Sviluppo fogliare: da una a più foglie vere sullo stelo principale	Nove o più foglie sullo stelo principale distese	Formazione dei germogli	Emissione infiorescenze	Fioritura: da uno a più fiori aperti sullo stelo principale	Sviluppo frutto su stelo principale	Da inizio maturazione a piena maturazione
1200-2200 Kg/ha BIOFERT S	35-50 Kg/ha MICROSEED BIO	5 L/ha NATURAL FORCE + 1,5 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE+ 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		2 L/ha BORON CARE + 3 L/ha NATURAL FORCE	3 L/ha NATURAL FORCE + 1,5 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE		5 L/ha NATURAL FORCE	
					5 Kg/ha SUPERFLO CA 545	3-5 L/ha NATURAL FORCE + 1,5 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE		
		40 L/ha NATURAL FORCE						
		3 Kg/ha VIGOR GREEN + 3-5 L/ha NF MICRO MIX + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700			5 L/ha SUPERFLO CA 545	3 Kg/ha VIGOR GREEN + 3-5 L/ha NF MICRO MIX		
	30 Kg/ha MICROSEED	100 Kg/ha N30 DCD		40 L/ha NITROMAC 24				50 Kg/ha RED-K
1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE	16-20 Kg/ha MICROSED GEO	1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + ERBICIDI POST EMERGENZA + 3,5 L/ha SUEPR LIQUIDO		4-5 L/ha ORTIFENS BIO + 3,5 L/ha SUPER LIQUIDO + 250 g/ha CONTROLLA 450 WG				

ANGURIA

ORTICOLE



		15-18	19	21-29	51-59	61-69	71-79	81-89
Pre Trapianto	Trapianto	Sviluppo fogliare: da una a più foglie vere sullo stelo principale	Nove o più foglie sullo stelo principale distese	Formazione dei germogli	Emissione infiorescenze	Fioritura: da uno a più fiori aperti sullo stelo principale	Sviluppo frutto su stelo principale	Da inizio maturazione a piena maturazione
1200-2200 Kg/ha BIOFERT S	35-50 Kg/ha MICROSEED BIO	5 L/ha NATURAL FORCE + 1,5 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		2 L/ha BORON CARE + 3 L/ha NATURAL FORCE	3 L/ha NATURAL FORCE + 1,5 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE		5 L/ha NATURAL FORCE	
					5 Kg/ha SUPERFLO CA 545	3-5 L/ha NATURAL FORCE + 1,5 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE		
		40 L/ha NATURAL FORCE					50-100 kg /ha RED-K	
			3 Kg/ha VIGOR GREEN + 3-5 L/ha NF MICRO MIX + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		5 L/ha SUPERFLO CA 545	3 Kg/ha VIGOR GREEN + 3-5 L/ha NF MICRO MIX		
	30 Kg/ha MICROSEED	100 Kg/ha N30 DCD		40 L/ha NITROMAC 24				50 Kg/ha RED-K
1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE	16-20 Kg/ha MICROSED GEO	1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + ERBICIDI POST EMERGENZA + 3,5 L/ha SUPER LIQUIDO		3,5 L/ha SUPER LIQUIDO + 0,6 L/ha KATOOMBA				
		5-10 Kg/ha OLIO DI SENAPE ETSA						

MELONE

ORTICOLE



		15-18	19	21-29	51-59	61-69	71-79	81-89
Pre Trapianto	Trapianto	Sviluppo fogliare: da una a più foglie vere sullo stelo principale	Nove o più foglie sullo stelo principale distese	Formazione dei germogli	Emissione infiorescenze	Fioritura: da uno a più fiori aperti sullo stelo principale	Sviluppo frutto su stelo principale	Da inizio maturazione a piena maturazione
1200-2200 Kg/ha BIOFERT S	35-50 Kg/ha MICROSEED BIO	5 L/ha NATURAL FORCE + 1,5 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		2 L/ha BORON CARE + 3 L/ha NATURAL FORCE	3 L/ha NATURAL FORCE + 1,5 L/ha CUPRON ULD (o 2-4 L/ha TAN-CU)		5 L/ha NATURAL FORCE	
			5-10 kg/ha CHELIFER 6 WDG		5 Kg/ha SUPERFLO CA 545	3-5 L/ha NATURAL FORCE 1,5 kg/ha NUTRIVIT 50 VERDE/BLU		
		40 L/ha NATURAL FORCE						
			3 Kg/ha VIGOR GREEN + 3-5 L/ha NF MICRO MIX + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		5L/ha SUPERFLO CA 545	3 Kg/ha VIGOR GREEN + 3-5 L/ha NF MICRO MIX		
	30 Kg/ha MICROSEED	100 Kg/ha N30 DCD		40 L/ha NITROMAC 24				50 Kg/ha RED-K
1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE	16-20 Kg/ha MICROSED GEO	1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + ERBICIDI POST EMERGENZA + 3,5 L/ha SUPER LIQUIDO		250 g/ha CONTROLLA 450 WG + 0,6 L/ha KATOOMBA + 3,5 L/ha SUPER LIQUIDO				
		5-10 Kg/ha OLIO DI SENAPE ETSA						

ZUCCA

ORTICOLE



		15-18	19	21-29	51-59	61-69	71-79	81-89
Pre Trapianto	Trapianto	Sviluppo fogliare: da una a più foglie vere sullo stelo principale	Nove o più foglie sullo stelo principale distese	Formazione dei germogli	Emissione infiorescenze	Fioritura: da uno a più fiori aperti sullo stelo principale	Sviluppo frutto su stelo principale	Da inizio maturazione a piena maturazione
1200-2200 Kg/ha BIOFERT S	35-50 Kg/ha MICROSEED BIO	5 L/ha NATURAL FORCE + 1,5 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		2 L/ha BORON CARE + 3 L/ha NATURAL FORCE	3 L/ha NATURAL FORCE + 1,5 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE		5 L/ha NATURAL FORCE	
						3-5 L/ha NATURAL FORCE + 1,5 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE		
				40 L/ha NATURAL FORCE			50-100 Kg/ha RED-K	
			3 Kg/ha VIGOR GREEN + 3-5 L/ha NF MICRO MIX + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		5L/ha SUPERFLO CA 545	3 Kg/ha VIGOR GREEN + 3-5 L/ha NF MICRO MIX		
	30 Kg/ha MICROSEED	100 Kg/ha N30 DCD		40 L/ha NITROMAC 24				50 Kg/ha RED-K
1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE		1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + ERBICIDI POST EMERGENZA + 3,5 L/ha SUPER LIQUIDO		0,6L/ha KATOOMBA + 250 g/ha CONTROLLA 450 WG + 3,5 L/ha SUPER LIQUIDO				
	5-10 Kg/ha OLIO DI SENAPE ETSA							

PISELLO

ORTICOLE



		11-19	30-39	51-59	60-69	71-79	81-89
Pre Trapianto	Trapianto	Sviluppo fogliare	Allungamento stelo con interno di estesi	Emissione infiorescenze	Fioritura	Da sviluppo baccelli a piselli completamente formati	Maturazione del frutto fino a maturazione secca
1200-2200 Kg/ha BIOFERT S	35-50 Kg/ha MICROSEED BIO	5 L/ha NATURAL FORCE + 1,5 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE					
		1,5 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		1 L/ha BORON CARE	1,5 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE + 3 L/ha NATURAL FORCE		
		5-10 kg/ha CHELIFER 6 WDG		1,5 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE		5 L/ha SUPERFLO CA 545	
	30 Kg/ha MICROSED GEO						
1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE	16-20 Kg/ha MICROSED GEO	1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + ERBICIDI POST EMERGENZA					
	5-10 Kg/ha OLIO DI SENAPE ETSA						

FAGIOLO

ORTICOLE



		12	15-59	60-69	71-73	75-99
Pre Trapianto	Trapianto	Primo paio di foglie vere	Da quinta foglia vera fino a primi petali visibili	Da inizio a fine fioritura	Sviluppo baccelli	Da riempimento baccelli fino a raccolta
1200-2200 Kg/ha BIOFERT S	35-50 Kg/ha MICROSEED BIO	5 L/ha NATURAL FORCE + 1,5 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE				
		1,5 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700	1 L/ha BORON CARE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700	1,5 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE + 3 L/ha NATURAL FORCE		
		5-10 kg/ha CHELIFER 6 WDG	1,5 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE	5 L/ha SUPERFLO CA 545		
	30 Kg/ha MICROSED GEO					
1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE	16-20 Kg/ha MICROSED GEO	1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + ERBICIDI POST EMERGENZA	4-5 L/ha ORTIFENS BIO			
	5-10 Kg/ha OLIO DI SENAPE ETSA					

BASILICO

ORTICOLE



0	1-10	11-39	40-49	50-59	70-75	76-90
Semina / trapianto	Post Trapianto	Sviluppo vegetativo	Sviluppo vegetativo	Emissione infiorescenza	Fioritura	Post raccolta
5 L/ha NATURAL FORCE	5 L/ha NATURAL FORCE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700			5 L/ha NATURAL FORCE + 5 L/ha SUPERFLO CA 545 + 1 L/ha BORON CARE		5 L/ha NATURAL FORCE
30 Kg/ha MICROSED GEO	50 Kg/ha NATURAL FORCE + 10 Kg/ha MICROPHYT PLUS					
5 L/ha NATURAL FORCE	5 L/ha NATURAL FORCE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700			5 L/ha NATURAL FORCE + 5 Kg/ha SUPERFLO CA 545 + 1 L/ha BORON CARE		5 L/ha NATURAL FORCE
50 Kg/ha FOSFODRIP STARTER	10 Kg/ha N30		30 Kg/ha MICROPHYT PLUS + 20 Kg/ha NATURAL FORCE			50 Kg/ha NATURAL FORCE

BRASSICACEE

ORTICOLE



0	1-10	11-29	30-49	50-69	70-79	80-90
Semina / trapianto	Germinazione	Sviluppo vegetativo	Sviluppo e crescita rosette	Fioritura	Emissione corimbo	Maturazione
5 L/ha NATURAL FORCE	5 L/ha NATURAL FORCE + 2,5 Kg/ha MICROPHYT PLUS + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700			5 L/ha NATURAL FORCE + 5 L/ha SUPERFLO CA 545 1 L/ha BORON CARE + 2,5 Kg/ha MICROPHYT PLUS		5 L/ha NATURAL FORCE + 2,5 Kg/ha MICROPHYT PLUS
40 Kg/ha MICROSED GEO	50 Kg/ha NATURAL FORCE + 10 Kg/ha MICROPHYT PLUS					
5 L/ha NATURAL FORCE	5 L/ha NATURAL FORCE + 2,5 Kg/ha MICROPHYT PLUS + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700			5 L/ha NATURAL FORCE + 5 Kg/ha SUPERFLO CA 545 1 L/ha BORON CARE + 2,5 Kg/ha MICROPHYT PLUS		5 L/ha NATURAL FORCE + 2,5 Kg/ha MICROPHYT PLUS
50 Kg/ha FOSFODRIP STARTER	250 Kg/ha N30		30 Kg/ha MICROPHYT PLUS + 20 Kg/ha NATURAL FORCE			50 Kg/ha NATURAL FORCE
	4-5 L/ha ORTIFENS BIO + 0,6 L/ha KATOOMBA					

MELO

FRUTTICOLE



0-3	10	31	54-57	60-65	67-69	71-77	81-87	89-91
Da gemma a legno a ingrossamento gemme	Da punte fogliari verdi fino a foglie completamente espanse	Da germogliamento fino a schiusura gemme	Da orecchiette di topo fino a bottoni rossi	Da inizio a piena fioritura	Caduta petali	Sviluppo frutto	Maturazione Raccolta	Post raccolta
3-5 L/ha NATURAL FORCE + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE	3-5 L/ha NATURAL FORCE + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE	3-5 L/ha NATURAL FORCE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		1 L/ha BORON CARE + 3 L/ha BLACK HUMONAS	3 L/ha NATURAL FORCE + 3 L/ha BLACK HUMONAS + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE		3-5 L/ha NATURAL FORCE + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE	5 L/ha NATURAL FORCE
1200 - 2200 Kg/ha BIOFERT S		5-10 Kg/ha CHELIFER 6 WDG			5 Kg/ha SUPERFLO CA 545		5 L/ha NATURAL FORCE + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE	
			3-5 L/ha NF MICRO MIX					3-5 L/ha NITROMAC 24
1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE	4-5 L/ha ORTIFENS BIO + 2,5 L/ha ACTICLASTER + 29 mL/hL SOLUNTUS 20 CS							
	+ 7,5 L/ha SUPER LIQUIDO							
	5-10 Kg/ha OLIO DI SENAPE ETSA							

PERO



0-3	10	31	54-57	60-65	67-69	71-77	81-87	89-91
Da gemma a legno a ingrossamento gemme	Da punte fogliari verdi fino a foglie completamente espanse	Da germogliamento fino a schiusura gemme	Da orecchiette di topo fino a bottoni rossi	Da inizio a piena fioritura	Caduta petali	Sviluppo frutto	Maturazione Raccolta	Post raccolta
3-5 L/ha NATURAL FORCE + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE		3-5 L/ha NATURAL FORCE + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE	3-5 L/ha NATURAL FORCE + 1 L/ha BORON CARE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		3 L/ha NATURAL FORCE + 3 L/ha BLACK HUMONAS + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE		3-5 L/ha NATURAL FORCE	
1200 - 2200 Kg/ha BIOFERT S			5-10 Kg/ha CHELIFER 6 WDG		5 L/ha SUEPERFLO CA 545		5 L/ha NATURAL FORCE + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE	
1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + ERBICIDA SOTTO CHIOMA	4-5 L/ha ORTIFENS BIO + 2,5 L/ha ACTICLASTER + 20 mL/hL SOLUNTUS 20 CS							
	5-10 Kg/ha OLIO DI SENAPE ETSA							

ALBICOCCO



0-9	10-19	31-39	51-55	56-59	60-69	71-77	81-87	
Da gemma a legno a punte verdi	Sviluppo fogliare da perule verdi leggermente aperte fino a prime foglie completamente espanse	Da germogliamento fino a schiusura gemme	Da orecchiette di topo fino a bottoni rossi	Da inizio a piena fioritura	Caduta petali	Sviluppo frutto	Maturazione Raccolta	Post raccolta
5 L/ha NATURAL FORCE + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE		5 L/ha NATURAL FORCE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		1 L/ha BORON CARE + 2 L/ha BLACK HUMONAS	3 L/ha NATURAL FORCE + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE		3-5 L/ha NATURAL FORCE + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE	
1200 - 2200 Kg/ha BIOFERT S		5-10 Kg/ha CHELIFER 6 WDG			3 L/ha NATURAL FORCE + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE		5 L/ha NATURAL FORCE + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE	
	1 L/ha BORON CARE + 3 L/ha NATURAL FORCE						3 Kg/ha RED-K	
	3 - 5 L/ha NF MICRO MIX							3 Kg/ha RED-K
					7 L/ha NITROCAL			
1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + ERBICIDA SOTTO CHIOMA	20 mL/hL SOLUNTUS 20 CS							
		5-10 Kg/ha OLIO DI SENAPE ETSA						

CILIEGIO

FRUTTICOLE



0-9	10-19	31-39	51-55	56-59	60-69	71-77	81-87	
Da gemma a legno a punte verdi	Sviluppo fogliare da perule verdi leggermente aperte fino a prime foglie completamente espanse	Crescita dei germogli	Da ingrossamento gemme a fiore fino a bottoni fiorali visibili	Da allungamento dei petali fino a fiori con petali che formano una palla vuota	Da fiori aperti a fine fioritura	Accrescimento ovario. Scamiciatura fino a fine fioritura	Da inizio colorazione a maturazione e raccolta	Post raccolta
3 L/ha NATURAL FORCE + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE		3 Kg/ha NATURAL FORCE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		1 L/ha BORON CARE + 3 L/ha BLACK HUMONAS	3 L/ha NATURAL FORCE + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE		3-5 L/ha NATURAL FORCE + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE	
1200 - 2200 Kg/ha BIOFERT S		5-10 Kg/ha CHELIFER 6 WDG			5 L/ha SUPERFLO CA 545		5 L/ha NATURAL FORCE + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE	
		1 L/ha SUPERFLO ZN 700						
	2 Kg/ha VIGOR GREEN + 3 - 5 L/ha NF MICRO MIX				5 L/ha NATURAL FORCE			3 Kg/ha RED-K
1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE					100 Kg/ha RED-K			3 - 5 L/ha NITROMAC 24
		4-5 L/ha ORTIFENS BIO						
						5 L/ha SUPER LIQUIDO		
					5-10 Kg/ha OLIO DI SENAPE ETSA			

PESCO

FRUTTICOLE



0-9	10-19	31-39	51-55	56-59	60-69	71-77	81-87	
Da gemma a legno a punte verdi	Sviluppo fogliare da perule verdi leggermente aperte fino a prime foglie completamente espanse	Crescita dei germogli	Da ingrossamento gemme a fiore fino a bottoni fiorali visibili	Da allungamento dei petali fino a fiori con petali che formano una palla vuota	Da fiori aperti a fine fioritura	Accrescimento ovario. Scamiciatura fino a fine fioritura	Da inizio colorazione a maturazione e raccolta	Post raccolta
3 L/ha NATURAL FORCE + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE		3-5 L/ha NATURAL FORCE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		1 L/ha BORON CARE + 2 L/ha BLACK HUMONAS	3-5 L/ha NATURAL FORCE + 5 L/ha SUPERFLO CA 545		3-5 L/ha NATURAL FORCE + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE	
1200 - 2200 Kg/ha BIOFERT S					3 L/ha BLACK HUMONAS + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE		5 L/ha SUPERFLO CA 545	5 L/ha NATURAL FORCE + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE
	3-5 L/ha NF MICRO MIX + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700			3-5 L/ha NITROMAC 24	1 L/ha BORON CARE + 3-5 L/ha NATURAL FORCE			
	2 Kg/ha VIGOR GREEN + 3-5 L/ha NF MICRO MIX							
1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + ERBICIDA SOTTO CHIOMA						50 Kg/ha RED-K + 10 L/ha NITROCAL		5 L/ha NITROMAC 24
		4-5 L/ha ORTIFENS BIO + 20 mL/hL SOLUNTUS 20 CS						
						5 L/ha SUPER LIQUIDO		
			5-10 Kg/ha OLIO DI SENAPE ETSA					

OLIVO

FRUTTICOLE



0-19	31-37	50-54	55-59	60-65	67-69	71-79	81-85	89	92
Ripresa vegetativa. Germogliamento	Accrescimento germogli	Formazione delle infiorescenze	Mignolatura	Fioritura	Caduta petali. Fine fioritura	Frutto con 90% delle dimensioni finali	Invaiatura	Maturazione	Caduta olive
5-10 Kg/ha MICROPHYT PLUS + 3 L/ha NATURAL FORCE			1 L/ha BORON CARE + 5-10 Kg/ha MICROPHYT PLUS + 3 L/ha NATURAL FORCE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700			5-10 Kg/ha MICROPHYT PLUS + 3 L/ha NATURAL FORCE	3-5 L/ha NATURAL FORCE		
1200 - 2200 Kg/ha BIOFERT S						5 L/ha SUPERFLO CA 545	5-10 Kg/ha MICROPHYT PLUS + 3 L/ha NATURAL FORCE + INSETTICIDA		
5-10 kg/ha MICROPHYT PLUS + 3 L/ha NATURAL FORCE			1 L/ha BORON CARE + 5-10 Kg/ha MICROPHYT PLUS + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700			5 L/ha SUPERFLO CA 545	5-10 Kg/ha MICROPHYT PLUS + 3 L/ha NATURAL FORCE + INSETTICIDA		
1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE							1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE		

VITE

FRUTTICOLE



0	09	11-19	57	61-68	71	73-75	77	81-85	89
Gemma invernale	Gemme schiuse punte verdi	Sviluppo fogliare: da prima foglia distesa fino a nove o più foglie distese	Bottoni floreali separati	Fioritura	Allegagione	Sviluppo degli acini (stadio piccolo pisello)	Chiusura del grappolo	Da inizio invaiatura a piena invaiatura	Piena maturazione. Acini pronti per la raccolta
3-5 L/ha NATURAL FORCE + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE			3-5 L/ha NATURAL FORCE + 1 L/ha BORON CARE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		3-5 L/ha NATURAL FORCE + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE		5 L/ha SUPERFLO CA 545		
1200 - 2200 Kg/ha BIOFERT S		5 - 10 Kg/ha CHELIFER 6 WDG			5 L/ha NATURAL FORCE + 2 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE				
2 Kg/ha VIGOR GREEN + 2 kg/ha NUTRIVIT 50 VERDE/BLU			2 Kg/ha VIGOR GREEN + 1 L/ha BORON CARE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		3 L/ha BLACK HUMONAS	3-5 L/ha NF MICRO CAM			
			3-5 L/ha NF MICRO MIX + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700			2 L/ha SUPERFLO MG 580			
							50 Kg/ha RED-K		
		18 mL/hL SOLUNTUS 20 CS + 4 L/ha SUPER LIQUIDO							
		3 L/ha ACTICLASTER + 250 g/ha CONTROLLA 450 WG	0,6 L/ha KATOOMBA + 250 g/ha CONTROLLA 450 WG		3 L/ha ACTICLASTER + 1 L/ha BRIONFLO 100 SC + 250 g/ha CONTROLLA 450 WG (o 0,6 L/ha KATOOMBA)				
1-1,5 L/ha CLEANCLASTER + ERBICIDA SOTTO CHIOMA									
			4-5 L/ha ORTIFENS BIO						
			5-10 Kg/ha OLIO DI SENAPE ETSA						

NOCCIOLO

FRUTTICOLE



Sviluppo delle gemme	Sviluppo delle foglie	Sviluppo dei frutti	Maturazione dei frutti	Caduta delle foglie
1 l/ha BORON CARE + 2-2,5 Kg/ha MICROPHYT PLUS + 3 L/ha NATURAL FORCE	2-2,5 Kg/ha MICROPHYT PLUS + 3 L/ha NATURAL FORCE + 2 L/ha SUPERFLO MG 580	2-2,5 Kg/ha MICROPHYT PLUS + 3 L/ha NATURAL FORCE + 2 L/ha SUPERFLO MG 580	3-5 l/ha NATURAL FORCE	
1200 - 2200 Kg/ha BIOFERT S	100 Kg/ha BIOFERT S			
	600 - 800 Kg/ha CS NPK 10.5.5 + 2 MgO			
1 L/ha BORON CARE + 2-2,5 Kg/ha MICROPHYT PLUS	2-2,5 Kg/ha MICROPHYT PLUS + 3 L/ha NATURAL FORCE + 2 L/ha SUPERFLO MG 580	INSETTICIDA + 2-2,5 Kg/ha MICROPHYT PLUS + 3 L/ha NATURAL FORCE + 2 L/ha SUPERFLO MG 580		
	3-5 L/ha NF MICRO CAM			
	1-1,5 l/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE			1-1,5 l/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE
	5-10 Kg/ha OLIO DI SENAPE ETSA			

CASTAGNO

FRUTTICOLE



00 03 07	10 11	51	61 65 67 69	71 79	81 89
Sviluppo delle gemme	Sviluppo delle foglie	Emergenza delle infiorescenze	Fioritura	Sviluppo dei frutti	Maturazione dei frutti e dei semi
2-2,5 Kg/ha MICROPHYT PLUS + 3 L/ha NATURAL FORCE + 2 L/ha SUPERFLO MG 580		1 L/ha BORON CARE + 2-2,5 Kg/ha MICROPHYT PLUS + 3 L/ha NATURAL FORCE + 2 L/ha SUPERFLO MG 580		2-2,5 Kg/ha MICROPHYT PLUS + 3 L/ha NATURAL FORCE	3-5 l/ha NATURAL FORCE
1200 - 2200 Kg/ha BIOFERT S	100 Kg/ha BIOFERT S				
	600-800 Kg/ha CS NPK 10.5.5 + 2 MgO				
2-2,5 Kg/ha MICROPHYT PLUS + 3 L/ha NATURAL FORCE + 2 L/ha SUPERFLO MG 580		1 L/ha BORON CARE + 2-2,5 Kg/ha MICROPHYT PLUS + 2 L/ha SUPERFLO MG 580		INSETTICIDA + 2-2,5 Kg/ha MICROPHYT PLUS + 3 L/ha NATURAL FORCE	
	3-5 L/ha NF MICRO CAM				
1-1,5 l/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE					1-1,5 l/ha CLEANCLASTER + GLIFOSATE
	5-10 Kg/ha OLIO DI SENAPE ETSA				

KIWI



0	1-18	19-39	40-60	61-69	70-73	74-80	81-85	86-89	90-97
Riposo vegetativo	Ripresa vegetativa Prime foglie	Prime foglie sviluppate	Rigonfiamento gemme florali. Apertura primi fiori	Fioritura	Piccoli frutti	Ingrossamento frutti	14 - 21 gg pre raccolta	Raccolta	Dopo raccolta: messa in riserva
	3 L/ha NATURAL FORCE + 1 L/ha BORON CARE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700	1 L/ha BORON CAR	3 L/ha NATURAL FORCE + 1,5 L/ha BLACK HUMONAS	3 L/ha NATURAL FORCE + 1,5 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE	5 L/ha NATURAL FORCE+ 1,5 Kg/ha NUTRIVIT 50 BLU/VERDE				
1200 - 2200 Kg/ha BIOFERT S				5 L/ha SUPERFLO CA 545					
		100-150 Kg/ha N30 DCD		100 Kg/ha NITROCAL		50-100 Kg/ha RED-K			
		5 L/ha NATURAL FORCE + 1 L/ha BORON CARE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		3 L/ha NATURAL FORCE + 1,5 L/ha BLACK HUMONAS	3 L/ha NATURAL FORCE + 1,5 L/ha CUPRON ULD	5 L/ha NATURAL FORCE + 3 Kg/ha RED-K			
	3-5 L/ha NF MICRO MIX			5 L/ha SUPERFLO CA 545 + 3-5 L/ha NF MICRO CAM					
		5-10 Kg/ha OLIO DI SENAPE ETSA							

FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI



1-18	12-39	40-60	70-73	74-80	81-85	90-97
Impianto / trapianto stoloni	Sviluppo vegetativo	Fioritura	Allegagione	Ingrossamento frutti	Inviatura	Maturazione
5 L/ha NATURAL FORCE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700		5 L/ha NATURAL FORCE + 1 L/ha BORON CARE		5 L/ha NATURAL FORCE + 5 Kg/ha SUPERFLO CA 545		
40 Kg/ha MICROSEED BIO	50 Kg/ha NATURAL FORCE + 10 Kg/ha MICROPHYT PLUS					
5 L/ha NATURAL FORCE	5 L/ha NATURAL FORCE + 1 L/ha SUPERFLO ZN 700	5 L/ha NATURAL FORCE + 1 L/ha BORON CARE		5 L/ha NATURAL FORCE + 5 L/ha SUPERFLO CA 545	5 L/ha NATURAL FORCE + 3 Kg/ha RED-K	
		3-5 L/HA NF MICRO MIX		3-5 L/ha NF MICRO CAM		
50 Kg/ha FOSFODRIP STARTER	300 Kg/ha N30 DCD		30 Kg/ha MICROPHYT PLUS + 50 Kg/ha NITROCAL		50 Kg/ha RED-K	
	5-10 Kg/ha OLIO DI SENAPE ETSA					



DA 25 ANNI SCENDIAMO IN CAMPO
AL FIANCO DEGLI AGRICOLTORI.

E CONTINUIAMO A FARLO.

AREE DI COMPETENZA



AREA NORD-OVEST

Alberto Bonetto
Tel. +39 331 1067849
area.nordovest@eurotsa.it

AREA NORD-EST

Andrea Lisotto
Tel. +39 335 247071
andrea.lisotto@eurotsa.it

AREA CENTRO

Vincenzo Staniscia
Tel. +39 333 8069419
area.centro@eurotsa.it

AREA SUD

Saverio Mastropasqua
Tel. +39 342 5881971
area.sud@eurotsa.it

CENTRI ANTIVELENO

In caso di necessità consultare uno dei seguenti centri:

ANCONA

Centro Antiveleni
del centro universitario
ospedaliero di
farmacovigilanza
Tel. 071/2181028

BERGAMO

Centro Antiveleni U.S.
tossicologia clinica
Azienda Ospedali
Riuniti
Tel. 800883300

BOLOGNA

Ospedale Maggiore
Via Largo Negrisoli, 2
Tel. 051/6478955

CATANIA

Ospedale Garibaldi
Centro Antiveleni
Piazza S. Maria Gesù, 7
Tel. 800410989

CESENA

Ospedale Maurizio
Bufalini
Viale Ghirotti, 286
Tel. 0547/352612

CHIETI

Ospedale
Sant. ma Annunziata
Tel. 0871/551219

FIRENZE

Azienda Ospedaliera
Careggi
Viale G.B. Morgagni, 65
Tel. 055/4277819

GENOVA

Ospedale Gaslini
Tel. 010/3760873
Ospedale San Martino
Via Benedetto XV 10
Tel. 010/352808

LA SPEZIA

Ospedale Civile S.
Andrea
Via Vittorio Veneto,197
Tel. 0187/533376

LECCE

Ospedale Regionale
Vito Fazzi
Via Rossini, 2
Tel. 0832/351105

MESSINA

Unità degli Studi di
Messina, Villaggio
Santissima Annunziata
Tel. 090/2212451

MILANO

Ospedale Niguarda Ca'
Grande
Piazza Ospedale
Maggiore 3
Tel. 02/66101029

NAPOLI

Ospedali Riuniti
Cardarelli
Via Antonio Cardarelli 9
Tel. 081/7472870

NAPOLI

Istituto Farmacologia e
Tossicologia
Via Costantinopoli 16
Tel. 081/459802

PADOVA

Istituto di Farmacologia
Universitaria
Largo Egidio
Meneghetti 2
Tel. 049/931111

PAVIA

Centro Nazionale di
Informazione
Tossicologica
Via a. Ferrata, 8
Tel. 0382/24444

PORDENONE

Ospedale Civile Centro
Rianimazione
Via Montereale 24
Tel. 0434/399698

REGGIO CALABRIA

Ospedali Riuniti Centro
Antiveleni
Via G. Melacrino 1
Tel. 0965/811624

ROMA

Policlinico Agostino
Gemelli Istituto di
Anestesiologia e
Rianimazione
L.go Agostino Gemelli 8
Tel. 06/3054343

ROMA

Policlinico Umberto I
Viale del Policlinico
Tel. 06/49978020

TORINO

Università di Torino
Via Achille Mario
Dogliotti
Tel. 011/6637637

TRIESTE

Istituto per l'Infanzia
Via dell'Istria 65/1
Tel. 040/3785373

VICENZA

Ospedale Civile S.
Bortolo
Via Rodolfi 37
Tel. 0444/753111

NOTE

NOTE

EUROTSA

EURO TSA srl

S.S. Cremasca 591, n°8
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Tel +39 0363 337114
info@eurotsa.it

Visualizza e scarica
il nostro catalogo in pdf

www.eurotsa.it