

Grupo de maturação

M3,404 e 501: 7.8 | M4 e 405: 7.7

Peso de mil grãos

167g

Exigência à fertilidade M3 e M4

1 2 3 4 5

Benefícios

- Alto potencial produtivo
- Permite abertura de plantio
- Ampla região de adaptação
- Resistência a Nematoide de Cisto

Exigência à fertilidade M5

1 2 3 4 5

Características

- R (resistente): cisto raça 3
- MR (moderadamente resistente): cisto raças 6, 9, 10, 14 e 14+

Região	Micro	Ciclo Médio ¹ (dias) ²	SETEMBRO					OUTUBRO					NOVEMBRO					DEZEMBRO					População plantas finais ³							
			01	05	10	15	20	25	30-01	05	10	15	20	25	31-01	05	10	15	20	25	30-01	05	10	15	20	25	31			
DF	Irrigado	304	119							05	10	15	20	25		05	10	15	20	25		05	10	15	20	25		180 - 240 mil		
DF	Sequeiro	304	119													20	25		05	10	15	20	25							200 - 280 mil
GO	Sudoeste	301	119							05	10	15	20	25		05	10	15	20	25		05	10	15	20	25		200 - 280 mil		
GO	Sudoeste e Sul	302	115													20	25		05	10	15	20	25							200 - 280 mil
GO	Centro Sul	303	125													15	20		05	10	15	20	25							160 - 240 mil
GO	Leste (irrigado)	304	119							05	10	15	20	25		05	10	15	20	25		05	10	15	20	25		180 - 240 mil		
GO	Leste (sequeiro)	304	119													20	25		05	10	15	20	25							200 - 280 mil
GO	Centro-Oeste	401	114													15	20		05	10	15	20	25							200 - 280 mil
GO	Norte	404	114													15	20		05	10	15	20	25							200 - 280 mil
MG	Pontal	302	125													15	20		05	10	15	20	25							160 - 220 mil
MG	Alto Paranaíba	303	125													15	20		05	10	15	20	25							160 - 220 mil
MG	Triângulo	303	125													15	20		05	10	15	20	25							160 - 220 mil
MG	Noroeste (irrigado)	304	119							05	10	15	20	25		05	10	15	20	25		05	10	15	20	25		180 - 240 mil		
MG	Noroeste (sequeiro)	304	119													20	25		05	10	15	20	25							200 - 280 mil
MT	Sul	401	111							05	10	15	20	25		05	10	15	20	25		05	10	15	20	25		280 - 320 mil		
MT	Médio-Norte	402	105							05	10	15	20	25		05	10	15	20	25		05	10	15	20	25		280 - 320 mil		
MT	Oeste	402	105							05	10	15	20	25		05	10	15	20	25		05	10	15	20	25		280 - 320 mil		
MT	Vale do Araguaia	403	104													20	25		05	10	15	20	25							280 - 320 mil

Preferencial Tolerada

¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. ²Dias após a emergência. ³Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. ⁴Pontos importantes para cultivo na região da Micro 501 PI: áreas de alta fertilidade; evitar antecipação da data de semeadura e plantio de risco (com chuvas não consolidadas). 5A Região 405 Oeste (Beira da Serra) abrange a microrregião de Garganta, além de partes das microrregiões de Estrondo, Placas, Bela Vista e Serra de Roda Velha. Suas coordenadas geográficas delimitam a região da seguinte maneira: ao sul, LAT: -13.343059° / LONG: -46.247182°, e ao norte, LAT: -11.320994° / LONG: -46.185815°.