

Grupo de maturação

M3 e 405: 7.1

Peso de mil grãos

172g

Exigência à fertilidade

1 2 3 4 5

M4: 7.2

Benefícios

- Alto potencial produtivo
- Cultivar precoce que permite abertura de semeadura
- Tolerante a sulfonilureias STS™⁴
- Resistência a Nematoide de Cisto

Características

- R** (resistente): cisto raça 3
- MR** (moderadamente resistente): cisto raças 6, 9, 10, 14 e 14+

Região	Micro	Círculo Médio ¹ (dias) ²	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	População plantas finais ³
			01 05 10 15 20 25	30-01 05 10 15 20 25	31-01 05 10 15 20 25	30-01 05 10 15 20 25	31
DF Irrigado	304	105					220 – 280 mil
DF Sequeiro	304	105					240 – 300 mil
GO Sudoeste	301	106					240 – 300 mil
GO Sudoeste e Sul	302	103					240 – 300 mil
GO Centro Sul	303	112					200 – 300 mil
GO Leste Irrigado	304	105					220 – 280 mil
GO Leste Sequeiro	304	105					240 – 300 mil
MG Pontal	302	112					200 – 260 mil
MG Sul	302	128					200 – 240 mil
MG Alto Paranaíba	303	112					200 – 280 mil
MG Triângulo	303	112					200 – 280 mil
MG Noroeste Irrigado	304	105					220 – 280 mil
MG Noroeste Sequeiro	304	105					240 – 300 mil
MT Sul	401	103					300 – 350 mil

Preferencial Tolerada

¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. ²Dias após a emergência. ³Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. ⁴STS™ é uma marca registrada da DuPont™ de Nemours and Company ou de suas afiliadas e é utilizada sob licença da GDM SEEDS e suas afiliadas brasileiras.