



TANQUE I2X

74IX75RSF I2X



Grupo de maturação

M3: 7.4

Peso de mil grãos

175g

Exigência à fertilidade

1 2 3 4 5

M4 e M5: 7.5

Benefícios

- Alto potencial produtivo
- Porte controlado
- Resistência a Nematoide de Cisto

Características

- R** (resistente): cisto raça 3
- MR** (moderadamente resistente): cisto raças 6, 9, 10, 14 e 14+

Região	Micro	Ciclo Médio ¹ (dias) ²	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	População plantas finais ³
			01 05 10 15 20 25 30-01	05 10 15 20 25 31-01	05 10 15 20 25 30-01	05 10 15 20 25 31	
DF Irrigado	304	109					250 – 300 mil
DF Sequeiro	304	109					250 – 350 mil
GO Sudoeste	301	113					280 – 350 mil
GO Sudoeste e Sul	302	104					280 – 350 mil
GO Centro Sul	303	109					220 – 300 mil
GO Leste Irrigado	304	109					250 – 300 mil
GO Leste Sequeiro	304	109					250 – 350 mil
GO Centro-Oeste	401	112					280 – 350 mil
GO Norte	404	110					280 – 350 mil
MG Pontal	302	116					220 – 300 mil
MG Sul	302	128					200 – 250 mil
MG Alto Paranaíba	303	116					220 – 300 mil
MG Triângulo	303	116					220 – 300 mil
MG Noroeste - Irrigado	304	109					250 – 300 mil
MG Noroeste - Sequeiro	304	109					250 – 350 mil
MT Médio - Norte	402	100					380 – 420 mil
MT Oeste	402	100					380 – 420 mil
MT Vale do Araguaia	403	104					380 – 420 mil

Preferencial Tolerada

¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. ²Dias após a emergência. ³Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas.