

AFKLARING AF INDIKATION

IKKE INDIKATION FOR ANTIPSYKOTIKA



Agitation/ aggression

- Uro og restløshed.
- Vrede og frustration, hvor patienten ikke er til fare for sig selv eller andre.



Forpintethed

- Periodisk tristhed eller gråd
- Angst og forvirring.
- Vrangforestillinger, hvor livskvalitet ikke er påvirket.



Uro ved delirium

- Uro eller agitation, hvor det stadig er muligt at uderede og behandle udløsende årsager.



Søvnløshed og angst

- Uro i aften- og nattetimer
- Afbrudt nattesøvn
- Vende op og ned på dag og nat



Afdæk udløsende årsager til adfærden gennem systematisk årsagsanalyse

Årsagsanalysen skal afdække følgende:

- Kommunikationsproblemer, fx for meget eller uoverskuelig kommunikation fra pårørende eller plejepersonale.
- Utilpassede krav fra omgivelserne, fx krav patienten ikke kan honorere pga. nedsat kognitiv funktion.
- Fysiske omgivelser, fx uoverskueligt eller utrygt miljø.
- Fysiske helbredsproblemer, fx infektion, dehydrering, obstipation eller underernæring.
- Bivirkninger af medicin, fx antikolinerg medicin, benzodiazepiner, antidemensmedicin, opioider og andre smertestillende, da de kan forværre den kognitive funktion og udløse delirium.



Afprøv plejefaglige tiltag



Supplér med antipsykotika ved



Svær agitation/ aggression

- Patienten er til fare for sig selv eller andre i akutte situationer.



Svær forpintethed

- Vrangforestillinger eller hallucinationer, som påvirker livskvalitet markant.



Svær uro ved delirium

- Uro og agitation, der forhindrer behandling af udløsende somatiske årsager.
- Uro og forpintethed hos terminale patienter.



Søvnløshed

- Ikke indikation for antipsykotika.
- Afprøvning af søvnhygiejniske tiltag.

INDIKATION FOR ANTIPSYKOTIKA