

AFKLARING AF INDIKATION

IKKE INDIKATION FOR ANTIPSYKOTIKA



Agitation/ aggression

- Uro og restløshed.
- Vrede og frustration, hvor patienten ikke er til fare for sig selv eller andre.



Forpintet

- Periodisk tristhed eller gråd.
- Angst og forvirring.
- Vrangforestillinger, hvor livskvalitet ikke er påvirket.



Uro ved delirium

- Uro eller agitation, hvor det stadig er muligt at uderede og behandle udløsende årsager.



Søvnløshed

- Uro i aften- og nattetimer.
- Afbrudt nattesøvn.
- Vender op og ned på dag og nat.



Afdæk udløsende årsager til adfærden gennem systematisk årsagsanalyse

Årsagsanalysen skal afdække følgende:

- **Kommunikationsproblemer**, fx for meget eller uoverskuelig kommunikation fra pårørende eller plejepersonale.
- **Utilpassede krav fra omgivelserne**, fx krav patienten ikke kan honorere pga. nedsat kognitiv funktion.
- **Fysiske omgivelser**, fx uoverskueligt eller utrygt miljø.
- **Fysiske helbredsproblemer**, fx infektion, dehydrering, obstipation eller underernæring.
- **Bivirkninger af medicin**, fx antikolinerg medicin, benzodiazepiner, antidemensmedicin, opioider og andre smertestillende, da de kan forværre den kognitive funktion og udløse delirium.



Afprøv plejefaglige tiltag



Supplér med antipsykotika ved



Svær agitation/ aggression

- Patienten er til fare for sig selv eller andre i akutte situationer.



Svær forpintet

- Vrangforestillinger eller hallucinationer, som påvirker livskvalitet markant.



Svær uro ved delirium

- Uro og agitation, der forhindrer behandling af udløsende somatiske årsager.
- Uro og forpintet hos terminale patienter.



Søvnløshed

- Ikke indikation for antipsykotika.
- Afprøvning af søvnhygiejniske tiltag.

INDIKATION FOR ANTIPSYKOTIKA