

Brugervejledning

Demens og antipsykotika i EG Clinea


Formål

Funktionen Demens og antipsykotika hjælper praktiserende læger med at identificere demenspatienter, der aktuelt får antipsykotisk behandling. Målet er at styrke kvaliteten af behandlingen og reducere unødvendig brug af antipsykotisk medicin blandt ældre patienter.


Adgang til funktionen i EG Clinea

For at få adgang til funktionen Demens og antipsykotika i EG Clinea skal du:


1. Gå til Patienthoved.
2. Åbn Statistik-modulet ved at klikke på ikonet øverst i venstre hjørne.




I Statistik åbnes et automatisk vindue, hvor du kan vælge at anvende en tidligere defineret statistikskabelon. Bruger du Demens og antipsykotika for første gang, skal du oprette en ny skabelon.




Vælg statistikmodulet Demens og antipsykotika ved at klikke på plus-ikonet (+).




Marker alle felter, der skal indgå i rapporten, angiv rapportens navn, og gem skabelonen til sidst.



Brug en prædefineret skabelon og tryk på OK.



Se listen med patienter: Listen med patienter, der opfylder kriterierne for at blive inkluderet, vil fremgå her.



Spørgsmål: Hvilke patienter bliver inkluderet på listen?

Inklusionskriterier: Patienter med en demensdiagnose (P70) eller patienter registreret med hukommelsessvigt (P20), der har en åben/aktiv ordination på antipsykotisk medicin. Bemærk patienter, der på et tidligere tidspunkt har fået antipsykotika og hvor ordinationen endnu ikke er afsluttet i dit lægepraksissystem (slutdato) vil fremgå af listen.