

Vejledning til at fremsøge patientlister i Forløbsplansmodulet

Fokus på nyrerne: Triple whammy og Metformin

Patientlister fra Forløbsplansmodulet

KiAP har i FLP-modulet udviklet patientlister, der gør det nemt at fremsøge de patienter der er emnet for klyngepakke Fokus på nyrerne: Triple whammy og Metformin. Hvor du finder Forløbsplaner afhænger af hvilket journalsystem I anvender.

CGM XMO	Klik på fanen Statistik → Forløbsplaner → Vis alle forløbsplaner
EGClinea	Åbn Systemmanager → Klik på Diverse → Forløbsplaner / RKKP → Opgaver → Forløbsplaner → Vis alle forløbsplaner
NOVAX	Klik på Kommunikation → Kommunikation (nederst til vestre) → Forløbsplaner → Øvrige opgaver
MultiMedWEB	Genveje → Forløbsplaner
MyClinic	Periodisk → Nationale forløbsplaner
WinPLC	Klik på Vis → Forløbsplaner → Vis alle forløbsplaner

TRIPLE WHAMMY PATIENTER

Find patientlister i klinikkens journalsystem

KiAP har udviklet patientlister, der gør det nemt at fremsøge patienter i triple whammy-behandling og patienter, der hvis de køber NSAID-præparater i håndkøb er i risiko for triple whammy. Det er derfor let at få overblik over hvilke patienter det drejer sig om i egen klinik. Med udgangspunkt i de lister, giver det mulighed for at indkalde triple whammy patienter til medicingennemgang og ændring af medicin. Listen over triple whammy *risiko-patienter* kan anvendes til at få et overblik over hvem der skal mindes om ikke at anvende NSAID-præparater, da de sælges som håndkøbsmedicin.

I oversigten over forløbsplaner vælges Triple Whammy:

Lægefaglige oversigter



Her vises patienter, som aktuelt er i Triple Whammy behandling, hvor både ACE-I/AT2, diuretika og NSAID er ordineret. På fanebladet ved siden af, vises patienter, som aktuelt er i risiko for triple whammy behandling med både ACE-I/AT2 og diuretika – og ikke er ordineret NSAID, men hvis deres nyrefunktion aktuelt er påvirket, bør de mindes om ikke at anvende NSAID i håndkøb.

Triple Whammy

Information

Her vises patienter, som aktuelt er i Triple Whammy behandling. Det betyder, at de er i behandling med en kombination af ACE-hæmmer eller AT2-receptor antagonist, diuretika og NSAID. Ordinationen af medicinen er 'fast', det betyder, at medicinen ikke er slettet, pauseret eller seponeret og at slutdatoen enten ikke er sat - eller er sat til at være efter dags dato. Vær opmærksom på, at NSAID medicin med doseringstype 'PN' også vises her, da det kan være en god ide, at tage stilling til denne form for PN medicin, når patienten i forvejen behandles med ACE/AT2 og diuretika.

Triple Whammy behandling er en nefrotoksisk cocktail og kan medføre akut nyresvigt. Der er 31% øget risiko for akut nyresvigt for patienter i denne behandling, hvilket fordobles indenfor de første 30 dages behandling. Ældre er især i risiko pga. den faldende nyrefunktion med alderen. Derudover bør man være opmærksom på, at behandling med NSAID - selv kortvarigt, generelt frarådes til patienter med erkendt eller høj risiko for hjertekarsygdom, hvilket flere patienter inkluderet i forløbsplans-visningerne kan have.

Vær opmærksom på, at her inkluderes patienter, som har en ordination på NSAID. Der kan være flere af praksis patienter, som får ACE/AT2 og diuretika fast, men som tager NSAID i håndkøb. Disse patienter bør praksis også være opmærksom på, selv om de ikke kan vises i listen her.

Praksis kan kun ændre en patients medicinske behandling i FMK. Ændres der i en patients medicinske behandling på FMK, vil det slå igennem til forløbsplaner øjeblikkeligt.

Triple Whammy	Double Whammy	Patienter: 10 ?											Mere ▼	
		Navn	Cpr	ACE/ A2A	Diuretika	NSAID	NSAID Type	eGFR	eGFR fald	Albumin kreatinin	S-kreatinin	Blodtryk	Diabetes	IHS
		Charles T. Groth	190279-9995	●	●	●	Fast	84	6 !	78	181	130/80		●
		Conni T. Petersen	160356-9996	●	●	●	Fast	80	4	65	56	131/82	●	
		Jeanne T. Raun	150659-9995	●	●	●	Fast	84	6 !	14	103	150/90	●	●
		Leon T. Albertsen	040238-9996	●	●	●	Fast	25	15 !	402	66	123/72		●
		Simone T. Ladefoged	261180-9996	●	●	●	Fast	80		333	80	140/85	●	●
		Susan T. Skou	270244-9996	●	●	●	Fast	90		24	151	135/84		●
		Bent T. Brandt	100274-9995	●	●	●	PN	85		350		125/80		●
		Leo T. Iversen	030859-9996	●	●	●	PN	86		20	143	119/80		●
		Pernille T. Buus	111178-9996	●	●	●	PN	90		85	234	135/82	●	
		John D. Mann	050968-9995	●	●	●	(ikke angivet)	65	25 !	25		130/78		●

Patientliste: Triple Whammy

Listen af Triple Whammy-patienter er oftest så kort (oftest <10 patienter), at problemstillingen hurtigt kan løses ved at patienterne kontaktes per telefon, mail eller problemstillingen italesættes næste gang patienten er i klinikken. For de fleste af patienter på listen har klinikens læger formentlig talt med patienten om problemstillingen. I patientlisten er der mulighed for at sortere patienterne efter, hvem der synes at have en aftagende nyrefunktion, og dermed er det nemt at afgøre om der er behov for at kontakte patienterne.

Patientliste: Triple whammy risikopatienter

På tilsvarende vis kan du i dit journalsystem finde en liste over patienter, der hensigtsmæssigt får en kombination af ACE-hæmmer eller angiotensin II-receptorblokker + diuretika. Denne patientliste er oftest ganske lang (typisk > 100 patienter), da mange patienter. Denne liste kan eksempelvis benyttes til at sikre, at de ved førstkommande årskontrol får en snak om at de ikke skal bruge NSAID.

Du kan se en demo af triple whammy-patientlisten [her](#).

DIABETES-PATIENTER I METFORMIN-BEHANDLING

Find patientlister i klinikkens journalsystem

I oversigten over forløbsplaner vælges 'Diabetes':

Forløbsplaner



Diabetes
Gå til patientliste



KOL
Gå til patientliste



Iskæmisk Hjertesygdom (IHS)
Gå til patientliste



Hypertension
Gå til patientliste



Hyperkolesterolæmi
Gå til patientliste



Familiær Hyperkolesterolæmi
Gå til patientliste


Herefter vælges 'overblik' og derefter 'nyrefunktion'

Diabetes

Diabetes patienter med IHS diagnose kan fremsøges i en separat liste her.





Patientgrundlag: 200




Nyrefunktion

Print



Se på grafen 'eGFR og Metformin'

eGFR og Metformin



* patienter med eGFR < 30 ml/min bør ikke behandles med metformin

** Patienter med eGFR mellem 30-60 ml/min bør halveres i dosis af metformin

Uden Behandling Får Behandling

Ved at klikke på de gule søjler ses en liste over patienter i Metformin-behandling i de to eGFR opdelinger. Listen kan printes eller eksporteres til Excel.

Print
Excel

Aktuelle patienter, som har en eGFR < 30 ml/min OG som får behandling med metformin

Navn	Cpr	Blodtryk	Blodtryk dato	Albumin kreatinin	Albumin kreatinin dato	ACE/AT2 beh.	Antihyp. Beh.	ASA	eGFR	eGFR dato	Metformin behandling	Metformin styrke	Metformin dosis
Simone Gade	090133-9995	152/92	11-08-2025	6	22-03-2025	●	1 præp.	●	5	02-10-2024	12-01-2025		
Susanne T. Sørensen	210166-9996	145/87	24-02-2024	2	24-02-2024				14	24-02-2024	09-07-2020	1050 mg	
Søren T. Sørensen	220265-9995	125/68	24-02-2024	12	24-02-2024				25	24-02-2024	04-08-2021	1050 mg	
Tim T. Thomsen	290964-9995	128/78	24-02-2024	200	24-02-2024				15	24-02-2024	26-04-2021	1050 mg	

Mikroalbuminuri U-alb/krea 30-300 mg/g
Makroalbuminuri ≥ 300 mg/g

Luk

Du kan se en demo af listen over diabetespatienter i Metformin-bahndling [her](#).