

COMO UTILIZAR UNICAMENTE MISOPROSTOL PARA EL ABORTO CON MEDICAMENTOS


1. ASEGÚRATE QUE ESTÁS EMBARAZADA

Hazte una prueba de embarazo de dos líneas.
Nota: Las pruebas digitales pueden dar resultados positivos falsos.



2. ¿CUÁNTAS SEMANAS DE EMBARAZO TENGO?

Utiliza una calculadora de embarazo o un calendario para calcular cuántas semanas han pasado desde el primer día de tu última menstruación.



3.



NO TOME ESTE MEDICAMENTO SI TIENE:


- Un DIU colocado
- Un embarazo ectópico
- Problemas de sangrado o si está tomando un anticoagulante

4. ¿QUÉ NECESITO ANTES DE EMPEZAR EL PROCESO?


- Al menos **12 tabletas** de misoprostol de 200 mcg cada uno



- **Analgésicos de venta libre:** ibuprofeno 200 mg, hasta 4 comprimidos (800 mg), y/o Tylenol 500 mg, hasta 2 comprimidos (1000 mg), cada 6 horas, según sea necesario para aliviar el dolor.




- Una caja de **toallas sanitarias** para flujo abundante



6. ¿CÓMO DEBO TOMAR LAS PASTILLAS DE MISOPROSTOL?

- **Mantenga 4 tabletas de misoprostol debajo de la lengua durante 30 minutos y tragnadolas mientras que disuelvan**
- **Enjuáguese la boca con agua y espere 3 horas**
- **Mantenga 4 más tabletas de misoprostol debajo de la lengua durante 30 minutos**
- **Enjuáguese la boca con agua y espere 3 horas**
- **Mantenga 4 más tabletas de misoprostol debajo de la lengua durante 30 minutos**



- El sangrado debería comenzar entre 30 minutos y 24 horas después de tomar el misoprostol.

7. ¿CÓMO SABER SI TENGO UNA COMPLICACIÓN?

- **DEMASIADO SANGRADO**
 - Si empapas más de cuatro compresas de flujo abundante en dos horas o menos, debes llamar o enviar un mensaje de texto al 872-201-3000 o acudir a un servicio de urgencias médicas.
- **FIEBRE**
 - Es normal tener un poco de fiebre mientras se toma el misoprostol. Si tienes fiebre superior a 38,3 °C más de 24 horas después de la última dosis de misoprostol, esto podría ser un signo de infección.
- **DOLOR**
 - Es normal sentir fuertes calambres o contracciones durante el aborto. Después del aborto, el dolor nunca debería ser tan intenso como para que los analgésicos de venta libre no te alivien.

7. ¿CÓMO SÉ SI LAS PÍLDORAS ABORTIVAS HAN FUNCIONADO?

- Deberías tener un sangrado que llene al menos 1 o 2 íntimas
- Los síntomas del embarazo empezarán a mejorar en los tres días siguientes a la toma del misoprostol y desaparecerán por completo en los diez días siguientes a la toma del misoprostol
- Hazte una prueba de embarazo 4 semanas después del aborto; para entonces debería dar negativo.

8. ¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR A TOMAR ANTICONCEPTIVOS?

- Puedes empezar a tomar anticonceptivos tan solo tres días después del aborto
- Puedes volver a quedarte embarazada tan solo 5 días después de un aborto
- Tu médico te hará una prueba de embarazo antes de recetarte un anticonceptivo, así que recuerda que la prueba de embarazo puede seguir dando positivo durante 4 o 5 semanas después de un aborto.