

IMPFUNGEN	Neugeborene/Säuglinge Alter in Monaten							Kleinkinder Alter in Monaten				Kinder Alter in Jahren			Jugendliche Alter in Jahren		Erwachsene Alter in Jahren		
	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U7a	U8	U9	U10	U11	J1	J2	≥18	60-74	≥75			
RS-Virus <sup>*3</sup>	Passivimpfung (einmalig)							N									S (einmalig)		
Rotavirus <sup>*4</sup>		G1	G2	(G3)															
Tetanus, Diphtherie		G1	N	G2 <sup>*5</sup>	N	N	G3 <sup>*5</sup>	N	N	A1	N	A2	N	A (alle 10 Jahre)					
Pertussis		G1	N	G2	N	N	G3	N	N	A1	N	A2	N	A3	N				
Poliomyelitis		G1	N	G2	N	N	G3	N	N	N	N	A1	N						
Hib (Haemophilus influenzae b)		G1	N	G2	N	N	G3	N	N										
Hepatitis B		G1	N	G2	N	N	G3	N	N	N	N								
Pneumokokken <sup>*6</sup>		G1	N	G2	N	N	G3	N	N							S (einmalig)			
Meningokokken B <sup>*7</sup>		G1	N	G2	N	N	G3	N	N										
Meningokokken C							G1	N	N										
MMR <sup>*8</sup> (Masern, Mumps, Röteln)							G1	N	G2	N						S (ggf. einmalig)			
Varizellen (V)							G1	N	N										
HPV <sup>*9</sup> (Humane Papillomaviren)												G1+G2	N						
COVID-19 <sup>*10</sup>														G1+G2+G3	S (jährlich)				
Influenza <sup>*11</sup>																S (jährlich)			
Herpes zoster <sup>*12</sup>															G1+G2	N			

**U** Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Jugendliche

**S** Schluckimpfung

**L** Lebendimpfung  
Sind mehrere Lebendimpfungen erforderlich, entweder gleichzeitig oder mit Mindestabstand von 4 Wochen geben. Keine Lebendimpfung bei Schwangeren!

**G** Grundimmunisierung  
Bis zu 3 Teilimpfungen G1-G3

**S** Standardimpfung

**A** Auffrischungsimpfung

**N** Nachholimpfung  
Bei fehlenden Impfungen

\*1 Zeitgleiche Verabreichung von Sechsfach-, Pneumokokken- und Meningokokken-B-Impfung bei der 1. und 2. Impfdosis empfohlen.

\*2 Aufteilung auf mehrere Impftermine möglich.

\*3 RS-Virus: Passivimpfung: Einzeldosis Nirsevimab vor/während der 1. RSV-Saison (Geburt Apr.-Sept.: Im Herbst; Geburt Okt.-Mär.: Zeitnah nach Geburt, z.B. bei U2). Standardimpfung (ab 75 J.): Einzeldosis eines Aktivimpfstoffs, möglichst im Spätsommer/Herbst.

\*4 Rotavirus: 1. Impfdosis ab dem Alter von 6 Wo., je nach Impfstoff 2-3 Impfdosen, Mindestabstand: Je 4 Wo.

\*5 Sechsfach: Bei Frühgeborenen zusätzliche Impfdosis im Alter von 3 Mon.

\*6 Pneumokokken: Grundimmunisierung: Mit PCV13 oder PCV15, bei Frühgeborenen zusätzliche Impfdosis im Alter von 3 Mon. Standardimpfung (ab 60 J.): Mit PCV20.

\*7 Meningokokken B: Im Alter von 2-23 Mon. 3 Impfdosen (danach 2 Impfdosen).

\*8 MMR(V): Grundimmunisierung: 1. MMR-Impfdosis mit zeitgleicher monovalenter Varizellen-Impfung oder mit Mindestabstand von 4 Wo., 2. MMR-Impfdosis mit MMRV-Kombinationsimpfstoff möglich. Standardimpfung: Einmalige MMR-Impfung nach 1970 Geborener mit unklarem Impfstatus, nur einer oder keiner Masern-Impfung.

\*9 HPV: Im Alter von 9-14 J. 2 Impfdosen, Mindestabstand: 5 Mon. (danach 3 Impfdosen).

\*10 COVID-19: Grundimmunisierung (ab 18 J.): 1-3 Impfdosen, bis die für die Basisimmunität erforderlichen ≥3 Antigenkontakte (inkl. ≥1 Impfung) erreicht sind. Standardimpfung (ab 60 J.): Jährlich im Herbst.

\*11 Influenza: Ab 60 J. jährliche Impfung im Herbst, bevorzugt mit Hochdosis- oder MF59-adjuvantiertem Impfstoff.

\*12 Herpes zoster: 2 Impfdosen des Totimpfstoffs im Abstand von 2-6 Mon.