

IMPFUNGEN	Neugeborene/Säuglinge Alter in Monaten						Kleinkinder Alter in Monaten						Kinder Alter in Jahren						Jugendliche Alter in Jahren			
	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	J1	J2	≥18	≥25	60-74	≥75	S(einmalig)					
RS-Virus ³																						
Rotavirus ⁴	L																					
Tetanus, Diphtherie			G1	G2	(G3)																	
Pertussis			G1	N	G2 ⁵	N					A1	N	A2	N								
Poliomyelitis			Sechsach-Impfung	N	Sechsach-Impfung	N	Sechsach-Impfung	N	N	N	A1		A2	N								
Hib (Haemophilus influenzae b)			N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N								
Hepatitis B			N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N								
Pneumokokken ⁶			G1	N	G2	N	G3	N	N												S(einmalig)	
Meningokokken B ⁷			G1	N	G2	N		G3	N	N												
MMR ⁸ (Masern, Mumps, Röteln)	L							G1	N	G2	N	N	N	N	N	N	N	S(ggf. einmalig)				
Varizellen (V)	L							G1														
HPV ⁹ (Humane Papillomaviren)																	G1 + G2	N				
Meningokokken ACWY																	G1	N				
COVID-19 ¹⁰																			G1 + G2 + G3	S(jährlich)		
Influenza ¹¹																			S(jährlich)			
Herpes zoster ¹²																			G1 + G2	N		

 Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Jugendliche

 Schluckimpfung

 Lebendimpfung
Sind mehrere Lebendimpfungen erforderlich, entweder gleichzeitig oder mit Mindestabstand von 4 Wochen geben. Keine Lebendimpfung bei Schwangeren!

 Grundimmunisierung
Bis zu 3 Teillimpfungen G1-G3

 Standardimpfung

 Auffrischungsimpfung

 Nachholimpfung
Bei fehlenden Impfungen

*1 Zeitgleiche Verabreichung von Sechsach-, Pneumokokken- und Meningokokken-B-Impfung bei der 1. und 2. Impfdosis empfohlen.

*2 Aufteilung auf mehrere Impftermine möglich.

*3 RS-Virus: Passivimpfung: Einzeldosis Nirsevimab vor/während der 1. RSV-Saison (Geburt Apr.-Sept.: Im Herbst; Geburt Okt.-Mär.: Zeitnah nach Geburt, z.B. bei U2). Standardimpfung (ab 75 J.): Einzeldosis eines Aktivimpfstoffs, möglichst im Spätsommer/Herbst.

*4 Rotavirus: 1. Impfdosis ab dem Alter von 6 Wo., je nach Impfstoff 2-3 Impfdosen, Mindestabstand: Je 4 Wo.

*5 Sechsach: Bei Frühgeborenen zusätzliche Impfdosis im Alter von 3 Mon.

*6 Pneumokokken: Grundimmunisierung: Mit PCV13 oder PCV15, bei Frühgeborenen zusätzliche Impfdosis im Alter von 3 Mon. Standardimpfung (ab 60 J.): Mit PCV20.

*7 Meningokokken B: Im Alter von 2-23 Mon. 3 Impfdosen (danach 2 Impfdosen).

*8 MMR(V): Grundimmunisierung: 1. MMR-Impfdosis mit zeitgleicher monovalenter Varizellen-Impfung oder mit Mindestabstand von 4 Wo., 2. MMR-Impfdosis mit MMRV-Kombinationsimpfstoff möglich. Standardimpfung: Einmalige MMR-Impfung nach 1970 Geborener mit unklarem Impfstatus, nur einer oder keiner Masern-Impfung.

*9 HPV: Im Alter von 9-14 J. 2 Impfdosen, Mindestabstand: 5 Mon. (danach 3 Impfdosen).

*10 COVID-19: Grundimmunisierung (ab 18 J.): 1-3 Impfdosen, bis die für die Basisimmunität erforderlichen ≥3 Antigenkontakte (inkl. ≥1 Impfung) erreicht sind. Standardimpfung (ab 60 J.): Jährlich im Herbst.

*11 Influenza: Ab 60 J. jährliche Impfung im Herbst, bevorzugt mit Hochdosis- oder MF59-adjuvantiertem Impfstoff.

*12 Herpes zoster: 2 Impfdosen des Totimpfstoffs im Abstand von 2-6 Mon.