

	Neugeborene/Säuglinge Alter in Monaten							Kleinkinder Alter in Monaten			Kinder Alter in Jahren				Jugendliche Alter in Jahren			Erwachsene Alter in Jahren					
	U2 <1,5	U3 1,5	U4 2 ¹	3	4 ¹	U5 5-7	8-10	U6 11 ²	12	13-14	15	U7 16-23	U7a 2-4	U8 5-6	U9 7-8	U10 9-11	U11 12-14	J1 15-16	J2 17	≥18	≥25	60-74	≥75
IMPFUNGEN																							
RS-Virus ^{*3}	Passivimpfung (einmalig)							N															S (einmalig)
Rotavirus ^{*4}		G1	G2	(G3)																			
Tetanus, Diphtherie		Sechsfach-Impfung	N	G2 ^{*5}	N	Sechsfach-Impfung	N	G3 ^{*5}			N			A1	N		A2		N		A (alle 10 Jahre)		
Pertussis			N		N			N					A1			A2			A3	N			
Poliomyelitis			N		N			N						N			A1			N			
Hib (Haemophilus influenzae b)			N		N			N															
Hepatitis B			N		N		N				N					N							
Pneumokokken ^{*6}		G1	N	G2	N	G3				N													S (einmalig)
Meningokokken B ^{*7}		G1	N	G2	N				G3		N												
MMR ^{*8} (Masern, Mumps, Röteln)						G1		N		G2					N						S (ggf. einmalig)		
Varizellen (V)						G1		N							N								
HPV ^{*9} (Humane Papillomaviren)																G1 + G2		N					
Meningokokken ACWY																	G1		N				
COVID-19 ^{*10}																							S (jährlich)
Influenza ^{*11}																							S (jährlich)
Herpes zoster ^{*12}																						G1 + G2	N

U Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Jugendliche

S Schluckimpfung

L Lebendimpfung
Sind mehrere Lebendimpfungen erforderlich, entweder gleichzeitig oder mit Mindestabstand von 4 Wochen geben. Keine Lebendimpfung bei Schwangeren!

G Grundimmunisierung
Bis zu 3 Teilimpfungen G1–G3

S Standardimpfung

A Auffrischungsimpfung

N Nachholimpfung
Bei fehlenden Impfungen

*1 Zeitgleiche Verabreichung von Sechsfach-, Pneumokokken- und Meningokokken-B-Impfung bei der 1. und 2. Impfdosis empfohlen.

*2 Aufteilung auf mehrere Impftermine möglich.

*3 RS-Virus: Passivimpfung: Einzeldosis Nirsevimab vor/während der 1. RSV-Saison (Geburt Apr.–Sept.: Im Herbst; Geburt Okt.–Mär.: Zeitnah nach Geburt, z.B. bei U2). Standardimpfung (ab 75 J.): Einzeldosis eines Aktivimpfstoffs, möglichst im Spätsommer/Herbst.

*4 Rotavirus: 1. Impfdosis ab dem Alter von 6 Wo., je nach Impfstoff 2–3 Impfdosen, Mindestabstand: Je 4 Wo.

*5 Sechsfach: Bei Frühgeborenen zusätzliche Impfdosis im Alter von 3 Mon.

*6 Pneumokokken: Grundimmunisierung: Mit PCV13 oder PCV15, bei Frühgeborenen zusätzliche Impfdosis im Alter von 3 Mon. Standardimpfung (ab 60 J.): Mit PCV20.

*7 Meningokokken B: Im Alter von 2–23 Mon. 3 Impfdosen (danach 2 Impfdosen).

*8 MMR(V): Grundimmunisierung: 1. MMR-Impfdosis mit zeitgleicher monovalenter Varizellen-Impfung oder mit Mindestabstand von 4 Wo., 2. MMR-Impfdosis mit MMRV-Kombinationsimpfstoff möglich. Standardimpfung: Einmalige MMR-Impfung nach 1970 Geborener mit unklarem Impfstatus, nur einer oder keiner Masern-Impfung.

*9 HPV: Im Alter von 9–14 J. 2 Impfdosen, Mindestabstand: 5 Mon. (danach 3 Impfdosen).

*10 COVID-19: Ab 75 J. jährliche Impfung im Spätsommer/Frühherbst, bevorzugt mit mRNA- oder proteinbasiertem COVID-19-Impfstoff.

*11 Influenza: Ab 60 J. jährliche Impfung im Herbst, bevorzugt mit Hochdosis- oder MF59-adjuvantiertem Impfstoff.

*12 Herpes zoster: 2 Impfdosen des Totimpfstoffs im Abstand von 2–6 Mon.