



التداخلات الغذائية مع الدواء سيكلوسبورين (نيورال-سانديميون)

التدخلات الغذائية مع الدواء - سيكلوسبورين (نيورال-سانديميون)

(اتبع بدقة التعليمات الخاصة بتعاطي الدواء)

- ١- تجنب اللقاحات أثناء العلاج ما لم تتم الموافقة عليها من قبل أخصائي الرعاية الصحية.
- ٢- لتقليل خطر الإصابة بأورام الجلد الخبيثة، تجنب التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية.
- ٣- إن هذا الدواء قد يؤثر على الكوليسترول فأحرص على تناول غذاء قليل الدسم ويفضل استخدام الزيوت النباتية.
- ٤- قد يسبب الدواء ارتفاع ضغط الدم، خلل في الكلى ، خلل في الكبد، الشعور بالغثاس، إسهال، غثيان، قيء، صداع، رعشة، أو تضخم اللثة
- ٥- إن شطف المحلول الفموي بالماء سواء قبل أو بعد الاستخدام سوف يتسبب في اختلاف الجرعة ويجب تجنبه.
- ٦- تجنب الأدوية المصاحبة للبوتاسيوم ومكملات البوتاسيوم وبدائل الطعام/الملح التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

فقيه.

مجموعة فقيه للرعاية الصحية
Fakeeh Care Group

