

Analyse réalisée par le Cedre

Données RNS-MD-L 2022, au format Cedre (convertible OSPAR et DCSMM)

DESCRIPTIF DU SITE

STALLIO BRAS (Pleubian, 22)

ID FR026

DCSMM : Sous-région marine Mers Celtiques


OSPAR : Région III. Mers Celtiques



Réserve Naturelle
SILLON DE TALBERT

Suivi réalisé par la Réserve Naturelle du Sillon
de Talbert
(fréquence trimestrielle)

Petit îlot rocheux, abritant deux accumulations de galets, au sein d'un plateau rocheux hérissé d'îlots quasiment entièrement immergés à marée haute et soumis à un fort hydrodynamisme, le tout constituant un complexe géomorphologique d'exception. Site classé ZNIEFF (type I), SIC et ZPS (Natura 2000) et faisant partie de l'espace protégé du Sillon de Talbert.




ABONDANCE TOTALE ANNUELLE

hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Total de déchets collectés et analysés : 3973 déchets

Abondance médiane : 843 déchets/100 m


Abondance moyenne : 993 déchets/100 m



TPOLOGIE DES DÉCHETS hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Composition des déchets (Stallio Bras, 2022)

Pourcentage du total de déchets




Top 5 des déchets les plus abondants (Stallio Bras, 2022)

Pourcentage du total de déchets ; Nombre de déchets collectés

[CAOU] élastiques de conchyliculture	65,1%	2586
[PLAST] fragments non-identifiés en plastique autre (2,5 cm - 50 cm)	5,6%	221
[PLAST] serre-câbles en plastique		144
[PLAST] lignes de pêche en plastique		139
[PLAST] ficelles et cordages (diamètre < 1 cm) autres		82

ABONDANCE TOTALE PAR SAISON hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Abondances totales par suivi (Stallio Bras, 2022)



Saison 1 : Dépôt de laisse de mer abondant par endroit pouvant dissimuler des macrodéchets enfouis sous les algues.

Saison 2 : Bonne décomposition des algues échouées sur la plage d'étude pouvant influencer la détection des déchets.

Saison 3 : Bonne décomposition des laines de mer, étalement de la végétation du haut de plage, possible ramassage de déchets réalisés par des promeneurs.


Saison 4 : Pas de commentaire.

FRAGMENTS EN PLASTIQUE < 2,5 CM

Total de fragments < 2,5 cm collectés et analysés : 72 fragments

Abondance médiane : 20 fragments/100 m

Abondance moyenne : 18 fragments/100 m



POLLUANTS CHIMIQUES

Total de polluants collectés et analysés : 3 boulettes

Abondance médiane : 0,01 boulette/m

Abondance moyenne : 0,01 boulette/m

Répartition sur l'année

