

Analyse réalisée par le Cedre

Données RNS-MD-L 2023, au format Cedre (convertible OSPAR et DCSMM)

DESCRIPTIF DU SITE

STALLIO BRAS (Pleubian, 22)

ID FR026

DCSMM : Sous-région marine Mers Celtiques

OSPAR : Région III. Mers Celtiques



Réserve Naturelle
SILLON DE TALBERT

Suivi réalisé depuis 2019 par la Réserve
Naturelle du Sillon de Talbert
(fréquence trimestrielle)

Petit îlot rocheux, abritant deux accumulations de galets, au sein d'un plateau rocheux hérissé d'îlots quasiment entièrement immergé à marée haute et soumis à un fort hydrodynamisme, le tout constituant un complexe géomorphologique d'exception. Site classé ZNIEFF (type I), SIC et ZPS (Natura 2000) et faisant partie de l'espace protégé du Sillon de Talbert.




ABONDANCE TOTALE ANNUELLE

hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Total de déchets collectés et analysés : 1224 déchets

Abondance médiane : 307 déchets/100 m

Abondance moyenne : 306 déchets/100 m




TYPOLOGIE DES DÉCHETS hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Composition des déchets (Stallio Bras, 2023)

Pourcentage du total de déchets

- Matériau Polymère Artificiel
- Caoutchouc
- Vêtement / textile
- Papier / carton
- Bois usiné / travaillé
- Métal
- Verre et céramique




Top 5 des déchets les plus abondants (Stallio Bras, 2023)

Nombre de déchets collectés (Pourcentage du total de déchets)

[CAOU] élastiques de conchyliculture	885 (72,3%)
[PLAST] fragments non-identifiés en plastique autre (2,5 cm - 50 cm)	53 (4,3%)
[PLAST] fragments non-identifiés en polystyrène moussé (2,5 cm - 50 cm)	33 (2,7%)
[PLAST] ficelles et cordages (diamètre < 1 cm) provenant de la pêche	24 (2%)
[PLAST] serre-câbles en plastique	21 (1,7%)

ABONDANCE TOTALE PAR SAISON hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Abondances totales par suivi (Stallio Bras, 2023)



Saison 1 : Forte accumulation de goémon d'épave susceptible d'abaisser la détection des déchets.

Saison 2 : Coef marée 87/92, pas de vent. Pas de commentaire.

Saison 3 : Coef marée 74/76. Plage ayant subi un abaissement topographique pouvant expliquer un abaissement des accumulations sur place.


Saison 4 : Coef marée 57/62. Plage ayant subi un abaissement topographique pouvant expliquer un abaissement des accumulations sur place.

FRAGMENTS EN PLASTIQUE < 2,5 CM

Total de fragments < 2,5 cm collectés et analysés : 28 fragments

Abondance médiane : 8 fragments/100 m

Abondance moyenne : 7 fragments/100 m



POLLUANTS CHIMIQUES

Total de polluants collectés et analysés : 1 boulette (hydrocarbure)

Abondance médiane : 0 boulette/m

Abondance moyenne : 0 boulette/m