

Analyse réalisée par le CEDRE

Données RNS-MD-L 2025, au format CEDRE (convertible OSPAR et DCSMM)

DESCRIPTIF DU SITE

STALLIO BRAS (Pleubian, 22)

ID FR026

DCSMM : Sous-région marine Mers Celtiques

OSPAR : Région III. Mers Celtiques



Réserve Naturelle
SILLON DE TALBERT

Suivi réalisé depuis 2019 par la Réserve
Naturelle du Sillon de Talbert
(fréquence trimestrielle)

Petit îlot rocheux, abritant deux accumulations de galets, au sein d'un plateau rocheux hérissé d'îlots quasiment entièrement immergés à marée haute et soumis à un fort hydrodynamisme, le tout constituant un complexe géomorphologique d'exception. Site classé ZNIEFF (type I), SIC et ZPS (Natura 2000) et faisant partie de l'espace protégé du Sillon de Talbert.



Dans le cadre des politiques publiques (DCSMM, OSPAR, MEDPOL), trois catégories sont analysées séparément : les **macrodéchets**, les **fragments de plastique** et **polystyrène moussé < 2,5 cm** et les **polluants chimiques**.


ABONDANCE TOTALE ANNUELLE

hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Total de déchets collectés et analysés : 1904 déchets

Abondance médiane : 423 déchets/100 m

Abondance moyenne : 476 déchets/100 m




TYPOLOGIE DES DÉCHETS hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Composition des déchets (Stallio Bras, 2025)

Pourcentage du total de déchets

- Matériau Polymère Artificiel
- Caoutchouc
- Vêtement / textile
- Papier / carton
- Bois usiné / travaillé
- Métal
- Verre et céramique




Top 5 des déchets les plus abondants (Stallio Bras, 2025)

Nombre de déchets collectés (Pourcentage du total de déchets)

[CAOU] élastiques de conchyliculture	1456 (76,5%)
[PLAST] fragments non-identifiés en plastique autre (2,5 cm - 50 cm)	48 (2,5%)
[PLAST] serre-câbles en plastique	33 (1,7%)
[PLAST] autres objets identifiables en plastique autre	26 (1,4%)
[PLAST] fragments non-identifiés en polystyrène moussé (2,5 cm - 50 cm)	26 (1,4%)

ABONDANCE TOTALE PAR SAISON hors fragments < 2,5 cm et polluants chimiques

Abondances totales par suivi (Stallio Bras, 2025)



Saison 1 : Coef marée 83. Exhaussement topographique de la plage reconstituant la zone d'accumulation sur près de la moitié du site de surveillance.

Saison 2 : Coef marée 62, vent E fort. Pas de commentaire.

Saison 3 : Coef marée 92, absence de vent. 14,65 kg d'élastiques ostréicoles en caoutchouc.


Saison 4 : Coef marée 102, absence de vent. 5,75 kg d'élastiques ostréicoles en caoutchouc.

FRAGMENTS EN PLASTIQUE < 2,5 CM

Total de fragments < 2,5 cm collectés et analysés : 12 fragments

Abondance médiane : 2 fragments/100 m

Abondance moyenne : 3 fragments/100 m



POLLUANTS CHIMIQUES

Total de polluants collectés et analysés : 0 boulette

Abondance médiane : 0 boulette/m

Abondance moyenne : 0 boulette/m