BEHANDLING MED NON-PERMANENT FILLER

Hvad er en non-permanent filler?
En non-permanent filler kan anvendes til at udjævne furer og rynker, skabe fyldigere læber, kindben, kæber, korrigere næser og forynge hud samt ændre ansigtets konturer. Filleren nedbrydes med tiden og udskilles fra kroppen.
Filler er en krystalklar gel og er baseret på hyaluronsyre, som ligner kroppens egen hyaluronsyre. I modsætning til Botox har filler ikke indflydelse på mimik.
Som non-permanent filler anvender vi primært Juvederm og Belotero som produceres af firmaerne Allergan og Noscomed. Det er kvalitetsprodukter, som anvendes over hele verden og med mange års anvendelse. Juvederm og Belotero findes i flere forskellige konsistenser. Dermed kan behandlingen skræddersyes efter behovet.

Hvornår indtræder effekten og hvor længe holder resultatet?
Du kan se resultatet med det samme. Dog kan resultatet ændre sig lidt over uger, bl.a. fordi evt hævelse vil fortage sig. Der går 14 dage før man har det endelige resultat. Filleren holder typisk i 6 - 12 måneder afhængigt af område, produkt og individuelle faktorer. Det er vores erfaring, at læbeforstørrelse holder 4-6 mdr, mens filler givet i f.eks. tåretrug eller kindben har længere varighed. Ligeledes er det vores erfaring, at resultatet holder længere efter flere behandlinger. Primært på baggrund af stimulering af kroppens egen kollagenproduktion.

Forundersøgelse.
Det er lovpligtigt at gennemgå en forundersøgelse forud for eventuel behandling. Ved forundersøgelsen vil du modtage generel information om behandlingen og risici samt få besked om, hvorvidt behandlingen vil være egnet til dig. Husk at oplyse om medicin og kosttilskud samt evt. sygdomme ved forundersøgelsen.
Filler må ikke anvendes hvis du er gravid eller ammende.
Ifølge lovgivningen at du skal have to dages betænkningstid efter forundersøgelsen, før du kan modtage behandling. Du er meget velkommen til at medbringe bisidder ved forundersøgelsen og behandlingen.

BEHANDLING MED NON-PERMANENT FILLER

Før behandling
Der er ikke noget specielt du skal forberede før behandlingen. Du vil modtage grundig information om behandlingen ved forundersøgelsen.

Selve behandlingen
Behandling og evt opfølgning varetages af vores kosmetiske sygeplejersker Karina Holm Malling, Pia Jakobsen, Helle Christensen, Nanne Korsgaard, Trine Mau eller Plastikkirurg Thomas Bo Jensen.
I forbindelse med booking ved du, hvem der foretager behandlingen. Der vil blive taget et før-billede af dig som opbevares i din journal. Området der skal behandles desinficeres. Med en tynd, skarp nål eller en stump kanyle injiceres filleren i det ønskede område. Behandlingen er kortvarig, selvfølgelig afhængig af omfang. Behandlingen er forbundet med let smerte. Der er lokalbedøvelse i både Juvederm og Belotero, men særligt til læber tilbydes lokalbedøvende creme.

Efter behandling
Du må bruge make-up 24 timer efter behandlingen. Vær opmærksom på at undgå infektion, ved god hygiejne. Det frarådes at massere og berøre området og ikke udsætte de behandlede områder for stærk varme resten af dagen, gå i havbad eller sauna.

Risiko og komplikationer
Der kan forekomme følgende bivirkninger:

- Rødme, hævelse, ømhed, kløe eller misfarvninger på det behandlede sted. Læberne kan efter en behandling være hævede i flere dage, det samme ved behandling omkring øjnene.

- Filler bør ikke anvendes i eller i nærheden af hudområder, hvor der er eller har været en hudsygdom, inflammation eller lignende. Det bør heller ikke injiceres i områder, hvor der er anvendt permanente implantater. Tendens til forkølelsessår kan evt forebygges med tabletbehandling.

- Risikoen for blå mærker er større hvis patienten indtager medicin eller kosttilskud med blodfortyndende virkning. Gør derfor opmærksom på, hvis du indtager dette før behandling.

- Juvederm og Belotero er ikke testet i forbindelse med graviditet og amning og dette betragtes derfor som en kontraindikation.

BEHANDLING MED NON-PERMANENT FILLER

- Der er beskrevet inflammatoriske reaktioner i sjældne tilfælde. Det kan vise sig ved rødme, hævelser, ømhed eller hårdhed. Reaktionerne kan begynde kort efter injektionen eller med en forsinkelse på 2-4 uger, og de er som regel beskrevet som milde til moderate og selvafgrænsende med en gennemsnitlig varighed på 2 uger. I alvorlige tilfælde kan en kortvarig behandling med binyrebarkhormon være effektiv. Patienter, der har oplevet denne type reaktioner, bør ikke behandles med filler i fremtiden.

- Filler er en gel, som kan give alvorlige komplikationer hvis det sprøjtes ind i et blodkar så som hudnekrose (død). Behandlerne hos By Malling og Jensen er uddannede i sikker injektionsteknik. Tegn på, at Juvederm eller Belotero er indsprøjtet i et blodkar, viser sig som regel øjeblikkeligt og det er muligt at give et enzym som opløser stoffet.

- Juvederm og Belotero er et fremmedlegeme, og kan give anledning til infektion. Tegn på infektion er hævelse, rødme, varme og smerte.

- Juvederm og Belotero kan særligt i læber give anledning til hårdheder (granulomer). De går oftest væk af sig selv, men man kan evt forsøge massage.

Hos By Malling og Jensen tilbyder vi vederlagsfri behandling af granulomer med enzymet hyalase, hvis det skønnes nødvendigt.

Du har mulighed for at komme til opfølgende kontrol 14 dage efter behandlingen.

By Malling og Jensen har lovbefalet Patientforsikring som altid er inkluderet i prisen. Ved tegn på komplikationer eller ved spørgsmål kontaktes klinikken på tlf . 23 34 11 72.

Version 3.0 revideret udgave november 2026 ved
Thomas Bo Jensen, Speciallæge i plastikkirurgi og Ph.d

by Malling & Jensen

Aarhus - Havnegade 4, 2 sal, 8000. tlf. 23 34 11 72. Mail: aarhus@bymallingjensen.dk

Randers - Vestergade 7b, 1 sal, 8900. tlf. 29 37 11 72. Mail: randers@bymallingjensen.dk

Aalborg - Østerågade 27, 2 sal 2a, 9000. tlf. 22 66 11 72. Mail: aalborg@bymallingjensen.dk

Horsens - Nørregade 1, 8700. tlf. 20 85 40 97. Mail: horsens@bymallingjensen.dk

Plastikkirurgi Aarhus - Park allé 3, 1 sal, 8000. tlf. 61 27 78 93. Mail: kirurgi@bymallingjensen.dk