



INFORMATIONEN FÜR APOTHEKER

Als Apotheker spielen Sie eine wichtige Rolle bei der sicheren und korrekten Verwendung von Lenalidomid.

Ausgabe von Lenalidomid

Im Idealfall sollten der Schwangerschaftstest, die Ausgabe eines Rezepts und des Medikaments am selben Tag erfolgen. Die Verabreichung von Lenalidomid sollte innerhalb von maximal 7 Tagen nach der Verschreibung erfolgen, und das Datum des letzten negativen Schwangerschaftstests muss innerhalb der 3 Tage vor dem Datum der Verschreibung liegen.

Hinweise für die Ausgabe

- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Lenalidomid-Blisters intakt ausgeben; Kapseln dürfen nicht aus Blistern entfernt und in Fläschchen verpackt werden
- Für gebärfähige Frauen geben Sie für jede Verschreibung maximal die Menge für 4 Wochen aus. Für alle anderen Patienten geben Sie maximal die Menge für 12 Wochen aus.
- Die Patienten müssen ihre Patientenkarte der Apotheke zusammen mit ihrem Rezept vorlegen und die Apotheke muss dieses Formular vor der Abgabe von Lenalidomid überprüfen.
- Patienten müssen angewiesen werden, nicht verwendete Lenalidomid-Kapseln an ihren Apotheker zurückzugeben.

Patientenberatung

Weisen Sie die Patienten bei jeder Ausgabe von Lenalidomid auf die wichtigsten Informationen über das teratogene Risiko und die sichere Anwendung und den Umgang mit Lenalidomid hin.

