



# Tratamiento sobre la marcha que se inyecta *EN SOLO 5 MINUTOS*



## ¿Qué es UDENYCA<sup>®</sup> (pegfilgrastim-cbqv)?

UDENYCA es un medicamento con receta médica que se usa para ayudar a reducir la probabilidad de infección debido a un recuento bajo de glóbulos blancos, en personas con determinados tipos de cáncer (no mieloides) que reciben medicamentos contra el cáncer (quimioterapia) que pueden causar fiebre y un recuento de células sanguíneas bajo.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD


**No use UDENYCA** si ha tenido una reacción alérgica grave a los medicamentos de pegfilgrastim o filgrastim.

Consulte la **Información importante de seguridad adicional en todo este folleto y haga clic para obtener la Información para el paciente, la Información de prescripción y las Instrucciones de Uso.**

# UDENYCA® puede ayudar a apoyar a su sistema inmunitario mientras recibe quimioterapia

## La quimioterapia puede disminuir su recuento de glóbulos blancos

La quimioterapia puede ayudar a detener el crecimiento de las células cancerosas, pero también puede reducir el recuento de glóbulos blancos. Un recuento bajo de glóbulos blancos puede ponerlo en riesgo de sufrir una infección y una complicación llamada neutropenia febril, que es grave y puede retrasar sus tratamientos de quimioterapia.



## UDENYCA potencia el crecimiento de los glóbulos blancos

UDENYCA aumenta el recuento de glóbulos blancos, lo que puede ayudar a su cuerpo a combatir las infecciones y prevenir la neutropenia febril.

## Los efectos secundarios más frecuentes de UDENYCA son dolor en los huesos, los brazos y las piernas

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de UDENYCA. Consulte la información importante de seguridad de este folleto y póngase en contacto con su equipo de atención médica para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios o las inquietudes que pueda tener sobre su tratamiento. Juntos pueden decidir cuál es la mejor forma de controlar los efectos secundarios para permanecer en el camino correcto con su tratamiento.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

#### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de UDENYCA?

UDENYCA puede causar efectos secundarios serios, como los siguientes:

- **Rotura del bazo:** El bazo puede agrandarse y romperse. Un bazo roto puede causar la muerte. Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si tiene dolor en la zona superior izquierda del estómago o en el hombro izquierdo.
- **Un problema pulmonar grave llamado síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA):** Comuníquese con su proveedor de atención médica o busque atención de emergencia de inmediato si tiene falta de aire con o sin fiebre, dificultad para respirar o una frecuencia rápida de respiración.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo este folleto y haga clic para obtener la [Información para el paciente](#), la [Información de prescripción](#) y las [Instrucciones de Uso](#).



# ¿Cómo sabré si tengo una infección?

ESCANEE O HAGA CLIC  
A CONTINUACIÓN PARA  
VISITAR [UDENYCA.COM](http://UDENYCA.COM)



para obtener más información  
sobre su tratamiento

## Es importante tomarse la temperatura

La fiebre es un signo de infección. Comuníquese con el equipo de atención médica inmediatamente si tiene fiebre de 100.4 °F (38.0 °C) o más. Tómese la temperatura cada vez que no se sienta bien o según lo recomendado por su equipo de atención médica.

Otros signos de infección son escalofríos, falta de aire, dolor de garganta, rigidez del cuello y ardor o dolor al orinar. Hable con su equipo de atención médica sobre los signos a los que debe estar atento.

**Si tiene fiebre, esta es una emergencia médica y debe comunicarse inmediatamente con su equipo de atención médica o ir a la sala de emergencias de su hospital local.**



## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de UDENYCA? (continuación)

- **Reacciones alérgicas graves:** UDENYCA puede causar reacciones alérgicas graves. Estas reacciones pueden causar erupción cutánea en todo el cuerpo, falta de aire, sibilancias, mareos, hinchazón alrededor de la boca o los ojos, ritmo cardíaco acelerado y sudoración. **Si tiene alguno de estos síntomas, deje de usar UDENYCA y comuníquese con su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de emergencia de inmediato.**
- **Crisis drepanocíticas:** Es posible que tenga una crisis drepanocítica grave si tiene una anemia drepanocítica y recibe UDENYCA. Se han producido crisis drepanocíticas graves en personas con anemia drepanocítica que reciben pegfilgrastim, que a veces han provocado la muerte. Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si tiene síntomas de crisis drepanocítica, como dolor o dificultad para respirar.

Consulte la **Información importante de seguridad adicional** en todo este folleto y haga clic para obtener la **Información para el paciente**, la **Información de prescripción** y las **Instrucciones de Uso**.





# El inyector corporal UDENYCA Tratamiento sobre la marcha que se inyecta en solo 5 minutos\*

## ADHESIVO DE ALTA

### CALIDAD Y BIEN TOLERADO


para una fijación segura en el cuerpo.

## EL INDICADOR DE RELLENO NEGRO

muestra el estado de la administración de UDENYCA

## LA LUZ DE ESTADO

señala si el inyector corporal funciona correctamente



\*Consulte las Instrucciones de Uso adjuntas antes de recibir UDENYCA.



## VERDE PARPADEANTE

El inyector corporal funciona correctamente. No retire el inyector corporal si la luz de estado parpadea en verde.



## VERDE LISO (O APAGADO)

Señala que la administración de la dosis ha finalizado. Verifique si el indicador de llenado indica que está vacío.



## ROJO PARPADEANTE

Error del inyector corporal. Si oye un pitido y ve una luz roja parpadeante, llame a su proveedor de atención médica de inmediato; es posible que necesite una dosis de reemplazo.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de UDENYCA? (continuación)

- **Alergias a los acrílicos (UDENYCA ONBODY™ solamente):** El inyector corporal (OBI) UDENYCA utiliza adhesivo acrílico. Si tuvo reacciones a los adhesivos acrílicos, el uso de este medicamento puede provocar una reacción significativa.
- **Daño renal (glomerulonefritis):** UDENYCA puede causar daño renal. Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas:
  - Hinchazón de la cara o los tobillos
  - Sangre en la orina u orina de color oscuro
  - Menos orina de lo habitual

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo este folleto y haga clic para obtener la [Información para el paciente](#), la [Información de prescripción](#) y las [Instrucciones de Uso](#).



# Pasos que debe conocer

El día que reciba quimioterapia, su proveedor de atención médica le aplicará el inyector corporal.

ESCANEE O HAGA CLIC  
A CONTINUACIÓN  
PARA VER EL VIDEO



para conocer qué esperar  
con el inyector corporal



## El inyector corporal administra su medicamento 27 horas después de que se aplica

Su proveedor de atención médica le explicará qué puede esperar durante el uso del dispositivo. **Esta guía rápida puede ayudarlo a comprender qué esperar durante el uso del inyector corporal, pero no sustituye las Instrucciones de Uso adjuntas. Consúltelas durante el uso del inyector corporal.** Hable con su proveedor de atención médica o con su farmacéutico si tiene alguna pregunta.

**Nota:** Después de que su proveedor aplique el inyector corporal, **manténgalo seco por las siguientes 3 horas.** . Esto se hace para garantizar la correcta adhesión y funcionalidad del dispositivo.



## Mientras usa el inyector corporal



### 1 MONITOREE SU INYECTOR CORPORAL

Revise ocasionalmente la luz de estado por al menos 10 segundos. **Confirme que está parpadeando en verde.** Si se aplica en la parte posterior del brazo, un cuidador debe estar disponible para revisar.

**ASEGÚRESE DE QUE EL INYECTOR CORPORAL PERMANECE SECO POR 3 HORAS ANTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA DOSIS.**



### 2 OBSERVE LA INYECCIÓN

Antes de que comience la inyección, la aguja del inyector corporal se introducirá automáticamente en la piel.

Durante la inyección, el inyector corporal parpadeará con una luz verde rápida, y es posible que escuche que la bomba funciona. La administración de su dosis de UDENYCA tomará solo **5 minutos.**



### 3 CONFIRME QUE LA INYECCIÓN ESTÁ COMPLETA

**Cuando se haya completado la inyección, se escuchará un pitido largo, y la luz de estado se volverá de color verde liso.**

Confirme que se haya completado la inyección revisando que la luz de estado sea de color verde liso o se haya apagado.



### 4 ASEGÚRESE DE QUE SU INYECTOR CORPORAL ESTÁ VACÍO

**Agarre el borde del adhesivo y desprendra lentamente el dispositivo.**

No agarre el inyector corporal para removerlo del cuerpo.

Verifique si su inyector corporal está vacío. Debería ver una línea negra junto al indicador **empty (vacío).**



**Si oye un pitido en cualquier momento, revise la luz de estado. Si parpadea en rojo, comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato.**

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo este folleto y haga clic para obtener la [Información para el paciente](#), la [Información de prescripción](#) y las [Instrucciones de Uso](#).



# El inyector corporal UDENYCA puede ser adecuado para usted si:



**No quiere regresar** para una visita al consultorio al día siguiente.



**Vive lejos** del consultorio de su médico o depende de un cuidador para que lo lleve



**Prefiere que su proveedor de atención médica organice su tratamiento**



**Tiene un sistema inmunitario debilitado** y necesita limitar la exposición a infecciones en el consultorio del médico

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de UDENYCA? (continuación)

- **Aumento del recuento de glóbulos blancos (leucocitosis):** Su proveedor de atención médica analizará su sangre durante el tratamiento con UDENYCA.
- **Disminución del recuento de plaquetas (trombocitopenia):** Su proveedor de atención médica analizará su sangre durante el tratamiento con UDENYCA. Informe a su proveedor de atención médica si tiene una hemorragia o un moretón inusuales durante el tratamiento con UDENYCA. Esto podría ser un signo de disminución de los recuentos de plaquetas, lo que puede reducir la capacidad de coagulación de la sangre.

Consulte la **Información importante de seguridad adicional en todo este folleto y haga clic para obtener la [Información para el paciente](#), la [Información de prescripción](#) y las [Instrucciones de Uso](#).**



# Lo que se debe y no se debe hacer al usar el inyector corporal

ESCANEE O HAGA CLIC  
A CONTINUACIÓN  
PARA VER EL VIDEO

para conocer qué esperar  
con el inyector corporal



Para garantizar el uso adecuado del inyector corporal y lograr los mejores resultados posibles con UDENYCA, siga estas pautas:

## LO QUE DEBE HACER

- ✓ Tenga cuidado de no golpear el inyector corporal o de quitárselo del cuerpo con un golpe.
- ✓ **USE EL INYECTOR CORPORAL DEBAJO DE LA ROPA.** Asegúrese de que el inyector corporal esté protegido de la luz solar directa. Si se expone a la luz solar por más de 1 hora, puede afectar el medicamento.
- ✓ **REVISE LA LUZ DE ESTADO CON REGULARIDAD.**
- ✓ **REVISE CON FRECUENCIA QUE EL INYECTOR CORPORAL NO TENGA FUGAS** durante los 5 minutos de administración de la dosis. Después de los 5 minutos, verifique si el inyector corporal está vacío.
- ✓ **DESPUÉS DE DUCHARSE,** revise el inyector corporal para asegurarse de que no se haya aflojado ni despegado.
- ✓ **MANTENGA SIEMPRE EL INYECTOR CORPORAL AL MENOS A 4 PULGADAS DE DISTANCIA** de equipos eléctricos como teléfonos celulares, teléfonos inalámbricos, microondas y otros aparatos de uso frecuente.

## LO QUE NO DEBE HACER

- ✗ **NO DESPRENDA NI ALTERE EL ADHESIVO DEL INYECTOR CORPORAL** antes de que se administre la dosis completa. Interrumpir el inyector corporal antes de completar la dosis, puede ocasionar una dosis omitida o incompleta de UDENYCA.
- ✗ **NO RETIRE EL INYECTOR CORPORAL SI LA LUZ DE ESTADO PARPADEA EN VERDE.** El inyector corporal todavía funciona bien y su dosis aún no está completa.
- ✗ **NO SE EXPONGA** a exámenes de diagnóstico por imágenes (p. ej., tomografías computarizadas [TC], resonancias magnéticas [RM], ecografías, radiografías), radioterapia o entornos ricos en oxígenos (como cámaras hiperbáricas).
- ✗ **EVITE QUE LOCIONES, CREMAS, ACEITES O PRODUCTOS DE LIMPIEZA** entren en contacto con el inyector corporal. El día anterior a la siguiente dosis de UDENYCA, evite usar lociones, cremas y aceites en la zona donde se aplicará el inyector.
- ✗ **NO USE** bañeras, jacuzzis, bañeras de hidromasaje ni saunas mientras usa el inyector corporal. Esto puede afectar el medicamento y su administración.
- ✗ **DNO DUERMA SOBRE EL INYECTOR CORPORAL NI APLIQUE PRESIÓN** mientras lo lleva puesto, especialmente durante la administración de la dosis. Esto puede afectar el funcionamiento del inyector corporal.

Consulte las [Instrucciones de Uso](#) del paciente para obtener más detalles sobre lo que debe y no debe hacer al usar el inyector corporal, y consulte la Información importante de seguridad en todo este folleto.





## Su proveedor de atención médica debe completar lo siguiente después de que usted reciba el inyector corporal UDENYCA.

El inyector corporal se aplicó en: La inyección de su dosis comenzará alrededor de las:

Si tiene alguna pregunta, llámenos al:

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

#### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de UDENYCA? (continuación)

- **Síndrome de fuga capilar:** UDENYCA puede hacer que el líquido se filtre de los vasos sanguíneos a los tejidos del cuerpo. Esta afección se denomina “síndrome de fuga capilar” (SFC). El SFC puede provocar rápidamente síntomas que pueden ser mortales. Obtenga ayuda médica de emergencia de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas:
  - Hinchazón o tumefacción y orina menos de lo habitual
  - Dificultad para respirar
  - Hinchazón de la zona del estómago (abdomen) y sensación de saciedad
  - Mareos o sensación de desmayo
  - Sensación general de cansancio
- **Síndrome mielodisplásico y leucemia mieloide aguda:** Si tiene cáncer de mama o de pulmón, cuando UDENYCA se utiliza con quimioterapia y radioterapia, o solo con radioterapia, puede tener un mayor riesgo de sufrir una afección sanguínea precancerosa llamada síndrome mielodisplásico (SMD) o un cáncer de la sangre llamado leucemia mieloide aguda (LMA). Los síntomas del SMD y de la LMA pueden ser cansancio, fiebre y fácil aparición de moretones o hemorragias. Comuníquese con su proveedor de atención médica si presenta estos síntomas durante el tratamiento con UDENYCA.
- **Inflamación de la aorta (aortitis):** Se informó inflamación de la aorta (el vaso sanguíneo grande que transporta la sangre desde el corazón hacia al resto del cuerpo) en pacientes que recibieron pegfilgrastim. Los síntomas pueden ser fiebre,



Working together to ensure patient access

## Hay apoyo económico disponible

UDENYCA Solutions™, parte de Coherus Solutions™, brinda opciones de apoyo económico a pacientes elegibles a quienes se les receta UDENYCA. Pida ayuda en el consultorio del médico para solicitar este apoyo.



### ENCUENTRE MÁS DETALLES

Escanee o haga clic [aquí](#) para conocer sobre el apoyo y la elegibilidad o llame al 1-844-4-UDENYCA (1-844-483-3692).

dolor abdominal, sensación de cansancio y dolor de espalda. Comuníquese con su proveedor de atención médica si tiene estos síntomas.

- **Estudios por imágenes óseas (estudios por imágenes nucleares):** La formación de determinadas células sanguíneas puede aumentar y asociarse a cambios a corto plazo en los estudios por imágenes óseas. Su médico debe tener en cuenta esto al interpretar los resultados de estos estudios.
- **Alergias a los acrílicos (UDENYCA ONBODY solamente):** El inyector corporal (OBI) UDENYCA utiliza adhesivo acrílico. Si tuvo reacciones a los adhesivos acrílicos, el uso de este medicamento puede provocar una reacción significativa.

**Los efectos secundarios más frecuentes de UDENYCA** son dolor en los huesos, los brazos y las piernas.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de UDENYCA. Comuníquese con su proveedor de atención médica para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios.

Para informar POSIBLES REACCIONES ADVERSAS, póngase en contacto con Coherus BioSciences llamando al 1-800-4-UDENYCA (1-800-483-3692) o notifíquelas a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) llamando al 1-800-FDA-1088 o en [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch).

**Haga clic para obtener la [información para el paciente](#) y la [información de prescripción](#) de UDENYCA.**



Coherus Solutions, UDENYCA Solutions y UDENYCA ONBODY son marcas comerciales, y UDENYCA es una marca comercial registrada de Coherus BioSciences, Inc.  
©2025 Coherus BioSciences, Inc. Todos los derechos reservados.  
US-UDY-0170 02/25