GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

Recomendaciones de intervalo y edad mínima entre dosis de vacunas

Nombre de la vacuna y dosis por aplicar	Edad recomendada para recibir las dosis	Edad mínima permitida para aplicar las dosis	Edad máxima permitida	Intervalo recomendable para la siguiente dosis	Intervalo mínimo para la siguiente dosis	Aplicación entre biológicos
BCG	Al nacer	Al nacer	< 5 años Excepcionalmente < 14 años	No aplica	No aplica	Se puede aplicar simultáneamente con Hexavalente, Influenza, Rotavirus, Neumococo, Hepatitis A y B. Y con cualquier intervalo con SRP o SR y Varicela.
Hepatitis B	Al nacer o 7 días de vida	Al nacer	Preferentemente no después de los 7 días	No aplica	No aplica	Se puede aplicar simultáneamente en ausencia potencial de Hexavalente, con Rotavirus, Neumococo, y con BCG.
Hexavalente* 1a dosis	2 meses	6 semanas	< 5 años	8 semanas	4 semanas	Se puede aplicar simultáneamente con Influenza, Rotavirus, Neumococo y Hepatitis A. Y con cualquier intervalo con BCG, SRP o SR; e intervalo de 4 semanas con Varicela.
Hexavalente* 2a dosis	4 meses	10 semanas		8 semanas	4 semanas	
Hexavalente* 3a dosis	6 meses	14 semanas		12 semanas	6 semanas	
Hexavalente* 4a dosis	18 meses	12 meses		No aplica	No aplica	
Neumococo conjugada 13 valente 1a dosis	2 meses	6 semanas	59 meses de edad	8 semanas	4 a 8 semanas	Se puede aplicar simultáneamente con Hexavalente, Influenza, Rotavirus, Hepatitis A. Y con cualquier intervalo con BCG, SRP o SR y Varicela.
Neumococo conjugada 13 valente 2a dosis	4 meses	10 semanas		8 meses	8 semanas	
Neumococo conjugada 13 valente 3a dosis	12 meses	12 semanas		No aplica	No aplica	
Rotavirus	2 meses	6 semanas	7 meses 29 días	8 semanas	4 semanas	Se puede aplicar simultáneamente con Hexavalente, Influenza y Neumococo. Y con cualquier intervalo con BCG.
Rotavirus	4 meses	10 semanas		No aplica	No aplica	
Influenza estacional	6 meses	6 meses	59 meses	4 semanas	4 semanas	Se puede aplicar simultáneamente con Hexavalente, Rotavirus, Neumococo, Hepatitis A y COVID-19. Y con cualquier intervalo con BCG, SRP o SR y Varicela.
Influenza estacional	7 meses	7 meses		Anual	4 semanas	
Triple viral (SRP)**	12 meses	12 meses	< 10 años	6 meses nacidos después de 2020 5 años nacidos antes de 2020	4 semanas	Se puede aplicar simultáneamente con Influenza, Neumococo, Hepatitis A, BCG y Hexavalente, e intervalo de 4 semanas con SR.
Triple viral (SRP)**	· 18 meses a partir de 2022 · 6 años a nacidos antes de 2020	· 18 meses a partir de 2022 · 6 años a nacidos antes de 2020		No aplica	No aplica	

* Hexavalente: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Poliomielitis de virus inactivados, Haemophilus Influenzae tipo b y Hepatitis B.
**Triple viral (SRP): Sarampión, Rubeola y Parotiditis.
Fuente: Modificado del Manual de Vacunación 2021. página 106.

Esquema de vacunación para población de 10 a 19 años y adultos a partir de los 20 años

Vacunas	Enfermedad que previene	Edad
Td	Tétanos, difteria	A partir de los 15 años de edad, con esquema completo Refuerzo cada 10 años
SR	Sarampión, rubéola	A partir de los 10 años de edad, en quienes no tengan dos dosis de SRP o SR
Anti hepatitis B	Hepatitis B	Adolescentes de ≥ 11 años que no cuenten con el antecedente vacunal
VPH	Infección por Virus del Papiloma Humano	Niñas en 5° grado de primaria o de 11 años de edad NO escolarizadas Mujeres cisgénero y transgénero que viven con VIH de 11 a 45 años de edad
Tdpa	Tétanos, difteria, tos ferina	En cada embarazo a partir de la semana 20 de gestación
Anti neumocócica polisacárida 23 valente	Infección por neumococo	Población de 65 años de edad Población de 60-64 años con factores de riesgo
Anti influenza	Influenza	Población de 10 a 59 años de edad considerada con factores de riesgo Toda la población de 60 años y más

Fuente: Manual de vacunación 2021. página 19

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

Esquema de vacunación para menores de 10 años

Edad	Vacunas a aplicar		
Nacimiento	BCG	Hepatitis B	
2 meses	Hexavalente acelular*	Rotavirus	Neumococo conjugada 13 valente
4 meses	Hexavalente acelular*	Rotavirus	Neumococo conjugada 13 valente
6 meses	Hexavalente acelular*	Influenza 1a dosis	
7 meses	Influenza 2a dosis		
12 meses (1 año)	Triple viral (SRP)**	Neumococo conjugada 13 valente	
18 meses	Hexavalente acelular*	Triple viral (SRP)**2a dosis (Nacidos después de 2020)	
24 meses (2 años)	Influenza refuerzo anual		
36 meses (3 años)	Influenza refuerzo anual		
48 meses (4 años)	Influenza refuerzo anual	DPT	
59 meses (5 años)	Influenza refuerzo anual		
72 meses (6 años)	Triple viral (SRP)** 2a dosis (Nacidos antes de 2020)		

* Hexavalente: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Poliomielitis de virus inactivados, Haemophilus Influenzae tipo b y Hepatitis B.
**Triple viral (SRP): Sarampión, Rubeola y Parotiditis.

Fuente: Manual de vacunación 2021. página 19.