

RELATO DE CASO - RELATO DE CASO

RELATO DE CASO: CONDUTA DE UM CARCINOMA PAPILÍFERO EM AMBULATÓRIO ACADÊMICO

Mariana Ladeira Ferreira (marianaladeira@hotmail.com)

Isabella Barbosa Coelho (isabellabarbosacoelho@gmail.com)

Isabela Silveira De Resende (belsresende@yahoo.com.br)

Cleize Silveira Cunha (cunhacleize@gmail.com)

O carcinoma papilífero de tireoide (CPT) é o tipo mais comum de câncer nessa glândula e tem um bom prognóstico quando diagnosticado precocemente. OBJETIVO: relatar um caso de CPT, a fim de orientar profissionais da importância do exame físico e diagnóstico precoce. METODOLOGIA: análise qualitativa e descritiva de relato de caso. RESULTADOS: Paciente S.A.C.A., sexo feminino, 57 anos, em consulta no Centro de Especialidades Médicas (CEM), São João Del Rei, apresentou-se com queixa de nódulo no pescoço. Na história relata quadro gripal em julho/2017 com concomitante aparecimento súbito de edema em parte anterior do pescoço e surgimento de um nódulo volumoso. Associado ao nódulo declara disfonia, disfagia e mal-estar geral. Ao exame físico, tireoide com consistência pétrea e nódulo no lobo esquerdo medindo cinco centímetros. Os exames de sangue demonstraram alteração em níveis de TSH (9,160 mU/L) e Anti-TPO (141,30 UI/ml). Na ultrassonografia de tireoide observou-se formação nodular hipoecóica, heterogênea, com calcificação central, vascularização central e periférica, ocupando quase todo o lobo esquerdo (5,7x2,9x3,1cm). Foi solicitado punção aspirativa por agulha fina

e dosagem de tireoglobulina no aspirado de linfonodo suspeito (4.766,90ng/mL).

Paciente foi submetida a tireoidectomia total e o resultado do anatomopatológico evidenciou CPT em lobo esquerdo com invasão de cápsula, pequenos vasos e metástase em linfonodos. Apresentou-se disfônica após cirurgia. Realizou terapia ablativa com radioiodo e na pesquisa de corpo inteiro houve captação em região cervical anterior. Paciente evoluindo com dosagem de tireoglobulina indetectável e queda nos títulos de Anti-TG. Foi relatado um caso atendido no CEM e realizada uma revisão da literatura, através da expressão de busca “papillary thyroid carcinoma” nas bases de dados do PUBMED e Scielo. Os nódulos tireoidianos são frequentes na população geral. Apesar de maioria ser benigna, a preocupação na investigação de nódulos clinicamente relevantes, ou seja, palpáveis ao exame físico, se faz necessária para detecção precoce dos nódulos malignos. O câncer de tireoide atinge três vezes mais mulheres na faixa entre os 20 a 65 anos. O tipo mais comum é o carcinoma papilífero - pouco agressivo e de evolução lenta. Na maioria das vezes é diagnosticado em exame de rotina e tem bom prognóstico com o tratamento adequado. Quando ocorrem metástases os gânglios linfáticos costumam ser afetados. CONCLUSÃO: Essa paciente poderia ter recebido um tratamento menos invasivo e a disfonia permanente poderia ter sido evitada com uma cirurgia menor, caso o nódulo fosse detectado precocemente. Frente ao exposto, se torna sobreeminente a avaliação médica diante de quaisquer anormalidades.